




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A

1790

A

Don Faustine Luchie

L

80






42599
PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE ME=
DICA MATERIA
LIBRI SEX,
Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.

HIS ACCESSIT, PRAETER
*Pharmacorum simplicium catalo=
gum, copiosus omnium ferme
medelarũ siue curationum
Index.*



VENETIIS.
DOMINICVS LILIVS
EXCVDEBAT.
M. D. L.



2

N A E N I A I N O B I T V
R V E L L I I.

Cesserat è uiuis ad celsa Ruellius astra.
Constiteratq; alti clarus in arce patris:
Cum perijssse hominem rata Mors, ait, Ecce triūphe
Clamet io, cui cui uictima grata cadit.
Vicimus, en nostras toties qui eluserat arteis,
Qui toties mortem uicerat, interijt.
Ast ubi in ore uirum uersari auditq; uidetq;,
Hunc magis atq; magis uiuere, uicta fremit.
Cui pæam, quibus ortus erat mihi redditur astris,
Quemq; putas uictum, bina trophæa refert.
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:
Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:
Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,
Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.
Cætera quid memorem uicturi scripta laboris,
Naturam & fides, pharmacaq; omne genus?
Non uillas, nec equos, nec curam diuitis agri,
Nullaq; uitæ hominis commoda præterijt,
Quæ non tractarit, sapientibus edita Graijs,
Quæ non reddiderit, uel meliora suis.
Vtq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis
Amille haud quisquam tanti opus ingenij.

E P I T A P H I V M

Ioannis Ruellij, Diony-
sio Corronio au-
thore .

Hic situs est, in quo uiguit medicina, Ruellus:
In quo naturæ notitia, atque poli.
In quo prima fuit dos, Graium uertere scripta
In Latium, ac Latio scribere digna Ioue .
Olim erat affinis, nunc est conuiuii deorum,
Præmiâque illa sui grata laboris habet.

3

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

libri primi præ-

fatio,

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi
interprete.



VANQVAM, amiciffime
Aree, complures non ueterū mo-
do, ſed recentiorum quoque, de
medicamentorum compoſitio-
ne, uiribus, atque probatione cō-
mentati ſunt: nobis tamen nec
uanum, nec à ratione abhora-

rentem impe-
tū animi ad

hoc opus inceſſiſſe, tibi oſtendere tentabimus: quòd
eorum nōnulli abſolutum nihil ediderūt, alij quā-
plurima, quæ auditu percunſtando didicerant, ſcri-
ptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas & He-
raclides Tarentinus, omiſſa prorsus herbarum trac-
tatione, rem ſanè quā paucis perſtrinxerunt.
Neq; uerò omnes illi de metallicis quicquam rebus

A iij

DIOSCORIDIS

aut odoramentis memoria prodiderunt. Crateuas autem herbarius, & Andreas medicus, qui ceteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprimè utileis, herbasq; haudquaquā adnotatas, reliquerunt. Veruntamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinale materiam vernaculam cognitamq; vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mādaretur: & ut medicamentorum vires probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemq; controuersiarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascētis in Italia, chamaeleæ succum esse contendit: androsæmonq; eandem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloë in Iudæa fossilem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euidentia, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine ydem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nullaq; cognatione coniunctas vireis collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes,

quò facilius memoria mandarentur, genera & co Dioscori
rum effectus à sua cognatione disiungentes. Nos ue dis co
rò ab iuuentute, ut ita dicam, iuuenta iugi desiderio gnoscen
cognoscende materia allecti, permultis regionibus dorum
peragratis (nec enim nescis nos militarem uitam simpli
exegisse) tuo hortatu conimentationem in sex libros cum stu
contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi dium.
gratitudine obsequentes, ob eum, quo nos prosequer
ris, affectum. Etenim natura cum in omnes crudi
tione excultos, tum uerò in eos quibus cum tibi eius
dem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicit
tiam esse soles, in nos etiam aliquantò peculiaris.
Enimvero non parum præbet tue probitatis argu
mētum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te
amicitia: quam unā nobiscum degentes nouimus,
cum mutuam inter vos beneuolentiam emulatione
dignam intueremur. Admonitum autem te uelim,
eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in uer
bis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhi
bitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima
visu ipsi exactissime cognouimus: quædam etiam
ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percun
tationeq; rerum apud singulos vernacularum dili
genter accepimus. Dabimus igitur operam, ut diffe
renti ab alijs ordine tradito, genera medicinarum
uiresq; describantur. Quòd autem necessario sit me
dicamentorū ratio, nemo est fermè qui ignoret: quòd
ea & toti arti coniuncta sit, vniuersisq; eius par-

A iiij

DIOSCORIDIS

tibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quàm plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiã uernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verũ in primis curam impẽdere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur. certẽ pro horum ratione aut ualent uiribus, aut euanido nulloq; munere funguntur. Serena igitur cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores uel imbres infestati sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longẽ ualidiores intelliguntur. Contrã, quæ in campestribus, riguis, & opacis, ceterisq; locis à uento silentibus enascuntur, plerunq; degenerant, & minus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec Plantæ, opportunẽ colligantur, aut si per imbecillitatem inut exa= tabuerint. Neq; ignorandũ, sæpe pro peculiari loci Etẽ co= natura, aut anni clemẽtia, maturius aut serius agnoscan= lescere. Nõnulla propria ui, hyeme florẽt, et folia patur omni= riunt: quedam bis anno florifera. Quare cui in autem tempore mo est horum peritiam assequi, necesse est eum prius inspicien= ma germinatione solo emergẽtibus, adultis & senescentibus adesse. Nã qui pullulanti herba dũtaxat

adstiterit, adultam cognoscere non potest: neq; qui
adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem no
scet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum facie,
caulium proceritates, florum seminisq; magnitudi
nem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui
olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno
in errore uersentur. Quae causa etiam nonnullis scri
ptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gra
tia, gramen, quinq;folium, & tussilaginem emit
tere florem, fructum et caulem negant. Ergo qui se
pius ad uisendas herbas & earum natales se contu
lerit, earum cognitionem maximè consequetur. Sci
re etiam non conuenit, sola ex herbaceis medicamini
bus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum
multis educare annis: reliqua à trimatu inutilia.
Quae uerò fruticosa sunt, sicut Stœchas, trixago, po
lium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum.
& alia id genus semine pregnantia demelantur flo
res quoq; antea, quam sponte sua decidant. fructus
autem, ut maturi decerpantur necesse est. & semi
na, ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herba
rum succus & foliorum elici debet, germinantibus
tum primum cauliculis. Lac & lacryma excipian
tur, inciso per summum adolescentiae uigorē caule.
Radices, & linguamenta, corticesue ut recondantur,
eximere conuenit cum herbae suis folijs exuuntur. Sic
cantur etiam expurgatae inibi, locis asperginem non
redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsita;

DIOSCORIDIS

aqua elui debent. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant. arcubis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur: et lignea, præsertim è buxo: sed ænea nasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria cõponuntur. Adipẽ autẽ & medullas stagnis vasis recõdi cõuenit.

Iris.

Cap. I.



RIS à cœlestis arcus similitudine nomẽ accepit. Folia fert gladioli. sed maiora, latiora, et pinguiora. Flores i caule æqualibus inter se spatijs distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, & lutei, purpurei, aut

* μηλις
vz, nō μέ
λανα.

* σπερματ. cœrulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quæ quædam cœlestis arcus imago representari videtur. Radix, solis dices subiaccet geniculatæ, & duræ, odoratæ: quæ fructu statim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ libere non reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissimas, quæ pumila ferè et densa constat radice, frangenti contumax, subrustica: & colore, & gustu amaro, odore perquam sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum turgent, sternutamenta mouet. Secundum locum hæc

LIBER PRIMVS. 6

bet Africana, candicans, gustuq; amara. Terebinthes in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excalfactoria, extenuans, contra tussim efficax: humorum qui egrè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earum, sceminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxand aq; in eis venarum spiracula. ischiadicis infunditur, fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glâdis modo subditæ, partus extrahunt: quin etiam coctæ & illitæ, strumas, veteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant. nudata ossa corpore operiunt doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lēti-gines et vitia cutis in facie à sole cōtracta emaculat: pessis, malagmatis, et acopis inseruntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

ANNOTATIO.

Censetur Galanga officinarū. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam uulgus herbariorum. hoc nomine solet indicare.

DIOSCORIDIS

Acorum.

Cap. I I.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo caespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radices aniso dici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: proficit: ac deest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: etiam item torminibus, uulsis, ruptis: lienem absumit, urinae stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, in scidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter ment. te imponitur, oculorum caligines succo discutit, antidote, Grætis radix magno usu commiscetur.

ci quidam

Meum.

Cap. I I I.

Meon, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, & anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. hinc diuersimodum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsitas facit, ut sis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ fere qualis uesacta ex aqua, uel trita citra coctionem, præclusa herba sit forum renum uesicæq; farctæ uitia potu leniunt, Meon, urine difficultati medentur, stomachi inflationes non faci discutunt. Torminibus, affectæ uulue, articulo- rum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita concerit. cum melle in eclegmate auxiliantur, sanguinem

per menstrua pellunt, defectionibus seruefacta: infantibus autem illita imo uentri, urinas mouent: quòd si plus quàm deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Cypirus. Cap. IIII.

Cypirus, quem aliqui erysi sceptrum, ut aspalthum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoruntur: ralices, quarum in medicina est usus, coherentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotunde, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima est grauissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula laxat, urinam ciet, ad calculos aquamq; subter cutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est, perfrictionibus vuluæ et præclusionibus fotu prodest, pellit menses. Contra ulcera oris etiam si depascent uorètq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, et unguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothritum exhibet.

DIOSCORIDIS

Cardamomum. Cap. V.

Cardamomum optimum est, quod est comagea-
ne, Armenia, Bosphoróque deuehitur: in India
quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet plenum,
fragenti contumax, occlusum, farctumq; (quod
enim huiusmodi non est, exoletum indicatur) & gu-
stu acre, subamarum, & odore caput tentans. Ex-
calfactoriam uim habet, potumque ex aqua facit
ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorum resolutio-
nem. Item ad rupta, uulsa, tormina: latas uentris ti-
neas excutit. Ex uino autem potum, renibus, diffi-
cultati urinae, à scorpione ictis, neq; non omnibus ue-
nenum uibrantibus, auxilio est. Cum cortice radiz-
cis lauri epota drachma calculos cōminuit, partus
suffitu enecat, scabiem ex aceto illitum adimit. Et
ad unguentorum spissamenta additur.

Nardum. Cap. VI.

Duo nardi genera: unum Indicum, alterum Sya-
riacum appellatur, non quòd in Syria proue-
niat, sed quòd montis, in quo oritur, pars una ad
Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Sya-
riaci genere præcipuum est recens & leue, largam
gerens comam, flauum colore, perquam odoratum,
ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore, lin-
guam siccante, quod diu in sua odoris gratia perma-
neat. Ex Indicis autem nardum quoddam Gangi-
tis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enasci-
tur, montem præterfluente: quod genus ob multam

LIBER PRIMVS. 8

loci, in quo prodit, uliginem, viribus infirmius est,
atque procerius adolescit, plures ferens spicas ab
unica radice comosas, unaque convolutas, ac gra-
uiter olentes. Montanum autem odoratius, spica bre-
ui ac mutila, odore cypero uicino, ceteras habens
Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sam-
pharitzo nomen locus indidit, frutice breui, in ma-
gnas se spargens spicas, candidiore interim medio
caule, hircorum uirus supra modum redolente:
quod improbat. Madefactum uendi solet: quod
initium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica,
& squalida, & nulloque puluere obsita. Adultera-
tur stilbio cum aqua, aut palmeo uino, inspissatio-
nis ponderisque causa inspirato. Intueri autem
oportet si lutum radicibus infideat, & incerniculo
puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim
habent excaesfactoriam, & exiccantem. Vrinam
mouent, aluum potu sistunt, vulue profluvia, sa-
niemque apposita supprimunt. Nausee ex aqua
frigida auxiliantur, & stomachi rossonibus, infla-
tioni, iocineri, regio morbo, renum uitij. Aquae au-
tem incoctae fotu ad infessum, vulue inflammatio-
nibus medentur: ad glabras oculorum genas ualent:
si quidem eas ad densiorem pilum reducant. persu-
si humore corporibus insparguntur. Miscetur an-
tidotis, & in fictili nouo non picato ad ocularia
medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cu-
uino in pastillos coacta.

* καὶ μὲν
ἐξ αὐτοῦ
χρὸν ἰδ
ἐστ, &
quod na
tina cae
reat la-
nugine.

DIOSCORIDIS

Nardum Celticum. Cap. VII.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, salumca patrio nomine appellatum, provenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flavum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suavitas: unde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidè utile, cum aceroso, alienoq; propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris gravitate, sed facilis cognitio: namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neq; odorata, uti verum nardum est. Itaque radices, atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asservari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ uitia, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

Montanum

LIBER PRIMVS. 9

Montanum nardum. Cap. VIII.

Montanum nardum, quod ab aliquibus thymolacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, surculo & folijs eryngii, similibus, minoribus, minimè tamè spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulae regiae, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florè profert. Ad eadem, ad quæ Celticum, efficax.

ANNOTATIO.

* Minoribus. } Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendum suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, n. ol. lioribus habet quod sanè utrunque herbæ, quàm aptissimè quadrat.

* Cyrino hyoscyami. } Id est, flori hyoscyami, qui ueri cyrini, quem domesticæ punicæ florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, ut in eius descriptione auctor est Dioscorides.

Asarum.

Cap. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ folijs & minoribus multò, rotundioribusq;, fluribus & cyrino hyoscyami similibus, purpureis, interfolia proximè radicè emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. } Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles } radices numerosas, geniculatas, te= Græco.

B

DIOSCORIDIS

nues, obliquas, gramine non dissimiles, longe tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, & quæ linguam uehementer mordent. Excalfactoriam uim habet: urinam cit, hydropicis & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & ueratri alibi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosi montibus prouenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia. Illyrico, & Italiae Iustinensi agro.

A N N O T A T I O.

* Maioribus } Rectius forte minoribus legas, ut Ruellius quoque monuit. Flores siquidē Valerianæ nūc dictæ, quam Phuelle omnes ferè suspicantur, Narcissum effigie expressissime quidem referunt, eo tamen longe sunt minores: ni fortè soli diuersitati id imputandum censeas.

Phu. Cap. X.

* Hippo
selini.

P Hu, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio * olusatris, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, laui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcissi proximis, * maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius addigiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa in nigri ueratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum am-

lantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare potest, ad lateris etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficio deprehenditur quoniam haec dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Malabathrum. Cap. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indicis nardi folium, falsi quaedam odoris cognitione: per multa enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. secus autem res se habet. Namque malabathrum folium, sui generis est, quod Indice gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuatur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatu aestiuo feruore, aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua ui odore permaneat, et nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uero & minutim conuulsum, praesertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Easdem nardo sortitur uires, sed efficacius omnia praestat. Urinam uehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibusque tritum et in uino feruesactum commode illinitur: subditum linguae, oris halitum et suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum

B ij

DIOSCORIDIS

seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Casia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs ueteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Casia.

Cap. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralli emula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordēs & * cum aliquanto seruore adstringens, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est germine, * Græc. cognomen est. Reliquæ uiles, & quæ * aphemum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & phemon. quæ darca, & citto uocitatur barbaro nomine. Similior, huic est pseudocasia, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candidas,

* μετὰ
πολλῆς
id est, cū
multo.

scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, uris nam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lētigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra uiperarū ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflāmationes omneis et renum uitia, pota proficit. Fœminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem uulvæ. Ea duplo pendere medicamētis mista, cinnamomi uicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquā utilis.

Cinnamomum. Cap. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referrat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, laue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquā incundè olēs, Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cū optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadātenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut fricātī lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculum. facilis est huiuscemodi probatio: nāq; fragmenta miscel.

DIOSCORIDIS

lanea quædam esse videntur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur. olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fulvescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam suauiter olet. nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, candidans. aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè repræsentat. Quintum genus, odore nares feriens, subrusum & cortice fulvæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus nervosum, densa radice firmatum. Aliis quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suavitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicem, ut inutile reijcito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, vile, invalidi odoris, solutarumque virium. Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, præbens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmentata longa robustaque ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit, et concoquit, urinam ciet. tam menses, quam partus potum aut ex myrrha impositum pellit, contra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaque conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit.

crassitiem extenuat, lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tuſſes, defluxiones, aquam ſubter cutem fuſam, renum uitia, & urinae difficultatem efficax eſt, unguentis pretioſis inferi ſolet: & in ſumma, magni ad omnia uſus. Tritum uino excipitur, umbraque ſiccatur, quò diutius eduret, reconditur.

¶ Eſt & quoddam cinnamomum, quod alii qui pſeudocinnamomum appellant, perquam denſo atque craſſo ſarmento, longè tamen inualidius cinnamomo, & odore, & guſtu. ¶

Deſunt
in Græ-
co.

Amomum. Cap. XIII.

Amomum exigue fruticat, ex ligno ſe conuoluens in racemi modum, flore, ceu candidæ uiole, paruo: folijs * uitis alba ſimilibus. Laudatur quam maxime Aemeniacum, * fuluo auri colore, ligno ſubrulo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campeſtribus, & aquoſis enaſcitur, infirmius eſſe conſtat. Eſt autem magnum, ſubuiride, tactu tenerum, frutice uenuloſo, odore origani. Ponticum uerò ſubruloſum, paruum, fragile, racemoſum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum uel ſubruloſum, quod nec adſtrictum cohereat, nec conuoluatur, ſed ſolutum diffundatur: ſeminis plenum, uuis paruis ſimile, graue, ualde odoratum, modo cariem non contraxerit, acre, guſtu mordens, ſimplici colore non euariante. Vim habet caſtaciendi, adſtringendi, exiccandi. Somnum ala-

* bryoniae.

* Χουοίε
ἔσται τῆ

χρῶμα, id
eſt, colo-

re aurū
imitans.

DIOSCORIDIS

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflā-
mationes, & meliceridas concoquit, discutitq; : iu-
uat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & po-
dagricis onfert, inflammationes oculorum, visce-
rumq; lenit ex uua passa, ad uuluarum uitia in pes-
sis, aut in seffionibus utile est. Decoctum iocineri, re-
nibus, podagrae, potu cōuenit. Antidotis immiscetur,
& pretiosissimis unguentis. Adulteratur amomū
herba simili, quae amomis uocatur, sed sine odore, si-
ne fructu. Nasctur in Armenia flore origani. Qua-
re in huiusmodi probationibus fragmenta fugien-
da sunt: eligēda autem, quae ab una radice integros
surculos emittunt.

Costus.

Cap. X V.

PRecellit Arabicus, candidus, levis, eximia odo-
ris suauitate. Secundum locum sibi uēdicat In-
dicus, levis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriac-
us, grauis, colore buxeus, et odore feriens, Optimus
est recens, albus, abundē plenus, densus, aridus, à te-
redinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calis-
sus ac mordens. Vis ei ex calsfactoria: urinam ciet,
menses pellit, uitijis, quae uulnam malè habent, tam
impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra
uiperarum morsus sextantem bibere prodest: item
aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex
uino & absynthio. uenerem ex mulso stimulat, las-
tas uentris tineas ex aqua pellit, horroribus ex oleo.

ante febrim acceptiones, & neruorum resolutionibus oblitur: vitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. Sūt qui admistis helenij comageni præduris radicibus, adulteret, quod deprehensu facile est: siquidem neque gustu seruet helenium, neque ualidū odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Odoratus iuncus. Cap. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabalthea, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij tenculitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Vim urina ciunde habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, excoquit, ac uenarū spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijcientibus, doloribus Stomachi, pulmonis, iocinebris, & renum miscetur antidotis. Radix adstringētiore est, ideo fastidijs Stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma una cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uulue inflammationibus, ad desidentium fetus, utile est.

Calamus odoratus Cap. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur: melior est fuluus, dense geniculatus, & qui

DIOSCORIDIS

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet: quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter ciuem fusa morbo, renum vitij stillicidio urine, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. Cap. XVIII.

* Mar-
cello lo-
cus hic
suspe-
ctus.

Balsamum, arbor, & alba viola, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium rutæ proximum longe candidius, perpetuò virens: in Iudea solum quadam valle & Aegypto nascens, his differens modis: scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristion vocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestivus sub ortu Canis ardoribus, arbor vnguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tamen exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quam semi septemue congiij cogantur, inibiq; pōdus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, levis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè initiatur, misto ab aliquibus

torebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: item sus-
 no, metopio, melle aut Cypria ceraliquida. quod
 maleficium facile deprehenditur. Nanque merus in
 laneam uestem fusus, neque maculam facit, neque
 si eluatur notam relinquit: vitiatum autem inhæret,
 & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non
 efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celer-
 rimè liquatur, coloreq; lactescit: vitiatum verò olei
 modo nuntat, se conuoluens, aut in stelle modum
 diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq;
 redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pes-
 sum ire, & ad ima sidere arbitrantur, postea dissi-
 patum supernatare. E ligni genere, quod xylobalsa-
 mam vocant, probatur recens, sarmento tenui, foliū
 odoratum, quadātenus opobalsamum spirās. Ne-
 cessarius etiam seminis erumpit vsus, quare eliga-
 tur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens
 gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens.
 Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra
 oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, ma-
 nitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissi-
 ma vis inest succo, & quāmaximè calfaciens:
 abstergit, quæ tenebras oculorum pupillis offun-
 dunt, medetur perfrictionibus vuluæ cum rosa-
 ceo cerato appositus: menses quoque, secundas
 & partus extrahit, horrores illiciti discutit, vl-
 cera sordida expurgat: & cruda concoquit. vri-
 nam potu ciet, ægre spirantibus prodeest: datur

DIOSCORIDIS

in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidotis.
In summa, precipua authoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semen commodè potui datur
doloribus lateris, pulmonum vitijs, tussi, ischiadicis,
comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae diffi-
cultati, torminibus ac serpentum moribus: ad mu-
liebres suffitus perquā utile est: uulnam aperit in de-
fessionibus balnearum decoctum, & humorem euo-
cat. Lignum easdem habet vires, aliquātò minores.
Ex aqua potum cruditatibus, torminosi, uulsi, ue-
nenatorum ictibus opitulatur, urinā cit, ad capitis
uulnera cum sicca iri conuenit, squammas ossium
extrahit, & ad unguentorum spissamenta additur.

Aspalathus. Cap. XIX.

fructus
id est, li-
gnosus.

Aspalathus, alijs erysisceptron, frutex est
furculosus, multis spinis horrens, nascitur in
Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad
unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur.
Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in
purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu ama-
rus. Est & alterum genus candidum, lignosum, si-
ne odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cū
abstrictione obtinet: unde decoctum cum uino ad te-
tra oris ulcera colluenda conuenit, ad nomias geni-
talium, & sordida ulcera infunditur, subiectum in
pessso, partum extrahit, aluum sistit eius decoctum:
& sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae diffi-

cultatem inflationesq; discutit.

Muscus.

Cap. XX.

Bryon, id est muscus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, et quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum et odoratiùs præstat, nigricans improbatur. Adstringendi uim habet. Decoctum insidentium uuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur, thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Agallochum.

Cap. XX I.

Agallochum. lignum est, quod ex India atque Arabia deportatur, thugie ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens, cum quadam amaritudine, cute uerius quam cortice uestitur aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arceat toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia, & imbecillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisue dolor excruciat, si dysenterie, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Putatur
lignum
aloes offi-
cinarum.

Narcaphthum.

Cap. XXII.

Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymianatis com-

DIOSCORIDIS

positis: constrictiōibus vuluē suffitu prodest.

Cancamum. Cap. XXIII.

Videtur. **C**ancamum Arabici ligni lacryma est, myrrhae quibusdam modo similis, virosi gustus, quam ad Lac suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace & ca officii myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandum. nuandis obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto, plusculos dies ebibatur: lie-
nosis datur, comitialibus, & suspiriosis. menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confestim emendat, uino madefactum medetur eorumdem hebetudinibus, aduersus ginginas humore praegnantibus, doloresque dentium, non aliud efficacius.

Cyphi. Cap. XXIIII.

Cyphi odorati suffimenti compositio est, dicata dicitur, qua abunde Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Per multae componendi rationes, quarum una haec est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adulae modo: vuae passae pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim resinae repurgatae minas quinque: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhae duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: vuam passam detractis uinaceis tussam, cum uino & myrrha subigito: cetera tusa & cribrata aduicito, die uno humorem combibere finito, dein mel coquito

dum sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatâ
resinam accuratè permisceto cum reliquis diligen-
ter contritis, & infictile vas recondito.

Crocum.

Cap. XXV.

Crocum, optimum in medendi usu Coryceum.
recens, & boni coloris, paulum candidi gerens
in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus con-
stans, non fragile, plenum à quo detractum est ni-
hil, quod madefactum manus inficit, nec situm re-
dolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis
nō est, aut uetus, aut humore persusum creditur. Se-
cūdus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ cōtermi-
no. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegia-
bus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinum inter
Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium na-
tura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & colo-
ris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: qui-
bus de causis magno venditur. Vtilissimum in
medicina quod antè descripsimus. Adulteratur im-
misto crocomagmate tuso, atque etiam sæpe sub-
litus: contrita, quò pondus adijciatur, simul ar-
genti spuma, aut plumbagine: sed maleficio de-
clarat insidens puluis, præsertim si defrutum in
odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odora-
tum esse uoluit. Alij exitiosum, tribus drach-
mis ex aqua potis. Proculdubio vim coquen-
di, emolliendi, atque substringendi habes: vri-
nam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passo

DIOSCORIDIS

biberint, crapulam nō sentient: oculorum fluxiones
illitum cum humano lacte, cohibet: additur in po-
tiones, quæ interancorum causa temperatur: ad uul-
uæ etiam sedisq; cataplasmata, utiliter inditur: ue-
nerem stimulat, uergentes ad ignem sacrum inflā-
mationes mulcet, auricularijs collectionibus utile.

Quo facilius conteratur, in calido fictili sole siccarē
oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex
passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odo-
ramentis, & in formis digestis, quod crocomaga-

Re- ma uocant. Optimum est odoratum, modicē myr-
Etius rham olens, graue, nigrum, ligni expers, leue, suba-
Marcel = marum, quod madesactum croci celorem reddit, gra-
us ali = statumq; uehementer dentes, ac linguam inficit, &
quot ho = multis durans annis, quale est quod à Syria defer-
ras per = tur. Habet suas uires ad delenda quæ caliginem oculo
manente lis obuersant: urinam cit, calfacit, concoquit, &
colore. emollit. uires croci proportionē quadam tenuis repræ-
Vulgò sentat, quandoquidem plurimam croci partem sibi
Enula crocomagma uendicat.

καπνια. Helenium. **Cap. XXVI.**

*** Crogu** **H**elenium folia habet uerbasci angustioris for-
is, xai **lij,** asperiora, oblonga, caulem quibusdam in-
enioris, id locis non emittit, radicem subalbidam, interdum
est, in subrusam, odoratam, subacrem, uegetam, ma-
montosis gnā, ex qua agnate propagines liliorum aut ari-
ac opas modo feruntur. * Montibus in umbrosis, siccoq; so-
ca. lo prouenit. Foditur æstate radix, particulas
timq;

timq; dissecta siccatur. Potum radicis decoctum mē-
 ses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex melle pro-
 dest tussi, orthopneæ, ruptis, conuulsis, inflationibus
 & serpentium morsibus. In summa excalfaciens.
 Folia ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur.
 Helenium Stomacho vtile in passo conditum: si quie-
 dem salgamarij paululum siccata radicem, mox
 decoctam, et frigida aqua madefactam, in sapam
 coniiciunt, & ad vsus recondunt. Trita potaq; ad
 cruentas excreationes efficax est. Alterum helenij
 genus in Aegypto gigni Crateuas tradit: herba est
 cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repē-
 tibus, folijs lenticule circa ramos, sed longioribus cre-
 brisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per-
 ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nascitur
 in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota,
 contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleum. Cap. XXVII.

Oleum, quod ex immaturis oliuis exprimitur,
 ad multos vsus rectè valentibus accommoda-
 tissimum: omphacinum id appellatur. Prestat recēs
 odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum
 compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vti-
 le est, quod adstringat: gingiuas contrahit, dentes
 firmat, si contineatur in ore, sudores cohibet, et quò
 vetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius
 est. Et (vt reliqua in commune dicantur) omne oleū
 calfacit, emollit ventrem, à perfrictionibus cor-

C

DIOSCORIDIS

pus tuetur, ipsūque promptius ad obeunda munera reddit, aluum emollit, vlcera venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, asidue potum redditumque vomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisana succo aut aqua potum, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, ventris animalia pellit idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si vetusti non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

Oleum syluestris oliuæ. Cap. XXVIII.

Oleum, quod syluestres oliuæ fundunt, uehementius adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, fursures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit. tardius cautionē sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec amiculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centū heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur: ex altoq; demittitur, ut asidue deuolutione, ictūque agitatam respumet: octaua die scenumgræcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madesactum donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne

extillet aqua: postea tede præpinguis piceæ, assulati-
tim cæse æquale pondus adiicitur, & transactis
oëto diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem
contraxerit, in uis nouum uetere uino affusum re-
condi debet, substratis sertule campanæ corollis
drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pō-
dere sin minus, rursus Soli mandandum, & idem
munus obeundum, usque dum inalbescat.

Sicyonium. Cap. XXIX.

Sicyoniū componendi ratio hæc est: In lebetem
oris lati stanno inductum, funditur olei albi
quod cræde oliuæ reddiderunt, congius unus,
aquæ semicongius: leui id igne coquitur, leuiter mo-
uendo: at ubi bis efferbuit, & subtracto igne refris-
xit, immatans oleum concha decapulatur, et adiecta
noua aqua conferuescit, et reliquis, ut diximus, per-
actis reponitur. In Sicyonia maximè fieri consuevit,
Sicyoniū inde accepto cognomine. Calfactoriam ad
quendam usque modum uim habet. Febri ac neruo-
rum uitijs prodest. fæminæ ad commendandum fa-
ciei nitorem eo utuntur.

Strigmenta balneorum. Cap. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt,
discutiunt: ad sedis rimas & condylomata
illinantur. Alla uero quæ ex palestris puluerẽ
sibi ascuerunt, in sordis speciem redacta, articulorũ
no los imposita adiuant: ischiadicis in fotus aut
malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.

C ij

DIOSCORIDIS

Derase gymnasiorum parietibus simulacrisq; sor-
des, calfaciunt: tubercula, quæ egrè ad coctionem
perducuntur, dissipant: desquamatis et vlceribus
senum profunt.

Elæomeli.

Cap. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex
quodam caudice manat, oleum melle crassius, sa-
pore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, sextario cū
vna aquæ hemina dato. Sed qui sumpserunt, torpez-
scunt & viribus deficiuntur: quod minimè vereri
oportet, verum crebro excitare, ne veterno pressi
somnos capient. Fit & oleum è pinguitudine sur-
culorum oleæ optimum vetus, crassum, pingue, non
turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorū
illinitur: lepras, nervorumq; dolores illitum emēdāt.

Cicinum oleum.

Cap. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi
ricini, qua voles quantitate, torrido sole flac-
cescunt, & vuarum more instrati tantisper inso-
lantur, dum vestiens cortex fractus decidat. Caro
colligitur. & coniecta in pilam diligenter tunditur
postea in lebetem stanno illito, qui aquam habeat,
demittitur, subiectoq; igni feruescunt: & vbi infi-
tum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni
vase, innatans oleum concha tollitur, & recondi-
tur. Sed in Aegypto, vbi largior increbuit vsus, lon-
gè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos malæ
mandant, & accuratè molitos per sportulam tor-

culo exprimunt. Tum quidem ematurauerunt rini, cum continentibus orbiculis exiuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet. prodest sedis inflammationibus, vultus conuersis atque præclufis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit adeditum, potu aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. Cap. XXXIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ, quæ serbuerit, sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quam antea tunditur, mox tabelis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, stranguatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vijs renum, calculosis, difficili vrine, suspiriosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato, & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & furfures cum vino abstergit.

C ij

DIOSCORIDIS

Balaninum. Cap. XXXIIII.

Simili modo fit balaninum oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Aluum soluit, Stomacho aduersatur,
contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio
est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesami-
ni ratio. Fit etiam e nuce iuglandis oleum, quod caryi-
num vocant. Eandem vim habet quam balaninum.

Hyoscyaminum. Cap. XXXV.

HYOSCYAMINUM sic fit: Semen candidum,
recens ac siccum tunditur, et calida asper-
gitur aqua, ut in amygdalino diximus.
dumque insolatur, siccatae, quae sub manu sunt, partes
cum reliqua massa permisceantur: hoc in ante fieri
oportet dum nigrescat & grauiter oleat: mox pres-
sum atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores
efficax est, pessis miscetur, ad emolliendum utile. Fit
& e grano gnidio purgato & tuso. Vis ei aluum
soluere potu. Non secus cucinum oleum temperatur:
cui facultas eadem est, quae facto e gnidio grano,
verum inualidior. Rhabbaninum e raphani semine
fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala vale-
tudine contractas tollit, scabritias entis in facie emē-
dat. Ad obsonia vtuntur Aegyptij. Melanthinum idē
quod rhabbaninum potest. Tritum sinapis semen,
& calida aqua madefactum, adiecto postea oleo
exprimitur. Ad ad diuturnos dolores efficax est, trās-
fert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Myrtei faciendi ratio hæc est: E myrto nigra syluestri, aut sativa, foliorum mollißima quæq; tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adiunguntur, subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur, innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio: Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupressi, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum. Adstringit & indurat, ideò medicamentis misceatur, quæ cicatricem obducunt: prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores compescit, & omnia quæ adstrictionem inspissationemq; desiderant.

Laurinum fit hoc modo: Lauri bacce cum mature sunt, in aqua coquuntur: si quidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquunt. alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit, alij styracem & myrtum addunt.

DIOSCORIDIS

Optima laurus ad id latifolia & mōtana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quoque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. Cap. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiem iumentorum canumq; sanat: vtilissimum pefsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinū fieri solet, quod refrigerat & adstringit.

Mastichinum. Cap. XXXIX.

Mastichinum è trita fit mastiche, quod contra omnia vulue mala efficax est: mediocriter calfacit, adstringit, & emollit, Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysenteriarumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, et colorē nitidum facit. optimū in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. Cap. XL.

DE ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidem ea in nonnullis corporum vitijs, aut medicamentis mixta, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt: in quorum probationibus consules

re nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in quibusdam planè observari non potest, propter ea quæ admiscuntur odore cæteris prævalentia: ut in amaracino & crocino, telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conveniet.

Rosaceum. Cap. XLI.

Rosaceum sic fit: lunci odorati quinque libras & bessè m tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincuncie subinde mouendo, coquito, dumq; percolaueris, in olei libras viginti & quincuncem, adijcito rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, interdum premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato vase, in craterem melle illitum recodito. Cæterum rosas, quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demitto, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsque, quartasue persusiones insundens exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium: & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si vero secundum infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle premadefactis, agitando premito. & iterum, tertio aut quarto simili modo exprimens facito, totiesq; recentis roseis detractis unguibus im-

DIOSCORIDIS

mittito: fiet enim ita oleum multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detrahitis unguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosae quae selibram pondere aequant, in sextario olei diebus octo madescent, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut asspalatho prius olei spissamentum faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim adstringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet & mulcet, quae cacoethae vocantur: ulceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo persunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficax est, ad lacescita interanea & concitatas vulvas utilissimè subiicitur.

Elatinum.

Cap. XLIII.

FRACTA elate tusa et scarificata, in labellum deiçitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent utriusque portiones, dein mūdo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: aluum tamen non mollit.

Melinum hoc modo temperatur: Olei congius decem aque sextarijs admiscetur. Adijcitur elatæ pulmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetusta tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Alioquin cotonea, decem dierum spatio operimentis involuunt, vt contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id vim refrigeratorem & adstringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quæ serpūt, ac fursures, perniunculosq; effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur, citatam vrinam sistit infusum, sudores cohibet, cōtra cantharidas, buprestim, pinorū erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Oenanthini compositio.

Cap. XLV.

Oenanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturq; et cū biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Adstringit proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore oenanthem refert.

D I O S C O R I D I S
Telini componendi ratio.

Cap. XLVI.

Foenigraci libræ quinque, calami libræ una, cypiri libræ duæ, olei libris nouē, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Alioqui pro calamo cardamomum substituunt, et cypiri loco xylobalsamum macerāt. Alij oleo antea his odoribus spissato scenumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emoluit, & concoquit, omnibus vuluarum duritijs magnopere cōuenit, sceminis difficilē parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenasmo subditum prædest, vlcera capitis manantia furfuresq; expurgat, ambustis, et pernionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer scenigraci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Sampsuchini compositio.

Cap. XLVII.

SErpylli, cassiæ, abrotoni, florum sissymbrij, frondium myrti, sampsuchi singule portiones, quædam pro viribus ipsorum coniectatione, unā tunduntur, atq; is omphacini olei modus adiicitur, qui mædientium vires nō euincat: hæc post quatrimum exprimuntur. Denuò noua alia, simili mensura, &

æquali tempore macerata premuntur. ita enim validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones cōuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, uluæ strāgulatus recreat, lumborum inguinumq; dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. Lasitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, vulforumq; castaplasmata vtilissimè additur.

Ocimini compositio. Cap. XLVIII.

Ocimum oleum fit vt cyprinum. Ocini folia decerpta librarum vndecim, & bessis pondo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito,colato: cumq; exhausseris quallum, rursus parem olei modum fundito, exprimito, Vocatur autem id secundarium: nam tertie perfusionis nō est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, vt in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tāto temporis spatio maduerit, exprimitur, et oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quoq; sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio. Cap. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincurce, foliorū abrotoni libras octo de no

DIOSCORIDIS

Et uq; madefactas premito. Quod si in longum tempus oleum velis asseruari, eiectis prioribus solijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. Cap. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim et bessem, maceratas in oleo die una, manibus premito & recõdito. Quod si iterum persundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, venarũ spiracula laxat, contra horrores februm circuitu redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Sufinum. Cap. LI.

Sufinum, quod alij liliinum appellant, sic temperatur: Olei libræ nouem cum quincunce, calanti libræ quinq; & quadrans, myrrhæ vnciæ quinq;, permisto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq;, tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur: mille lilia decerpis solijs, in latum, nõ tamen profundum, label lum demittuntur: iniectum oleum, manibus melle perunctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleũ, protinus ab aqua, quæ simul expressi fuerat, colo incerni oportet: (non enim, vt rosaceum, moram fo-

lerat: nam concalfactum feruet & computrescit: quare sæpius decapulandum) vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum trās fuis, rursum olei prius odoribus imbuendi, quod primū pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem coniiciuntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertiò eadē infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimū erit, quod prius exprimitur: secundum, quod sequitur: tertium locū sibi vendicat, quod nouissimū prodit: Denuò in mille lilia euulsis folijs expressum primò oleum infunditur: tum eadem ratione proseguendum, idemq; faciendum, vt prius, addito cardamomo, dein expresso: & quò frequētius recentia lilia maceraueris, eò validius vnguentum efficies. Deniq; cum factum abundè videbitur, singulis compositionibus miscere cōuenit myrrhæ quàm optime duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta: croci vero & cinnamomi pares portiones trūduntur, et cribrate in lutrā cū aqua demittuntur, expressūq; primò vnguentū infunditur, et paulò post excij iūtur vasculis siccis, myrrha aut gūmi antea perfusis, et croco, melle et aqua madefactis. Eadē sūt in altera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balamino, alioue oleo, et lilijs cōponunt.

DIOSCORIDIS

Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit vulvæ præclusiones, & collectiones, aperit, vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emendat: vibices cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat, potum bilem per alui extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum. Cap. LII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ asspalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncis quinque assumuntur. Asspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur. quo exempto, calamus quinque libris, & belsè adijcitur, cum myrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac vino ueteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniunguntur, quibidui spatio (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapuladum, si quidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vulvæ duritias, præclusionesque sed capitis dolores facit.

Crocinum. Cap. LIII.

Cum crocinum componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus,

deribus, & mensuris: cuius olei libras treis & semissem, croci vnciam vnā assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die, quā hoc assiduo peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adiucito, moue triduo, dein contuse myrrhæ atque cribrate drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitatum recondito. Alioqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abundè crocum spirat, in medendi vsu expetitur. Proximum, quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit, quare persæpe phreniticis subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, ulcera purgat, contra vuluæ duritias atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit enim, emollet, humectat, & permulcet: ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem proportionē respondent butyrum, onychinum & styracinum: quæ & si nominibus distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum. Cap. LIIII.

Olei omphacini cloti pars vna, aquæ cælestis tantundem cum semisse, cuius vna parte oleum diluitur, altera adiuciendo odoramentis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quinque, & semisse, calami libris sex, & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris tribus, & dodrante, olei libris no-

D

DIOSCORIDIS

nem, & uncijs quinque. Aspalathus tusus, et aqua affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myrrha autem vino vetere odorifero subacta, cōtusūq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur: & ubi efferbuerint sublato alieno, oleum percolatur. Cardamomum tussum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla, dum refrigerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta libræ cū besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo prematur: & iterum aut tertio si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eliggi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addūt. Calfacit, emolli, ora venarum adaperit, vuluæ neruorumq; vitijs conuenit, pleuritici, fractisq; per se vel cerato immistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinū opitulantur. item in acopa adijcitur.

Iri spissamentum. Cap. LV.

Spathæ quàm minutissimè contusæ sex libras cū besse, in tribus & septuaginta libris & quindecunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulā melle oblitā colato: ex eo aromatibus imbuto oleo,

irinum primò temperatur, iride ex oleo inspissato
 macerata, vt scripsimus. Sed alia est componēdi ra-
 tio: In olei septuaginta libris & quincunce, xylo-
 balsami (vt dictum est) contusi, libras quinque &
 sextantem excoquito, postea detractc xylobalsamo
 nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhe
 glebam vetere vino odorato perfusam, et in olei ita
 odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tuse
 iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue
 & vehementer dstringito. Quòd si vis validius fie-
 ri, par pòdus iterum ac tertio similiter maceratum
 exprimito. Lōgè optimum est, quòd solam irin olet,
 quale est in Perga Pamphylie, et Elide Achae nati-
 tum. Vim habet calfactoriam atque emollientem,
 crustas adimit, sordida vlcera & putrida purgat:
 confert sceminis vulue causarijs: item inflamma-
 tionibus eiusdem atq; præclussionibus, partus eijcit,
 hemorrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex
 acceto, ruta et amaris nucibus prodest: diuturnis de-
 stillationibus, naribus illitum, & contra graueolen-
 tia earum vlcera, quas oxenas vocant, auxiliatur:
 aluum purgat cyathus epotus, facit ad ilei crucia-
 tus, urinam mouet, difficileis vomitiones adiuvat,
 perunctis eo digitis & immixtis, vel ijs quæ ad vo-
 mitum ciendū induuntur: angina etiam illinitur, aut
 ex aqua mulsa gargarizatur: item contra arterie
 scabritiam. datur etiā ijs, qui cicutam, coriandrū,
 aut venena fungorum hauserunt.

D ij

DIOSCORIDIS
Gleucinum Cap. LVI.

Gleucinū absolutè constat orphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celticanardo, spatha, aspalatho, sertula campana, costo, & musto: circumdati interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, his in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vulnèq; vitij auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quòd emolliat.

Amaracinum. Cap. LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissimètis è xylobalsamo, iunco odorato, et calamo factis, cōditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassie, carpo balsami et myrrhæ odoribus. Aliqui, quò pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & vinū assumuntur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromaticum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quàm vtile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, et tetra vlcera, quæ theriomata vocāt, rumpit: difficili vrinæ, illit. i sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vuluæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vuluæ tutores discutit, vulneratis nervis, & muscu

lis confert, laneo centunculo modicè madefactum.
& impositum.

Megalinum. Cap. LVIII.

FActitabatur olim megalinum, sed nūc compo-
sio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad
historiæ complementum meminisse non fuit alienū.
Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exu-
perabat, hac tantum ratione differens. Quare lenis-
ter mollit. Resina vnguentis, neque tutelæ neq; volu-
ptatis gratia a lycitur, sed coloris crassamētiq; cau-
sa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius
coquendæ ratio declarabitur, dum de resina disse-
remus.

Hedychroum. Cap. LIX.

Quod hedychroum vocāt, in Co fieri solet: eisde
preditum viribus & misturis, quibus ama-
racinum, sed suavius spirat.

Metropium. Cap. LX.

EIt in Aegypto vnguentum, quod metopion pa-
trio nomine appellatur, propter galbani mistio-
nem: nam lignum, in quo galbanum enascitur, me-
topion vocant. Constat amaris nucibus, omphacino
oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino,
myrrha, balsami semine, galbano & resina. Proba-
tur pingue, grani odore, quod magis cardamomum
& myrrham, quàm galbanum respiciat. Calscit
vehementer, & adurit, atque extrahit, orā venarū
aperit, vlcera purgat, extrahitq; : ad precisos ner-

DIOSCORIDIS

uos, & muscalos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur, horroribus, conuulsisq; præsertim quibus cernix in scapulas diiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur: sudores ciet, vuluæ spiracula recludit, & eiusdē duritias laxat: in summa, molliendi naturam habet.

Mendesium.

Cap. LXI.

MEndesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Staete.

Cap. LXII.

STaete vocatur pinguitudo recētis myrrhæ cum exigua aqua tusa, & organo expressa. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentū per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio cōpos est viriū plurimarū. Vim calfactoriā myrrhæ et calidis vnguentis respōdentē habet.

Cinnamominum.

Cap. LXIII.

Cinnamominum confit ē balanino oleo, & xylo balsami, calami, iunci odorati spissamētis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudatur non

acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquàm amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque vllam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarâ, & calfacientem. Itaq; ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus attrahit, caput aggrauat, cōtra vulnæ vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonia exolefcit, & quadam emolliendi vis contrahitur. alioqui adurit, et præ omnibus crassis vneguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas & vlcera, quæ putredinis vitium senserūt. item ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores, tremores, gangrenasq; cum cardamomo: aduersus serpētium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. Cap. LXIIII.

Ratio nardini faciundi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunque autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamenti gratia adiicitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam

D iiij

DIOSCORIDIS

simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costō
& nardo.

Malabathrinum. Cap. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet,
insuper myrrhæ plusculum additur: qua de
causa calfacit, crocino aut amaracino viribus re-
spondens.

Iasminum. Cap. LXVI.

Apuđ Persas fit, quod iasminiū cognominatur,
ex albis floribus vlolæ: quorum sextās in Ita-
licum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut
in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas
inter epulandum vsurpatur odoris causa. Nam toti
corpori cōuenit, præsertim cū in balneas descensum
est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionē,
laxationemq; desiderāt: grauius enim spirat, quā
ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. Cap. LXVII.

Myrtha lacryma est arboris, quæ in Arabia
gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius
vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes,
alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his aliæ
quæ pediasimos præpinguis, quæ expressa, stacte
emittitur. Alia gabirea pinguisima, leto & pingui
solo nascens, ea copiosam sudat stacten. Omnium
prima est, quæ Trogodytica appellatur, accepto co-
gnomine à loco, in quo prouenit: splendens, subuiri-
dis, ac mordēs. Quinetiam legitur tenuis quedam,

quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mol-
 lis, verum odore grauiuscula, apicis nascens. Alia
 caucalis cognominatur, præter modum exoleta, ni-
 gra, & retorrída. Omnium deterrima, quæ ergasti-
 ma dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris,
 ad gummi imaginem vergens, & viribus eius pro-
 xima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pa-
 stilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è sic-
 cioribus haudquaquam pingues, & inodorati: mi-
 nus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pa-
 stillos digerebatur. adulteratur macerato gummi
 aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recēs,
 squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confra-
 cta venas vnguium modo candidas & leues osten-
 dat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciēs:
 superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei.
 Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur,
 adstringit, vuluam emollit, & præclusam aperit:
 menses & partus celeriter extrahit, cū absynthio,
 lupinorum cremore, vel succo rutæ admota: tuber-
 culo fabæ deuoratur in vetere iussi, orthopnœa, in
 laterum pectorisq; doloribus, in alui profluvio, &
 dysenteria, horrores discutit, duabus horis ante fe-
 brium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pi-
 pere & aqua: subdita linguae liquataq; scabritiem
 arteria expolit: obtusam vocem expedit, ventris ti-
 neas enecat, contra grauem oris halitum mandis-
 tur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine

DIOSCORIDIS

ne illinitur: gingivas & dentes stabilit, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus ac ossibus nudatis, peruncta cum cochlea carnibus. Item purulentis auribus inflāmatisq; cum meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum cassia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat: diurnas destillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem lenigat. Fit è myrrha, perinde atq; thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniēs. Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate representat. Vis ei calfactoria inest, emollit discutitq;, suffimentis commodissimè inseritur.

Syrax.

Cap. LXVIII.

λικωρὸς
 id est, pin-
 guis.

Syrax lacryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur & sordescens, flauus, resinosus, albicantibus grumis, quàm plurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollietur, melleum liquorem reddit: qualis è Cataballis, Pisidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursurosus, friabilis, canoque situ obductus. Cæterum lacryma inuenitur gumminum similitudine, perlucida, & myrrhæ emula: verum perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, &

iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos expriment, venundantq; styracem hunc { quoniam in Adicetū vermiculorum speciem contrahatur } scolecicem ab inter cognominant, tanquam syncerum imperiti approbant, nō animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: si quidem acer admodum est, qui ad ulte rationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci. vuluæ præclusæ duritiæ laboranti conuenit, citi mensis potu appositūque, aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisq;.

Adoletur autem & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq;, & soporem adfert.

Bdellium.

Cap. LXIX.

Bdellium alijs bolchon appellant, alijs madelcon: lacryma est * saracenicæ arboris. Probatur * Vex gustu amarum, translucidum, taurini glutinis adulteri in morem intus pingue, liquefcens facile, ligni na Marac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile, cello.

DIOSCORIDIS

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offas cōvolutum, asspalathi odore, ex India adueclum. Defertur etiam à Petra opido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum nō perinde gustui amaritudinem representat, nec vsque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidāsque hernias discutit, cum ieiuna saliva dilutum: vuluē spiracula laxat appositū & suffitū, & partus humiditatesque omnes extrahit, calculos potu comminuit, vrinam mouet, tussientibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias & nervorum nodos profunt: contusum resolvitur affuso vino, aut aqua calida.

Thus. Cap. LXX.

Thus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem individuum est, candidum, cū frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicū vero & fuluescit, & colore liuet, sed rotundum indurget id stria factitant: nam in quadrāgulares formas distest, subru sectum fictilibus versant, donec rotunditatem consum est. trahat: verū huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum

locum habet * Arabicū, & in Smilo nascens, quod * Ἀραβικὸν
 aliqui copiscum vocant, minus multò & fuluius. *Βίαι καὶ*
 Est & genus aliud, cui amomite cognomē est, alio= δὲν σμίλλω
 qui candidum: quod dum mollitur, mastiches more id est, A=
 digitis cedit. Adulteratur * in itinere, pini resina et rabias di=
 gummi, quod facile deprehendi potest: si quidem suffectum, et
 fitum gummi flammam non ei aculatur, & resina quod in
 in fumum euanescit, thus vero statim ardet: idem Smilo
 maleficium odor prodit. Ad calfaciendū & adstrin= prouenit.
 gēdum pollet, oculorum caliginem discutit, caua vl= * μεθε-
 cera complet, et ad cicatricem perducit, cruenta vul= δὲ νόσος,
 nera glutinat, infranatq; cunctas sanguinis eru= id est ar=
 ptiones, etiamsi cerebri membravis effluat: vlcera, tificiosē
 que cacoethe vocantur, & sedis & reliquarū par confor=
 tium permulcet tritum cum eo & lacte linamen= matum.
 tum, formicātes verrucas inter initia, impetiginesq; Sic Ma=
 ex aceto & pice illitum, tollit: ambusta igni, per= re.
 nionesq; cum suillo adipis aut anserino, & vlcera in
 capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: pa=
 ronychis cum melle, auribus fractis cum pice, me=
 detur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino in=
 funditur, inflammata à partu mammae cum cimo=
 lia & rosaceo magna vtilitate perunguntur, addi=
 tur ad arteriae viscerumq; medicamēta, prodest san=
 guinis excreationi potum: sed in secunda valetudine
 haustum insaniam mouet, & largius cum vino po=
 tum interficit. In fictili mundo thus crematur, fla=
 grante glebula succensum à lucerna, donec exuras

DIOSCORIDIS

tur post perfectam vstionem operire oportet, vsque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, vt in eius mentione mox ostēdemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo viuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporēque emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. Cap. LXXI.

Prefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est, si quidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modovritur, et vis eadem quæ thuri, sed validior adstringentiorq;. Quare potu cruentis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pessa confert, ad cicatrices oculorum, et caua sordesq; efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris. Cap. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris cōtusi adulterant: sed hæc igneprehenduntur. Neque

enim æquè suffitu aeris vaporem, seū fuliginosum
& impurum expuit, & permistum suaueolentie
halitus virus habet.

Thuris fuligo, Cap. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis
accensas singulatim thuris glebas, in nouam fi-
tilem ollam concauam imposito: & æreo vase in
medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito:
alteram admoucto, ex altera eius parte aut vtraq;
subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis,
quò facilius perspici queat, si vrantur: & quâ lo-
cus capax fuerit, glebularum alias supponito, et antea
quàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam im-
ponito, donec sufficientem fuliginem videaris coegis-
se. Continuò tamen externæ aramenti partes spon-
gia, aqua frigida, madesacta, abstergantur: ita enim
temperato æris feruore, fuligo omnis inhaerebit: quæ
alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus admi-
scetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris
seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfac-
tum tibi videtur, obeundum. Oculorum inflamma-
tiones mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat,
cava explet, carcinosmata sistit. Simili modo è myr-
rrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo exci-
pitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. Cap. LXXIIII.

Pinus & Picea generi eodem adscribuntur, sed
quandam flagitant specierum distinctionem,

DIOSCORIDIS

arbores vulgò cognita : quarum cortex adstringit,
prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus sum-
mum corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma
argenti & manna. Vlcera delicatulorem acrimo-
niam recusantium, cerato myrtino exceptus, ad ci-
atricem perducit: tritus cum sutorio atramento ser-
pentina cohibet, suffitu partus & secundas eicit, po-
tus aluum sistit, urinam mouet. Folia eorum trita
& illita inflammationes leniunt, vulnera ab in-
flammatione vindicant, trita autem & decocta
aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent:
hepaticis vtilia sunt, drachma pondere in aqua aut
mulsa pota. Pinæ nucis cortex & folia potu idem
prestant. Teda earum particulatim secta si in ace-
to coquantur, & decocto dens colluatur, dolores le-
nat. Ex his etiam fit spatha acoporum pessorum-
que compositionibus idonea. Quinetiam earum
crematarum fuligo ad librarij atramenti conse-
ctationem excipitur: ea circumlutionibus efficacissi-
me imponitur, quibus palpebras ornant, colorēque
que mentiuntur, callibrephara Græci vocant: arro-
sis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, &
collacrymationibus opitulatur. Pityides appellan-
tur pinorum piceaq; fructus, qui in conis inueniun-
tur. Nim adstrictoriam habent, et aliquantū excale-
facientē tussi & pectoris vitijs auxiliantur, per se,
aut ex melle sumpti. Nuces pinæ cū stroboli repure-
gate māduntur, aut cū passō aut cucumeris semine
bibuntur,

Pityides.

bibuntur, vrinam cient: acrimonias in renibus & vesica hebetant, Stomachi rofiones leniunt: data & cū portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerptæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussi acta bitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus.

Cap. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest adstringendi: semini: emini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liguamentū autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, et vbi abunde cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuò coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem repræsentat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomias arcet, vrinam pellit, motus dentium collutione stabilis. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, & quod prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lē Mastix tiscina cognominatur, Mastix & ab aliquibus, officinis.

E

DIOSCORIDIS

mastiche. Pota utilis est sanguinem reijcientibus,
 & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum
 mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad
 nitorem cuti conciliandum. Palpebras oculis incom-
 modas replicat, manducata halitum oris commens-
 dat, gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in
 insula Chio prouenit. Prefertur { nitedula mo-
 Insertũ do { resplendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ
 ab inter similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem
 prete. edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris
 resineq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. Cap. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, &
 semen, & cortex adstringunt, & ad eadē ad-
 que lentiscus conueniunt, simili parata modo sum-
 ptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersa-
 tur: excalfacit, urinam mouet, venerem excitat, cō-
 tra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibi-
 tur. Resina eius ex Arabia Petrea defertur. Proue-
 nit etiam in Iudea, Syria, Cyprio, Aphrica & Cy-
 cladibus insulis: sed præualeat candida, perlucida, vi-
 treo colore, & in ceruleum vergente, odorata, tere-
 binthum olens. * Terebinthina resinas omneis an-
 * Offici tecedit. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete:
 nis, Ter- has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Na-
 pentina. tura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurga-
 re. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate
 ex melle, vitia pectoris expurgant, urinam cient,

cruda concoquunt, ventrem emolliunt, palpebras commodissime replicant, lepras tollunt, cum erugine ac sutorio atramento, nitroq; auribus sanient emanantibus cum melle & oleo, item in pruritis genitalium vtilis: malagmatis, acopisq; admiscetur. Laterum doloribus per se, illitu, & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. Cap. LXXVII.

Liquidam resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atq; olim à Colophonē petebatur: hinc Colophonie sibi cognomen vendicauit. A Gallia quoq; subalpina: quā vernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linetu, & per se, magnopere prodest iussi veteri. Colore inter se distant: si quidem alia candida est, alia olciosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ vero aridarum generi adscribuntur, quedam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrida, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores à Pitrysa insula deferuntur, quæ secundū Hispaniā sita est. Sed quæ è picea, nucibus, pineis & cupressos manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia, quorum &

E ij

DIOSCORIDIS

illæ sumi solent. Lentiscina terebinthina respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur: itaq; resinæ congius, in duobus aquæ pluviæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assiduè mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddatur, ac digitis cedat. Cæterum ubi refrixit, in fictile nõ picatum, quod aconitum vocant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò seculenta sordes excernatur. Vruntur quoq; sine aqua, primum lentè igne & ubi coire cæperunt, maior carbonum strues superponitur, et triduo citra intermissionem discoquuntur usq; dum antedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas vnius diei spatio decoxisse satis est. Vstæ odoratis malagmaticis, et acopis, & vnguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. Est resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circunlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. Prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisq; oculorum angulis. ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. Cap. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pinguisima pini piceaq; lignis congregatur. Optima est splendens, syncera, leuis. Contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficile ex-

tussiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura
cum melle dato. Tonsillarum & vna inflammatio
nes, anginaq; vtiliter perunguntur: purulentis auri-
bus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito
sale serpentium morsibus: adiecta verò pari cera
scabros vngues extricat, impetiginesq; emendat:
vulue duritias, ac sedis tubercula discutit: cum fa-
rinaq; hordeacea & pueri impubis vrina decocta,
Strumas rumpit: cohibet vlcera, quæ serpunt, cum
pineo cortice, aut sulfure, aut furfuribus illita. Cæ-
terum cum thuris manna & cerato profundos vl-
cerum sinus conglutinat, rimis sedis & pedum, ma-
gno auxilio illinitur: vlcera replet, & cū melle pur-
gat: quin & cum vna passa, & melle carbūculos,
et putrida vlcera emarginat, disrūpitq;: erodētibus
medicamētis, quas septas vocant, probæ imiscetur.

Picinum oleum. Cap. LXXIX.

E Pice fit quod pisilæon appellant, separato li-
quore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum
lacti, Nam expansa, quand u pix coquitur, supra Hæc de-
cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; halitu sunt,
eius exprimuntur in vas. * Quas pix liquida præ-
bet vtilitates alopecias capillo replet cum farina καὶ τῆτο
hordeacea illitum, quibus & liquida pix medetur, αὐτὴν
iumentorum vlcera scabiemq; emendat. τὰ ἐφ' ο'
σον αὐτῇ
χεῖνον
πίσσα ἐ=
φεται,

Fuligo liquidæ picis. Cap. LXXX.

It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna
noua, quæ ellychnium habeat, nonnihil picis

E iij

DIOSCORIDIS

incendito, lucernamq; fictilis vase in clibani specie conformato, superius in angustam fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisq;. Vsi est ad pigmenta, quibus palpebras linunt & venustant, & ad circunlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

Pix arida. Cap. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam. quo in genere quedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrusa, resinsosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pamosq; discutit, vlcera replet, vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. Cap. LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellat. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerat a sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. Cap. LXXXIII.

Bitumen Indicum ceteris antepositur. Cuius probatio est, ut purpure modo splendeat, sitq;

ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrū autem & sordidū, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sidone. Liquidum inuenitur in Acragantino Siciliæ, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinatur, qui id Siciliū oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. Cap. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurū, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. Cap. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transilient. Ad suffusiones oculorum, & albugines vtilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vulvarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impositu: emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit, tussim veterem & anhelitum adiuuat, serpentium moribus, coxendicium laterumq; doloribus auxiliatur, datur cœliacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum discutit sanguinem concretum, dysen-

E iiij

DIOSCORIDIS

tericis cum ptisana liquatum infunditur, destillas-
tionibus suffitione medetur, mitigat dentium dolo-
res oblitum, ceterum pilos incommodos siccum re-
plicat, specillo impositum: concalfactum autem, et
cum farina hordeacea, nitro & cera illitum poda-
gris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest.
Pis asphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si mi-
sceantur, potest.

Cupressus. Cap. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & adstringit. Cuius fo-
lia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ
rheumatismis, & urine difficultati auxiliantur.
Pilule autem ex vino tuse in dysenteria, alui flu-
xione, tussi, et orthopnoea, aut si reijciatur sanguis,
convenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdè
præbet effectus tuse cum fico duritias emolliunt, na-
riumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum la-
pinis detritæ scabros ungues ejiciunt, hernias inte-
stinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Fo-
lia eadem præstant. Pilule cum arboris coma suffi-
tæ, culices abigere existimantur. Folia trita & im-
posita, vulnera conglutinant: sanguinem suppri-
munt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se,
aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus, quæ ser-
punt, carbunculis & oculorum inflammationibus,
admota cum cerato stomachum corroborant.

Juniperus. Cap. LXXXVII.

Juniperi genera duo: altera maior, altera mi-

nor, vtraque acris est. Excalfacit, & urinam mo-
net, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnulla nu-
cis iuglandis magnitudinis, nonnunquam grandesce-
re, alie & nucem Ponticam equare inueniuntur: ro- * Anella
tunde, odoratæ, in mādendo dulces, sub amare, quæ nam in-
arceuthides etiam, id est, bacce iuniperi nominatur, tollige.
Modicè calfaciunt, & adstringunt: Stomacho uti-
les contra pectoris vitia, tuſſim, inflationes, tormi-
na, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: uri-
nam cient, vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ stran-
gulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent: ideo
tam ipsa, quàm eorum succus, ex vino contra vipe-
rarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis
cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuo-
rata interficiunt.

Herba Sabina. Cap. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cupresso
similis, spinis horridior, grauius olens, acris &
feruēs: arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis
in latitudinē fundit. huius folijs nonnulli pro suffitu
vtuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusq;
folia nomas sistūt, collectiones illitu mitigant, et cū
melle nigritias sordesq; repurgant, carbūculos cū vi-
no pota rūpunt, sanguinē per urinā eliciunt, partus
apposita extrahunt, et suffitu idē præstant, vngue-
tis calfacientibus imiscantur, et priuatim glaucino.

Cedrus. Cap. LXXXIX

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colliz-

DIOSCORIDIS

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris: quæ dñ Cedrus effunditur, guttatim non dissipata coit, Cui ea vis mortuo= inest vt defuncta corpora conseruet, & viuientiarum vi= corrumpat: qua ex causa mortuorum vitam aliqui ta dicta. appellauere. Vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamenta vsus, quippe illita oculis claritatem affert, albugines cicatricesq; detergit: instillata autem cum aceto vermes aurium necat, cum hyssopi decocto infusa sonitus sibilosq; sedet, canis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Idem facit cum ex aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri constat: anginae ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est, lentes pediculosq; illito enecat, cerasæ morsibus cum sale imposita subuenit, contra hausta leporis marini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat: vermes & tineas subter inulita necat, & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria separatim, dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: privatim vehementer perunctum scabiem quadrupedum, canum, boumq; persanat: inhaerentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura accepe

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguria: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus.

Cap. XC.

Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infusus additum, vulvæ & vesicæ vitis cõuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum apiumque; ictibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate tritæ cum melle vel passo prosunt tibi, orthopnoeæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, vitilignes emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori, et gravitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur, quæ nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocantur: et ad vnguenta, quæ calfaciunt, & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis

D I O S C O R I D I S

prodest, tribus oholis in vino odorato potus.

Platanus

Cap. XCI.

TEnerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulae in vino potae, serpentium morsibus auxiliantur: exceptae autem adipe, igni ambusta sanant insidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus.

Cap. XCII.

FRaxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus.

Cap. XCIII.

Potus albae populi cortex unciae unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortivum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum vino post purgationes pota, idem praestare produntur. Tepens foliorum succus uti- liter aurium dolori instillatur. Pilulae, quae primo foliorum partu exiliunt, illitae cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt corticem albae populi, & nigrae particulatim caesum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigrae folia cum aceto illita, magna utilitate podagris.

cis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit,
 quæ in malagmata additur. Semen potum ex ace-
 to comitialibus utile est. Lacrymam populorum
 commemorant, quæ in Padum amnem defluat, du- De ortu
 rari, ac coire in succinum, quod electrum vocât, alij electri
 chrysophorum. Ad attritu iucundum odorem spirat, multa li
 & aurum colore imitatur: tritum potumq; Stoma- br. vlt. c.
 chi ventrisq; fluxiones sistit. 3. & 4.

Macer.

Cap. XCIII.

apud

M Acer ex Barbaria aduehitur, cortex flauus Plin.
 scens, crassus, gustu perquam adstringens:
 qui contra cruentas excreationes, dysenterias, &
 alui fluxiones bibitur.

Ulmus.

Cap. XCV.

V Lmi & folia & cortex et rami, vim habet
 spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras effica-
 citer illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis
 corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur. nam in lori
 more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua
 frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa
 celerius solidesunt, si decocto foliorum, corticis aut
 radicis foveantur. Humor in folliculis enascens pri-
 ma germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit,
 faciemq; splendidiorum præstat. Qui dum siccat, in
 animalia abit, quæ culicū formā gerūt. Folia cū
 tenerescūt cocta, olerū more ad obsonia vsurpantur.

E Lignorum marcor. Cap. XCVI.
 X caudicibus lignisq; veteribus caries conge-

DIOSCORIDIS

ritur, quæ farina modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisq; imposita illinatur.

Harundo. Cap. XC VII.

IN harundinum genere quedam nastos, id est, farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia fœmina, qua tibiarum ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum mœst carnis, crebris cinctâ geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula, aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborûq; dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur, panicule lanugo si aures intrauerit, exsurdât. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus. Cap. XC VIII.

PAPYRUS, quæ chartæ sunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, vsq; dum in aruerit: constricta enim atq; immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq; Aë-

gyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes,
& mansam expiunt. Ipsius radicibus pro ligno uti-
tur. Cremate papyri cinis depascentia vlcera cum
omnium partium, tum oris maxime, cohibet: verum
melius id combusta charta prestat.

Myrica. Cap. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgo cognita Officinis
est, cum apud pigras & stagnantes Tamari-
aquas enascatur, fructum quasi florem seu.
ferens compage muscosum. Aegyptus Syriaq; alte-
ram gignunt mitiorem, syluestri cetera similem.
Fructum parit gallæ proximum, inaequaliter ad-
stringentem gustu: quo conuenienter utimur vice
gallæ in medicaminibus oculorum orisq;. Datur crue-
te excreationi in potu, & celiacis, & contra pro-
fluvia sceminarum, regium morbum, & phalangio-
rum morsus: illitus tumores inhihet. Cortex in eos-
dem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino
potum, lienem absorbit: ad dolorem dentium in col-
lutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vulua
opportunis indesectionibus, phthiriasi lendibusq; cir-
cumsusum prodest, abundantiam sceminarum sistit
impositus arboris cinis, potorios calices e candice lie-
nosis moluntur, quo datus in his potus proficiat.

Erica. Cap. C.

Erica * fruticosa arbor, myricæ similis, longè * Plin.
minor: cuius flore apes reprobum mel efficiunt, fruticem
tam flos quàm coma serpentium iectibus illiti medetur. dicit.

DIOSCORIDIS

Acacalis. Cap. CI.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fructus, seminis myricæ quadantenus similis: cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conveniunt.

Rhamnus. Cap. CII.

Rhamnus fruticat in sepibus ramos ferens re-
ctos et aculeos in acutæ spinæ modum, folijs
parvis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei
genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq;
folijs constat, & quadantenus rubentibus: cuius
rami quoniam ferè cubitorum longitudinem implèt,
spinosiore quidem, sed infirmioribus minusq; rigen-
tibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuè,

* Comæ follicularij specie, * verticillo similem. Omnium fo-
lia igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter
adhibentur, id est illuminantur. Fama est ramos huius valvis fenestrisue
asphodeli impositos, veneficia depellere.

Halimus. Cap. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis
rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus.
nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquun-
tur ciborum gratia. Radix, convulsa, rupta, tormen-
tinaq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa po-
ta: eadem lactis ubertatem facit.

Paliurus. Cap. CIIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, dur-
us, cuius semen pingue & fuliginosum in-
venitur:

uenitur: quod potum tussi opitulatur, vesicae calculos comminuit. serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix adstrictoriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omneis discutit, trita et imposita.

Acuta spina.

Cap. C V.

Acuta spina, quam pyram aut pityanthen aliqui vocant, arbor est pyraastro similis, spinarum nosa valde & minor, haccas profert myrti, plenas, Berberis rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, alto descendente. Huius baccae potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam seminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriat, aut perungatur.

Rubus canis.

Cap. C VI.

Rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo olivæ simili, qui per maturitatem fulvescit, & flocculos intus continet. Fructus exēptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruesfacti enim ij in vino, mox poti, arteriam infestant.

Ligustrum.

Cap. C VII.

Offici-

Ligustrum arbor est olivæ folijs circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & canna.

DIOSCORIDIS

colore viridioribus: flore candidi, muscoso, odorato
semine scamibuci, nigro. Optimum nascitur in Cae-
nope & Ascalone. Folia adstrictoriam vim habet:
quare commanducata ulceribus oris medentur, illis
ta feruidis inflammationibus, carbunculisq; pro-
sunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur, ca-
pillum rufant trita folia, quae in radicle succo ma-
luerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorē se-
dat. Cyprinum oleum, quod ex eo fit odoratum, ex-
calfacit, emollitq; nervos. si quae feruētī natura prae-
dita sint, assumat.

Tilia. Cap. CVIII.

Xelwa
Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs o-
lee, nigrioribus & latioribus, fructu & lentis-
sci, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis
nascitur. Huius folia adstringunt. ad eadem vitilia
ad quae oleaster, cum adstrictione est opus: maxi-
mè ad oris ulcera, commanducata, aut si decocto
colluantur: pota urinam ac menses cient.

Cistus. Cap. CIX.

* Vox
ex Plinio
reposita.
Cistus, quem aliqui citharon, aut cissarō vocāt,
ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus,
saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsu-
tis. flos & masculo ut mali punice, feminae albet.
Vis adstringens: unde flores in vino austero bis in
die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illi
cohibent, vetustati ulcerū, & igni ambustus cū cē-
rato medentur. Hypocistis, orobethron, aut cytinus

à nonnullis cognominata iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liguatur acacie modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; vt in lycio prosequuntur. Vires acacie habet, verum aliquantò magis siccatur, & adstringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus: seminarum profluvio et pota et indita.

Ladanum.

Cap. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempore quidam contrahunt pingue. Foliorum vis adstringens, ac eosdem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes passuntur capre, hirci q; pinguitudinem conspicue barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adherescentem reportant: quam depectentes incolæ, colantesq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentore abstergunt, conglomerantq; in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uero Libycumq; vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem continet, addito vino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illie

Colligen
di lada-
ni mo-
dus.

F ii

DIOSCORIDIS

tum : medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum : suffitu secundas eicit, pectus immistum uulue duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimq; finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: alium sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet.

Ebenus.

Cap. C X I.

Ebenus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus leuore: cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque leniter adstringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modice fuluis, ite frequentibus maculis: ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cum similia pro ebena veniunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolvuntur nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiae in suffitu praeferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres distillationes pustulasq; mirum in modum pollet. si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentaue vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli praetrita ipsa excolant, reliquaq; eundem modum peragunt. Alij pro vino aqua utuntur. Vritur in sicili

nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi
vsti modo, & ita siccis scabrisque lippitudinibus
conducit.

Rosa.

Cap. CXII.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca mul-
to magis. Succus recentibus folijs exprimi-
tur, defectis forfice vnguibus (sic appellantur can-
dide foliorum partes) reliquum in pila premi & te
ri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculo-
rum circunditiones recondi. Siccantur etiamnum
folia rosarum, continuo versata, ne muceant, neue
situs in ijs insideat. Aridis rosis & in vino decoctis
expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium,
oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini ac vul-
ue, penna illitus aut infusus. Eadem sine expressio-
ne tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis
stomachi vitijs, igni sacro illi prodest: siccis ac tri-
tis semina asperguntur. Misceri solent vulnerarijs
antidotis, atque compositionibus, quas antheras vo-
cant. Folia vruntur in calliblephara. Flos, qui in me-
dijis rosis inuenitur, siccatus, gingivarum fluxioni-
bus efficaciter inspergitur. Capita pota citam al-
uum, & cruentas reiectiones sistunt.

Quid vn-
guis in
rosa.

Rosei pastilli

Cap. CXIII.

Pastilli, quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nul-
lo antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chmæ quadragintæ, Indice nardi drachmæ des-

F iij

D I O S C O R I D I S

cem, myrrha drachma sex, trita digeruntur in pa-
stillos, qui trium obolorum pondus æquent: sicca-
tiq; in umbra, in fictili non picato, atque obturato
reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iri-
dis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle
mifcent. Mulieribus monilium uice collo circunda-
to usui sunt, ad retundendam graue sudoris uirus.
Tritis etiam utuntur ad illitiones et diapasmata,
que fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis in-
arescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium.

Cap.

CXIIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan uocant, ar-
bor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut
longioribus: folijs buxi, densis: fructu piperis, ni-
gro, leui, amaro, densoq;: cortice pallido, non dissi-
mili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis,
lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Ly-
cia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Suc-
ci extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis
rursi, & antè per multos dies macerati, coquuntur,
tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis cras-
situdo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta deco-
ctioni amurca, aut absynthij succo, aut felle bubu-
lo. Innatans spuma inter coquendum exempta, ocu-
lorum medicamentis additur: reliquo ad alia utun-
tur. Simili modo fit lycium, semine expresso & in-
solato. Optimum, quod uri potest, restinctumq; ru-
bentem spumam ostendit, glebis extrinsecus ni-

gris, intus, cum flegoris, rufis, & odore minimè vi- * Ita ex
roso, cum amaritudine adstringens, crocino colore Plinio.
(cuiusmodi Indicum est) ceteris præstantius atque
efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum
discutit, genarum scabiem, pruritus, veteresq; flu-
xiones sanat: facit ad purulentas aureis, exulcera-
tas gingivas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis ri-
mas, attritusq; illitum: coeliacis, dysentericis, potiù
inditumq; conuenit: datur sanguinem excreantibus
& tussi, ex aqua: contra rabiosi canis morsus in
catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos
facit pilos: reduujs, ulceribus, quæ serpunt aut pu-
trent, medetur: fœminarum profluvia appositum
sistit: rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice * Videtur
catapotij deuoratum, auxiliatur. * Tradunt Indi- tur Mar-
cum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato: ea cello quæ
spinarum generi adscribitur, ramos rectos habens hinc se-
ternum cubitorum longitudine, maioresue, rubo cras-
siores, à radice numerosos. Fractus cortex rubescit, notha.
folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur. * Nō est
lienis inflammationibus & regio morbo mederi, genuina
& fœminarum purgationes elicere. Aßenerant officinae
etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare. rii Aca-
Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurga- cia, quã-
re: venenis quoque auxilio esse. uis eadē

Acacia.

Cap.

C X V.

vi ac na

A Cacia in Aegypto nascitur spina instar ar- tura præ-
boris, fruticosa, non se in rectum attollens. dita.

F iiij

DIOSCORIDIS

Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra: niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum ulcera quæ serpunt, pernioles, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimi, mensium abundantiam sistit, prociduum vuluam cohibet. citam alui suppressit, aut potus aut subter inditus: capillos denigrat. Lavatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoq; prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ. Semē lenticulæ minus fert

autumno, in loculis connexis, ternum quaternumue
capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior,
& ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex.

Cap. CXVI

Vitex siue lygos frutex est in arborem asur- Barba
gens, nascitur in fluminum ripis, asperusq; lo- ris a-
cis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fructu gnus ca-
peruicaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera stus.
eius, vna harum album florem mittit cum purpu-
reo, altera tantum purpureum & semen, vt piper.
Excalfactorias vires habet, & adstrictorias. Se-
men eius potum venenatis ictibus, aquæ, quæ cutē
subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet,
drachmæ pondere in vino potum: genituram exol-
uit, caput tentat & soporem affert. Decoctum her-
bæ & seminis in defensione, mulieribus uulnæ malo
opportunis opitulatur, item inflammationibus: pur-
gationes mouet semen cū pulgrio potum, etiam suffi-
tu vel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum,
instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo &
phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant ve-
nenata: illita quoque serpentium morsibus auxi-
liantur: testium duritias cum butyro & folijs vl-
tium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illi-
tum mitigat, & cum folijs medetur luxatis, vulne Nominis
ribusq;. Virgam qui manu teneat dum iter facit, agni &
negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicas lygi ra-
castum, vocant Græci, quoniam matronæ in libe- tio.

DIOSCORIDIS

mophorijs Atheniensium castitatem custodientes,
folijs huius cubitus sibi sternunt, & lygon quasi
vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilita-
tem.

Salix.

Cap. CXVII.

Salix vulgò nota est: cuius semen, folia, cor-
tex & succus spißandi vim habent. Trita
folia cum exiguo pipere et uino pota, ileosis
subueniunt. sumpta per se & cum aqua præstant
mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu
sanguinem expuentibus prodest: cortex eosdem præ-
bet effectus. Corticis cinis admisto aceto macera-
tus, illitu clauos & callos tollit. Ex folijs & corti-
ce succus cū rosaceo in calyce punici calfactus, aur-
riū doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras
foueri utilissimū: surfures purgat in corpore. Exci-
pitur succus, qui manat ex ea cū floret, exciso cor-
tice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui
ad purgāda, que obstant oculis, suam uim præbet.

Syluestris olea.

Cap. CXVIII.

Syluestris, olea quam Latini oleastrū appel-
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia adstrin-
gunt: trita autem et imposita ignem sacrū,
ulcera, que serpunt, epinyctidas, carbunculos, redun-
dantias nomasque cohibent: crustas emarginant cum
melle illita. Quinetiam sordida ulcera repurgant:
inflammationes panosq; cum melle imposita dis-
cutiunt: cutem à capite uulsam conglutinant:

oris ulceribus, & priuatim infantium, commandu-
cata medentur. Succus & decoctum eosdem habet
effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri proflu-
uium, admotus succus inhibet: uue oculorum, pustu-
lisq; prodest: ulcera & ueteres defluxiones sistit,
(quapropter in collyria additur.) ad genarum ero-
siones perquam utilis. Exprimitur succus tussis fo-
lijs, affuso uino aut aqua, siccatusq; sole in pastila-
los digeritur: sed longè ualidior ad recondendum
succus habetur, qui cum uino quàm cum aqua ex-
pressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue
pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina
hordacea illinuntur: uruntur cum floribus folia, ut
spodij uicem cinis præstet, in cruda olla, oblito ore
luto. usque dum figlinum percoquatur: restincta q;
uino & rursus subacta, eodem modo uruntur, po-
stremo cerussæ modo elota coguntur in pastillos. Hu-
iuscemodi cinerem in medicamentis oculorum con-
stat spodio non cedere, sed eisdem uiribus prædi-
tum esse potandum est. Foliorum satiuæ olea ea-
dem uis intelligitur, sed aliquantò inferior: unde
ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim
conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, fursures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur fursuribus, &
ulceribus quæ depascunt uorantq;: quod autem in-
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros un-
gues excutit. Colymbades trita & ambustis il-

DIOSCORIDIS

litæ pustulas gigni prohibent, sordida vlcera purgant, murie succus collutas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua & recens stomacho vtilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia vlcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuis putri vliginæ laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilit, calfacti foci gingiuis fluxione laborantibus vtilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admo-
uere, donec albæ spectentur.

Lacryma Aethiopice oleæ.

Cap. CXIX.

Lacryma, quam Aethiopica olea stillat, scāmo-
nio similis quadamtenus est, fulua, stillis exi-
libus constans, mordax: quæ autem ammoniaci,
aut gummi similitudinem refert, colore nigricans,
nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea,
oleastrisq; similem lacrymam sudant, quæ commo-
de ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albu-
ginesq; illitu emendat, vrinam & menses ciet, cauis
dentium impressa ad dolores efficax est: inter vene-
na scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sa-
nat. Appellatur autem Aethiopica et agrestis olea.

Amurca.

Cap. CXX.

Amurca (expressæ oliuæ recrementum) de

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insuper dentium dolori & vulneribus, cū aceto, vino aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. Vetusstate meliorem fieri constat. Vtiliter insunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si uerò cū omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cū decocto lupini, & chamæleonte illitu sanat. Cruda et recenti amurca podagras articulariosq; dolores foueri, vtilissimum: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita tumoris molem reprimat.

Quercus, glans, fagus, ilex. Cap. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, cæliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pesso, fæminis fluxione vuluæ laborantibus subijcitur. Glandes eosdem effectus exhibent: vrinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumptæ pariunt, resistunt esitate venenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica: intrite crude inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cacoethe vocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conue-

D I O S C O R I D I S

nunt. Alignee glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Alignee radice cortex cum aqua coctus, cum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castaneæ. Cap. CXXII.

Sardiana glandes, quas aliqui castaneas, aut lo spina, aut glandes lous appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercurSAT. Caro his, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. Cap. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed tuberosa, solida, nullo foramine perua. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. Tritæ excrementa in carne, fluxiones gingivarum & vuae, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus, dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida muria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum, quibus insidere expedit, efficax est, & contra vuluas procidentes, fluxionesq;. Capillos denigrant, aceto aut aqua maceratæ, dysentericis coeliacisq; cum vino aut aqua tritæ conuenienter illis

nuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integre in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his vtendum ad adstringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

Rhus. Cap. CXXIIII.

RHUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Offici-
erythros appellata, semen est coriarij fruti- nis su-
cis, sic vocati, quoniam coriorum insectores eo vtũ mach,
tur, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris na- Arabum
scens, binum ferè cubitorum altitudine, folijs oblõ more.
gis, subrudentibus, in ambitu serratis, acino ruarũ
gracilium denso, magnitudine terebinthi, quadãm-
tenus lato: cuius corticosa tunica perquã utilis est.
Folia vim habent adstringendi, & acaciæ effectus
præhent. Decoctum capillos denigrat, dysentericis
infunditur, & in potu eorum infususq; adijcitur:
instillatur auribus purulentis. Gangrenas & pte-
rygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Li-
quamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinẽ mel-
lis in aqua decoctis, ad eadem, vt lyciũ, conueniens.
Semen eosdem effectus exhibet: celiacorum, dysen-
tericosumq; obsonijs, inspergitur: fracta, desquam-
mata, liuida q; illitum ex aqua, ab inflammatione
vindicat: lingue asperitates cum melle abstergit,
candida fœminarum profluvia sistit, hæmorrhoi-
das sanat, cũ querno carbone itrito admodũ. Aquæ,
in qua semen maduit, decocta, cogitur coitq; effica-

DIOSCORIDIS

cior ipso semine. Gummi defert, quod dētiū canis
imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma.

Cap CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturis-
tatis vigore, autumnō decerpi solet, Arabici
myrobalani similis pomatis cognomine, colore viri-
di, & odore mali cotonei. quod si ad maturitatem
peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma a-
cerba est & adstringens: contra alui fœminarūq;
profluvia, in vino austero bibitur: hæmorrhoidas si-
stet, vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recētes
plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt,
copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem ex-
creantibus, Stomachicis, & dysentericis vtilēs in ci-
bo: illinantur cum cotoneo & cerato cœnanthino ve-
sicæ vitij. Cariota, præsertim esu, faucium asperis-
tati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstua-
tionem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri
sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad ea-
dem conueniens. Decoctum per se potu & gargaris-
atione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei
palmarum, cæterorum more, cremati in crudo ficti-
li, & vino restincti, cinere loto, spodij vicem effi-
ciunt: miscenturq; in calliblephari; Quod si non ius-
tam vstionem acceperint, denuo cremandi. Vim ad-
stringendi habent, & spiracula cutis obductu suo
claudunt: contra oculorum vnam & pustulas,
palpebrarum defluvia, cum nardo effectum præ-
bent:

dent: corporis excreſcentias cum vino reprimunt,
vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas
vtilis ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. Cap. CXXVI.

P Alma, quam aliqui elatē aut ſpatham appel-
lant, fructus palmarum adhuc florētium, in-
uolucrum eſt calyxq; quo in ſpiſſamenta vnguē-
tarū vtūtur. Optima habetur odorata, adstringēs
ponderoſa, præcluſa, intus pinguis. Vis ei adſtrictō-
ria: ſi ſtū vlcera quæ depaſcunt, laxatos artus com-
mittit, trita miſcetur cataplaſmatis et malagma-
tis: prodeſt præcordijs, imbecilli ſtomacho, & ioci-
neri affecto, miſta conferentibus cataplaſmatis.
Eius decoctum ſubinde deterſum, capillos denigrat
datur bibendum congruē, renum, veſicæ, & viſce-
rum vitijs: vuluæ ac ventris fluxiones ſiſtit: ſcabiē
cum reſina, & cera ſanat, ſi viginti diebus recens
apponatur. Inuolutusq; in ea elate fructus, quē ſuo
āplexu fouet, elate ēt vocari ſolet, & ab aliquibus
boraffus. Adstringit, & ſpathæ effectus præſtat,
nō ſic vnguētis expetitus. Alba medulla caudicis
recēs in cibo, aut decocta eadē facit, quæ boraffus.

Malum punicum. Cap. CXXVII.

M Alum punicum omne boni ſucci eſt, ſtomach= Vulgo
cho vtile, perexiguū ſufficiens alimentū. malum
Dulcia ſtomacho vtiliora habentur, ſed aliquan- granatū
tulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt,
vnde in febris abdicantur. Acida adſtringunt,

DIOSCORIDIS

estuant stomacho auxiliantur, & multò magis
 contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivasq; læ-
 dunt. Vinosa vero mediam sortiuntur naturam.
 Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & ob-
 sonijs inspersi, concoctive, fluentem aluum stoma-
 chumq; sistunt. Cœlesti aqua madescunt, bibun-
 turq; commodè sanguinem excreantibus: ad deses-
 sus dysentericorum, foeminarumq; fluxione vulvæ
 laborantium vtilis sunt. Expressus nucleorum suc-
 cus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, et sedis
 vlcera, nomas, reduvias, & ea, quæ in corpore ex-
 tuberant, aurium dolores, & narium vitia: præser-
 tim acidorum. Huius flores cytini vocantur: qui
 adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta gluti-
 nant, quas punicum, præstant utilitates: humida
 gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto collun-
 tur, herniam prolapsu intestini erumpentem cata-
 plasmate repellunt. memorie tradunt, qui tres quã-
 minimos cytinis deuorauerit, nullam eo anno lip-
 pitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exem-
 plo. Malicorium, asperum est mali punici putac-
 men, quod aliqui sidion appellant. Ad spissandi vini
 habet, &, quos cytini, præbet usus. Decoctum ra-
 dicis potu latus ventris tineas pellit, & easdem
 euocat. Balaustium sylvestris punici flos est, cy-
 tino similis, cuius complura genera reperiuntur:
 candidum, fulvum, colore rosaceo. Succus ex eo exe-
 prinitur, hypocistidis modo, cui adstrictoria vis

Cytinus

**Malico-
rium.**

**Balausz
stium.**

inest, eadem faciens, quæ hypocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina quam candida, & in hoc genere multo magis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eosdem effectus exhibet: stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctum capillum tingit, ius decocti in vino ulcera in extremis membris nata sanat, oculorum inflammationes illitum cum polline polenta lenit, contra agilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruescens aliquantum eius semine exprimatur aliàs enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus. Utile procidetie vulvarum in defectionibus, sedis vitis, & feminis fluxione vulvæ laborantibus: purgat fursures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas vocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defensiones balnearum convenit, & contra laxatos artus, & malè solidescences. Eo fracta feruminationi repugnantia utilissimè foveantur, vitiginem emendat, purulentis auribus infunditur, et

DIOSCORIDIS

capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; prosunt, & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosa ceo cum vino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas & condylo- mata. Arentium foliorum farina utiliter inspargi- tur paronychijs, pterygijs, & contra alarum femi- numq; perfusiones, cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, pa- ronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus adfuso vetere vino aut aqua coelesti, cuius recentis usus est: nam exiccatus planè cariem sen- tit, & vires amittit. Myrtidannum dicitur, adnatiss- inaequabile, verrucosum intumescensq;, & conco- lor: quod perinde quasi manus myrti caudicē am- plectitur. Magis quàm myrtus adstringit: tusum addito austero vino reponitur, coactumq; in pastil- los siccatur in umbra, multò efficacius, & folio et semine, cerato, pessis, infessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est.

Cerasia. Cap. CXXIX.

Cerasia aluo utilia sunt, si viridia suman- tur: eadem siccata, illam sistunt. Gum- mi, quod cerasi resudarunt, cum vino di- luto tussi vetusta medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

LIBER PRIMVS. 51
Siliquæ. Cap. CXXX.

Siliquæ recentes Stomacho aduersantur, al- Græcis
uum soluunt: eadem siccata sistunt Stoma. ceratia :
choq; vtiores fiunt. Vrinam ciunt: sed præ arbor au
cipuè, quæ vinaceis condiuntur. tem ipsa

Malæ. Cap. CXXXI.

Galeno

Folia, flores, & germina cum omnis mali, tum ceratōia
maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis dicitur.
adstringendi vis inest: maturis vero longè secus.
Eæ ijs vernabilem gignunt, nervos omnes ledunt,
inflationes pariunt. Cotonea Stomacho vtilia, vri
nam cient: verum tosta mittiora habentur. Pro
sunt cœliacis, dysentericis, purulenta extusionibus
cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor
commodè in Stomachi aut ventris fluxionibus, po
tui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoi
cis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & ses
des si procidant. Cotonea, quæ melle condiuntur,
urinam mouent: mel autem sibi constringentem il
lorum uim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum
melle coquuntur, Stomacho atq; ori gratiora sunt,
sed minus inspissant. Cruda cataplasmati adij
ciuntur, ad cohibendam aluum, aut si Stomachus
æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mamma
rum inflammationes, præduros lienes, & condylo
mata. Fit vinum ex ipsis tuis expressisq;: sed quò
perduret, quindecim sextarijs succi vnus mellis
adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest

G iij

DIOSCORIDIS

ad omnia quæ dicta sunt. Fit et oleum ex ijs, quod melinum vocauimus, quo vtimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotunda, parua & odorata: quæ vero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorū, reiectionibusq; sanguinis. Contra citam aluum, & mensum impetus, in vino bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt stomacho negotium exhibent. Aestiuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia: sistunt aluum, urinas euocant, malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt nernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura oīa opus sunt. Persica poma matura tā stomacho, quā uentri utilia sunt. Acerba aluum cohibent: sed sicca uehementius. Decoctum ē siccis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala Persicæ uel cedromela, quæ Latini citria uocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa oībus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cū grauitate adoratū, semē habet pyri. Id in vino potum uenenis resistit aluū mouet, oris suauitatem cōmen-

dat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: uestiarijs impositum ab erosione uitio uestes uimicare existimatur.

Pyra. Cap. CXXXII.

PYrorū multa genera, quæ tamen oīa adstringunt: promde adduntur cōueniēter in repellentia cataplasmata. Decoctū ē siccis & cruda ipsa aluū sistunt: ieiunos esitata laedunt. Achras pyrastrī genus est, quod tardissimē ematurescit. Vim pyro adstringētiorē habet, et ad eadē conuenit: stringunt et eius folia. Ligni pyrorū cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. Cap. CXXXIII.

MESPILUS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthæ. fert pomiō suauē exiguō malo nō dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardē maturescit, esus adstringit, stomacho gratū est, aluūq; supprimit. Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setaniū, alij epimelida uocāt Arbor folijs mali, sed minoribus: pomiū fert rotūdum esui aptū, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. Cap. CXXXIIII.

LOTUS arbor est uastæ magnitudinis ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gra-

G iiij

DIOSCORIDIS

etiam, Stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Rametorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis ac foeminis fluxione vuluae laborantibus auxilio est rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus. Cap. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferēs oliuae modo oblongas, quae primum uirent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant. In cibo adstringunt, profluvio alui atque dysenteriae salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Muria, ut oliuae, condiuntur. Sanies, quam uirentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Sorba. Cap. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referētia prius, quam maturecant, dissecta & sole siccata manduntur, ut album sistant. Eadem est functio molitorum farinae, si polentæ loco sumatur: quod & decoctum eorum in potu praestat.

Prunus. Cap. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed stomachū malè habet, aluum nullit. Syriaca pruna, et precipuè quae Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. aluum adstringūt. Folia pruni in uino decocta collutiōe, et gargarixatu uulua, ginginas, et tōsillas fluxiōe laborāteis reprimūt. Praestat idē syluestriū prunorū baccæ, post maturitatē exiccatae, cū sapa uero decoctæ, stomacho utiliores

redduntur aluiq; magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. Cap. CXXXVIII.

Arbutus, siue vnedo, arbor est cotonea malo. non dissimilis, tenui folio: *cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic, *Prunis memecylo cognomen est: maturus aut flauet, aut magnitudo rubescit, in esu acorosus, stomacho aduersatur, capidine quitiq; dolorem mouet. dem hic

Amygdalæ. Cap. CXXXIX. fructus

Amygdalæ amara radicum tritarum decoctum nequa = vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idem quam ce munus præstant, menses admotæ ciunt, capitis do dit: cete lori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cū ace rum effi to vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, item pu gie adeo trescentia vlcera, & quæ serpunt, et morsus canū expresse cum melle: earum aut esu dolores finiuntur, aluum refert fra emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient, contra ga, vt nil sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur, re= queat ex num vitijs, & pulmonum inflammationibus ex pressius. aqua in potu aut eclegmate cum resina terebintihi na dantur: calculosis difficiliq; vrinæ in passo auxi liantur, & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, et inflationibus coli, nucis. auellanae magnitu dine: quinis septenisue præsumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vulpes, si cū quadam esca eas vocauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & ad

DIOSCORIDIS

Stringit: reijcientibus sanguinem, potũ auxilio est:
impetigines, quæ summum corpus occuparunt, illis-
tum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino
potum medetur: calculosis cū passo bibere prodest.
Enucibus græcis dulces cibo idoneæ sed multò mi-
nus valent in remedijs, quàm amara attamen ex-
tenuant, urinam ciunt, recentium esu cum suo pu-
tamine, humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia. Cap. CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nu-
cibus similia sunt, & stomacho amica: trita
cum vino contra serpentium ictus prosunt, siue edan-
tur, siue bibantur.

Nux iuglans. Cap. CXLI.

Nuces iuglandes, quas nonnulli Persicas vo-
cant, sunt difficiles concoctu, stomacho inuti-
les, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus
inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cum ru-
ta vero & ficis præsumptæ, & à summo cibo, ve-
nenis resistunt: nec minus si à veneni haustu come-
dantur: largius esitatur tinea latas pellunt, illinun-
tur mammarum inflammationi, abscessibus, luxa-
tisq; cum mellis exiguo, et ruta: cum cæpa autem,
sale & melle, canis hominisq; morsui proficiunt: tor-
mina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admo-
tæ, sedant. Putamen combustum tritumq; in oleo,
& vino, infantium capite peruncto, nutrit capile-
hum, alopecias replet. Sistunt menses nuclei viti, si

triti ex vino admoucantur: ydem e veteribus, illiti carbunculis, gangrenis, & agilopijs medetur: alopecijs comaducati, et impositi p'senti sunt remedio. Nucibus tussis oleu exprimitur. Recentes stomacho innocetiores sunt, vtpote suauiores: itaq; allio miste eximut acrimonia. Liuires in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanae. Cap. CXLII.

Nuces auellane, quas & leptocarya vocant, stomacho infesta sunt: ipse tamen trita, et in aqua mulsa pota, tussi veteri medentur: toste et cum exiguo piperis pota destillationem concoquunt, crematuru cinis cu axungia aut adipe vrsi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cu oleo, caesiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sincipite.

Morus. Cap. CXLIII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus: decoctus autem aereo vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myrice semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhois vice obsonijs miscetur, vt coeliacos iuuat. Raliscis cortex decoctus in aqua et potus aluum resoluit,

DIOSCORIDIS

latus ventris tinea excutit, his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt, Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntque capillum, vitium & sici nigrae frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

Sycomorus. Cap. CXLIIII.

SYcomorum aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice, ipso caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: ubi prouentu fecundo restibilique inuamentum adfert, cum amone caritas premit. Pomum aluo utile est, sed perquam exilem praebet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cor-

tex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma exci-
pitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili va-
se reponitur. Vis succi emollit, vulnera cōglutinat,
discutit collectiones coctioni repugnantes bibitur
etiam aut illinitur contra serpentium morsus, du-
ratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Cez-
lerimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro ar-
bor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita ta-
men est folijs sycomori, fructu pruni magnitudi-
ne, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Fici. Cap. CXLV.

Fici maturæ recentes stomachum ledunt, aliū
soluunt: sed faciliè contracta ab eis fluxio sisti-
tur: sudorem euocant, papulasq; sitim sedant, calo-
rem restinguunt. Siccis natura excalfaciendi, vires
alunt, sed sitim magis stimulant, aluo vtilis, rheu-
matismis ventris & stomachi contraria: gutturi
autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs, quos longa va-
letudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comi-
tialibus aptissimæ: seruæ factæ cum hyssopo & po-
te, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisq; pul-
monum vitijs conueniunt: aluum molliunt tuse cū
nitro & enico, dein manducate. Decoctum arte-
riæ & tonsillarum inflammationibus gargariza-
tu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus
miscemur, & in muliebres fetus cum fœnograeco
& ptisana, Ceterum cum ruta coctæ torminibus
infunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutunt, pa-

DIOSCORIDIS

rotidas & furunculos emollunt, panos ad maturat
tionem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addi
ta. Crude si cum antedictis tundantur, eadem effi
ciunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atra
mèto sutorio, deploratis fere tibiæ fluxionibus,
& cacoethicis viceribus medentur: quin & cum
vino decoctæ addito absynthio, & hordeacea fari
na, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum
cerato sanant perniones, prurigines, sonitusq; si cru
de terantur, et sinapi liquoreq; aliquo exceptæ au
ribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sativæ fici
lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concre
tumq; dissolvit, vt acetum: exulcerat corpora, meae
tus aperit, solvit aluum, vuluam recludit cū detric
ta nuce græca potus, menstrua ciet cum luteo oui
appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cas
taplasmatis cum farina fœnigræci et aceto vtilis:
lepras, lichenas, vitiligines, vitia cutis in facie, psoe
ras, vlcera in capite manantia, cum polenta expur
gat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, venena
torum ictibus & rabiosi canis morsibus auxilia
tur: prodest dentium dolori lana exceptus, & ca
vis eorum additus: verrucarū in formicationes tole
lit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem
præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui
lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tusi exprimū
tur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & suc
cus imponuntur exulceratorij medicamenti. Deco

Et cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem
afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis sol-
uat, si inter coquendum ficulneo surculo spathæ lo-
co moueatur.

Grossi.

Cap. CXLVI.

Grossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ, illitæ
strumas nodosq; omneis emolliunt: crudæ for-
micas, verrucas & thymos, nitro farinaq; additis,
tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & ace-
to vlcera in capite manantia, epinyctidas, & fur-
fures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & genarum
scabritiæ perfricantur. Nigræ ficus folijs caulicu-
lisq; candidæ vitilignes perunguntur, faciunt ad ca-
num morsus, & vlcera quæ ceria, id est fauos, vor-
cant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ossa ex-
trahunt, furunculos cum cera discutiunt, contra muris
aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo &
vino illitæ, auxiliatur. Fit ex cinere ficus tam sylue-
stris quàm sativæ lixiuium, crematis ramorum caulicu-
lis: quod subinde macerari opus est et inueterascere:
siquidē inter caustica intelligitur. Gangrænis pro-
dest: namq; expurgat & consumit, quæ excrescunt:
eoq; sic viendum est. Spongia assidue hoc lixiuium im-
buta superponitur. Interdum dysentericis, et in flu-
xiones vetustas, & sinus cuniculatim ex edentes,
magnoq; instillari conueniet. Etenim purgat, con-
glutinat, carne replet, & oras committit, non secus
atq; emplastra, quæ truentis vulneribus infiguntur.

DIOSCOR. LIB. I.

tur, enema vocāt. Bibitur ad discuticndum sangui-
nem concretum, & contra præcipitationes, rupta,
conuulsa, cum cyatho aque recenter colatum: addi-
to olei exiguo, cœliacis, dysentericis per se cyathus
datus prodest: neruorum vitijs, conuulsionibus com-
modè illiniuntur ex oleo, vtpote quod sudores moueat
aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus
bibitur. Hac eadem præstant reliqua lixiuia, præ-
sertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea. Cap. CXLVII.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens c-
bo idoneum, stomacho vtilem: in quo phalan-
gia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim
in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitis
sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodi-
derunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataq;
in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. Cap. CXLVIII.

Iberis, siue cardamantica, folia habet nasturtij,
vere virentiora: caulem cubitalem, aut minorem:
in incultis nascitur, æstate lacteū florem promit,
quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio
similes habet, calfacientes & adurentes. ipse enim
ischiadiacis cum salsa axūgia emplastri modo vti-
les, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas de-
scendatur, et postea oleo cū lana locus perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

Pedani

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA,

LIBER II.

IOANNE RVELIO SVESSIO
nensi interprete.



IN primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia cōdidimus, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; differimus. In hoc aut secundo de animalibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cū ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Echinus, siue erinaceus. Cap. I.

Marinus echinus stomacho vëtriq; utilis est: urinam cit, huius testa cruda inassata commodè medicamētis admiscetur, quæ psoras abstergunt: cremata vero cinis sordida vlcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat. Terrestris erinacei

H

DIOSCORIDIS

corium combustum alopecijs cū pice liquida aptissimè illinitur, asiccatum corpus & cum aceto mulso potum, renum vitij auxilio est. item aqua, quæ cutem subijt, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem vsus utilissimè reconditur.

Hippocampus. Cap. II.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut azungia seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

Purpura buccina, eorūque volutæ. Cap. III.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrecentiasque carnis cohibet, vlcera purgat, et ad cicatricem perducit. Adem præstant concremata buccina, sed volutæ videntur: si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentifricio cōueniūt: ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentū non oportet: nam postea quā vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modū induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus. Cionia vocantur purpurarum buccinorumq; mediæ partes, circa quas testæ volumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisq; facultatem vrēdi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obti-

uent. Buccinorum carnes ori gratae sunt, & stomacho utiles. sed aluum non molliunt.

Mituli. Cap. IIII.

Mituli lautissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum praebent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cetera quae oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

Tellinae. Cap. V.

Recentes tellinae aluo utiles, sed maximè ius earum salita vruntur, tamen in cinerem et cum cedria instillata, aulcos quos & renasci non patiuntur.

τὸ βλε
φάρον.

Chamae. Cap. VI.

Chamarum conchularumque in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus. Cap. VII.

Vnguis siue onyx conchilij tegumentum est, ei simile quo purpura integitur: quod in India nardiferis lacubus inuenitur. suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquam stagnantes aquae aestiuis caloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylo-
nicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambro

H ij

DIOSCORIDIS

odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus castoreū olent. Idem suffitu excitant fœminas vuluæ strāgulatu oppressas, comitialesq; poti ventrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit, quæ purpura & buccinum.

Cochleæ. Cap. VIII.

T Errestres cochleæ stomacho vtilis sunt, & non facile corrumpuntur. Optima Sardoniæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpibus, pomatia, id est operculares, cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur: fluuiatilis virus olet. Quæ vero vepribus frutetisq; glutinata coheret, quam vocant nonnulli sesilon, ventrem et stomachum turbat, vomitiones excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi & vrendi naturam sortiuntur: purgāt lepras, vitilignes, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si cum carne sua vstæ tritæq; ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exigunt: sed non antè soluantur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt, im pactos corpori aculeos illitæ euocant, menses tritæ & admotæ cient. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cū vulnera alia, tum maximè quæ nervi acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrenant: vine cor-

pus, & præsertim Aphricanæ, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat, trita cum testâ, vino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli vesicæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incômodos replicat, si quis abrafo aculêtoe eius, pilû attingat.

Cancrî.

Cap. IX.

CAncrorum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cû vino, magnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum sedisq; perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit: triti crudi, potiû ex asinino lacte, auxiliantur cõtra serpentium phalangiorumq; morsus, atque scorpionum ietus: decocti autem & cû iure esitati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt necant scorpiones triti, et cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verum inefficacius omnia præstant.

Terrestris scorpîo. Cap. X.

Terrestris scorpîo tritus & impositus, sue plage remedium est quin estur assatus, ad eadẽ.

Marinus scorpîo. Cap. XI.

Marini scorpîonis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus. Cap. XII.

Draco marinus dissectus & apertus impositusq; ietus spinæ suæ qua ferit, medela est,

H iij

DIOSCORIDIS

Scolopendra. Cap. XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos, sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis. Cap. XIIIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiā mulcet: eadē apposita euersam sedem prociduamq; coercet.

Viperæ. Cap. XV.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis asserunt, neruorum vitijs auxiliantur, incrementum strumas reprimunt: detracta autem cute caput caudaq; quoniam carne vacant, amputari debent, quippe commentitium est quod præcipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum vero corpus exemptis interaneis elotū dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui viperas esitent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem vipera in fictile nouū demittitur, adijciuntur salis caricarumq; tritarū, singulatim quinque sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem reconditur. Plerunque, ut ori gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

LIBER SECVNDVS. 60

Senecta anguim. Cap. XVI.

Senectus anguim in vino decocta dolori au-
srium, infusu, & detium collutione, auxilio est.
Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præci-
pue viperinam.

Lepus.

Cap. XVII.

Lepus marinus loligini parue similis est, qui
per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus
capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cere-
brum manditur, iuuandis tremoribus, qui valetu-
dine contracti sunt: affrictu aut cibo facilem in-
fantibus dentitionem præstat: exustum caput &
cum adipe vsino aut aceto illitum, alopeciarum
inantibus medetur. Leporinum coagulum post tri-
duum à concubitu potum, conceptum adimere, par-
tusq; spem intercipere proditur: vulua & alui fluo-
rem sistit, comitiales iuuat, contra venena ex ace-
to bibitur, præsertim aduersus cöcretum lac, & vi-
perarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur,
vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

Pastinaca.

Cap. XVIII.

Marina pastinacæ radius, qui eius cauda ena-
tus aduersis squammis reflectitur, dentium
dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.

Sepia.

Cap. XIX.

Sepiæ cocta dum estur atramentū agrè con-
coquitur, aluiū mollit, collyrijs è testa factis
conuenienter genarū scabritia perfricantur:

H iij

DIOSCORIDIS

ustum in sua testa donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitiligines, furfures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absorbit, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis. Cap. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque dissectus admoneatur.

Hippopotamus. Cap. XXI.

Hippopotami testes exsiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

Fiber. Cap. XXII.

Fiber ancipitis vite animal, plerunque cum piscibus & cancris ex aqua victum capeßit. Huius testes serpentium venenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinēt vsus: si quile menses ac partus ciūt, duabus drachmis cum pulgria poti: partus secundasq; eijciunt: cōtra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāque ex aceto bibuntur: lethargicos, & utcunq; uetero obdormiscētes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, ol factu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illi profunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus neruorum vitijs. In summa, calfaetoriam vim habēt. Eligi debent testes qui ex vno

LIBER SECVNDVS. 61

ortu connexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiuntur) liquore intus veluti ceroso, odore graui & virus re dolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniungentes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, quum venatu vrgentur: si quidem tangi nequeunt, ita, vt in sue, substricti. Operæ aut pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustella vulgaris. Cap. XXIII.

Mustela, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cū vino pota, aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius venterculus coriandro farctus inueteratusq; percussis à serpente, et comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ, iuuantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ. Cap. XXIIII.

Contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decocta edantur, iusq; earum itidē sorbeatur: cōtra inueteratos

DIOSCORIDIS

tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis profluens sanguinis impetus sistit, explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridum ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsorum instillatus: decoctus in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Silurus.

Cap. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem præbet alium: sale verò conditus, minimum suppediat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixæ corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desiderium fœtus adiiciatur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

Cap. XXVI.

Smaridis piscis caput exustum, excrescentes ulcerum oras puluillosque reprimat: nomas cohibet, thymos clauosque absumat. Caro non secus atque salsamentum prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.

Mænæ.

Cap. XXVII.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

Cap. XXVIII.

Gobius recens in suillum ventrem coniectus, si confusa rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub di-

no refrigeratus potui detur, alius sine molestia dei citur. Allitus contra serpentiū canumq; morsus auxilio est. Thunnus. Cap. XXIX.

Conditanei thunni caro, quā omotarichon vocant, sumpta iis auxiliatur, quos vipera nomine prester momorderit: sed oportet vinum quā plurimum subinde cogantur haurire, ita ut vomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè valet, canum moribus utilissimè illinitur.

Garum. Cap. XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo fons fiat, depascentia ulcera sistit: morsis à cane medetur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: nonnullis, ut exulcerata adurat: alijs autem, ad laceffenda, quæ ulcera non senserunt.

Ius piscium. Cap. XXXI.

Recentium pisciū ius, modo per se, modo ex vino potum, alui subducit. Priuatim ad hunc usum cōficitur è phycidibus et scorpionibus, et inlides: è percis, et recētibus alijs saxatilibus, nec viris resipiensibus, simpliciter cū aqua, oleo et anetho.

Cimices lectularii. Cap. XXXII.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: et citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt: vulnarum exanimationes olfactu reuocant: poti cū vino

D I O S C O R I D I S

aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: tritū
et vrinariæ fistulæ impositi, vrinæ angustias lenāt.

Millepeda. Cap. XXXIII.

Millepedæ, quæ sub aquario vase stabulātur,
animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ
contacta manu cōtrahuntur in orbem: hæ ex vino
potæ difficili vrinæ, & regio morbo auxiliantur.
Millepedas illini anginis cum melle vtilissimū. Tri
tæ, et in cortice mali punici calfactæ, doloribus au
rium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Blatta pistrinaria. Cap. XXXIII.

Blattæ eius, quæ in pistrinis inuenitur, intera
nea trita aut cum oleo decocta, aurium dolo
res instillatu mitigant.

Pulmones. Cap. XXXV.

Podagras pernionesq; emēdat pulmo marinus
recens, tritus & illitus. Suillus & agninus
vrsinusq; pulmo impositu attritus à calceamentis
contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus ve
ro si arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps
quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

Genitale cerui. Cap. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potum, à vi
pera demorsis auxiliatur.

Vngula asini. Cap. XXXVII.

Vngularum asini cinis per dies multos binis
cochlearibus potus proditur comitiales adus
ware, eadem oleo subactæ strumas discutiant: &

illitæ pernionibus medentur. Caprinarum cinere
perunctæ ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. Cap. XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & * super * κατ'
ungulas in flexu harum partium indurati cal ^{επιτρα}
li: qui triti & in aceto poti, comitialibus mederi ^{φην, non}
traduntur. ^{επιστρας}
^{φην.}

Iocinera. Cap. XXXIX.

A sini iecur inassatū esu comitialibus prodest,
veruntamen ieiunis edendum præcipitur. Ca
præ vero inassati decidua sanie, inūgi lusciosos pro
dest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius
vaporari prodest in cibo tostum ad eadem. Tradūt
hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Apri
num recens si arefactum teratur, ex vino potum
contra serpentium volucrumq; morsus auxilio est.
Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum & in ci
bo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aque
tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aque
pauores dentes eo, qui caninus dicitur. hunc a ca
ne, qui momordit, exemptum, & follicullo inditū,
pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum au
tem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis
potum, secundas pellit.

Coria veteramentaria. Cap. XL.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta
igni, intertrigines, necnon calceamentorum
attritus sanat.

DIOSCORIDIS

Gallinae

Cap. XLI.

Dissectæ gallina, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus, sanguinem à cerebri membrana profluentē sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea vero inter coquendum abijci solet) siccatur, tritaq; in vino convenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è vetere gallinaceo aluum deijcit. Abiectis itaque interaneis salem coniungi oportet, & consulo ventre decoqui in viginti sextarijs aquis, donec ad treis heminas redigatur. totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurias lem, onicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit prædest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, et inflationibus stomachi.

Quorum natura.

Cap. XLII.

Ouum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est: massatum sedis inflammationibus prædest, cum croco, & rosaceo: & condylomatibus: cum meliloto: cum urta autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum ovi erudum refrigerat spiramenta cutis occludit, in-

LIBER SECVNDVS. 64

flammationes oculorum infusum lenit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas nō sentiunt: faciem à Solis adustione tuetur, fronti impositum cū thure fluxiones arcet, auertitq; inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & uino, mitigat: utiliter contra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest uesicæ rossonibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Cicadæ.

Cap. XLIII.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, uesicæ doloribus profunt.

Locustæ.

Cap. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu urinae difficultates adiuvant, præsertim quæ scæminis malè habet: earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Teptiæ incolunt.

Ossifragus.

Cap. XLV.

Venter eius auis, quam Latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

Galerita.

Cap. XLVI.

Galerita amicula est parua, apicem in uer-

DIOSCORIDIS

tice, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuvat.

Hirundines. Cap. XLVII.

Dissectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuventa corio, aut cervina pelle brachio aut collo ad alligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti si cedula, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quam matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginae eo commodè perunguntur: vna & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipse & pulli exiccati, si drachmæ pōdere ex aqua bibantur, hos iuvāt, qui anginae morbo cōflicantur.

Ebur. Cap. XLVIII.

EBoris scobe illito paronychia sanantur. Vinæ adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. Cap. XLIX.

Svis talus cōburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus coli, longiq; torminibus medetur.

Cervinum cornu. Cap. L.

Cervini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & vesicae doloribus

c. 170

LIBER SECVNDVS. 65

cum tragacantha: sceminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerni cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, et defluxionibus salutare est: infriktum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruefactum in aceto, si eo gingiuæ colluantur, maxillarum à detitione dolor em adimit.

Eruca Cap. LI.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides. Cap. LII.

ERUMENTIS congestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec aëtu exanimentur postea lino transfixæ reponuntur. Potentissima omnes variæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ. Cap. LIII.

SIMILI modo reconduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intoste, reponantur. Vis omnium communis ero-

D I O S C O R I D I S

dere, vlcere, calorem elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferasq; lichenas & carcinomata sanant. Menses ciunt pectus emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quod urinam moueant. Alij penas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Salamandra. Cap. LIIII.

Salamandra lacerta genus est, iners, varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detrahitur pedibus & capite in melle seruetur ad eundem vsum.

Araneus. Cap. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, et linteo illitus, prolatusq; vtriusq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera, quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quem in aluta ligatum, et lacerto appesum, quartanis circuitibus mederi narrat. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

LIBER SECVNDVS. 66

Lacerta.

Cap. LVI.

Lacerta caput intritū, & appositū, aculeos, et oīa corpori infixā extrahit: varos, formicātes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocāt, tollit. Iecur exesis dēiibus cōiectū dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictis à scorpione leuamentum præstat.

Seps.

Cap. LVII.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

Seincus.

Cap. LVIII.

Cincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alūnus, quāuis inueniatur in Lydia Mauritāie.

Est aut terrestris crocodilus, sui * generis, sale inueteratus cū nasturtio. Aiūt carnes, quæ renes amplectātur, id sibi viriū vēdicasse, vt si drachmæ pōdere bibātur, venerē accēdant. Verū decocto lentis cū melle aut semine lactuæ cum aqua poto, veneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

ὅτι δὲ τοῦ
νῆς παρὰ
χρυσόμενος
ἐν καρχα
δαί.

Terreni vermes. Cap. LIX.

Terreni vermes īpositi, præcisos nervos glutināt, tertianas discutiūt: decocti cū anserino adipe, et īfusi, aff. ctis auribus medētur: cū oleo autē decocti, si ī cōtrariā aurē instillētur, dētiū doloribus īstāt auxiliū: triti ī potu ex passo urina cūit.

Mus araneus.

Cap. LX.

Mus araneus dissectus, et impositus, sui morsus veneficia luit.

I ij

DIOSCORIDIS
Mures. Cap. LXI.

MVres, qui in domibus eberrant, concios scorpionum plagis vtilissimè imponi, in confesso est si massatos infantes ederint, oris salivam exiccare promittunt.

Lac. Cap. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus alit, aluum emollit, Stomachum & intestina inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstiuo habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, crassum, & præpingue, non vsque adeò vtile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, veratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrem & stomachum subvertit. quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem caprae, quibus candidam veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: et eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Ventrè adstringit lac omne decoctum, præcipueque cædētibus calculis marinis exustum

LIBER SECVNDVS. 67

& in summa, omnibus auxiliatur internis exulce-
rationibus, præsertim faucium, pulmonis, intera-
neorum, vesicæ & renum: foris uerò contra pruri-
tum cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corpo-
ris succos, recens cum melle crudo, addito sale, da-
tur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunq;
semel seruesactum. Decoctum cū calculis marinis
ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiuvat.
Lac quodcunque serum continet implicitum, quod
vbi discessit à lacte, multò potentissimum ad pur-
gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia vo-
lumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comi-
tialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto
corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum,
id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo fere-
uet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparsis, post-
quam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi-
cyathis, quot sunt hemina lactis: ita enim ferescēs
liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum cōcreuit.
Sed cū feruet, ne superfundatur, conueniet spongia
ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sexta-
riumq; argenteum frigida aqua plenum demitte-
re. Bibitur heminis per intervalla singulis, vsque
ad quinas, ita vt intercedentibus spatijs, potantes
ambulent. Lac autem recens efficax est contra ro-
siones vstionesq;, ab exitialibus medicamentis fa-
ctas: vt à cani haridibus, aut salamandra, bupre-
ste, aut pinorum eruca, hyoscyami, dorycno, aconi-

DIOSCORIDIS

to, aut ephemero presertim bubulum ad id exiniē
confert. Gargarizatur autē exulceratis faucibus,
tonsillisq; . Asininū peculiariter collutos dentes gin
giuasq; stabilit. Fluxiones alui, si ulcera sentiātur,
tenesmosq; ouillum, bubulum aut caprinum cum
marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem &
cum hordeacea ptisana aut hālicaceo cremore in
fusum magnopere intestinorum resiones mitigat:
exulcerata uulue immittitur. Humanū lac dulcis
simum est, & maximē alit: mammis autem exu
ctum, prodest tabi, & stomachi rosionibus: cōtra
haustum leporē marinum præsidio est. oculis cruo
re ex ictu suffusis cū thuris polline instillatur: po
dagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum.

- Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitia
libus, uertiginosis, et neruorum uitio laborātibz.
febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis inter
dum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum
præbeat. Primi paræ canis lacte perunctos narrāt
glabrescere: potum contra uenena antidoti uicem
obtinere, abortus mortuos expellit.

Caseus.

Cap. LXIII

Caseus recens sine sale sumptus alit, stomacho
utilis est, et facile in membra delegatur: cor
pus auget, aluum modicē emollit: alius tamen alio
præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur.
Decoctus autem, & expressus, deinde in assatus, al
uum sistit: illitus, oculorum inflammationibus, &

sugillatis prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti præbet. corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisq; exhibet: uetustiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit, quam optimè canes aluntur. Quod hippacè uocant, caseus est equinus ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportionè respō let. Nec desunt, qui hippacen, equinū coagulū appellarint. Butyrum & eius fuligo. Cap. LXIIII.

ELacte pinguisimo probatū sit butyrum, quale ouillū est: sit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrū natura oleosum est & emolliens: unde liriū epotum, uentrē resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, cōtra uenena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat: ginginarū pruritus, et oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimētōrū facit corpora, & ab albidis pustulis per summa factentibus asserit. Contra inflammationes & duritias uulue, quod nec uirus resipit, nec uetustatē sentit, butyrum efficax est. dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur: in medicamēta addi solet, quæ pus mouent: utile præsertim cū nerui, aut cerebri membrana, uesica ceruix, uulnera acceperit. Ad aut purgat, replet, carnē creat, ab aspide percussis utilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem pēsāt, et adipis uice fungitur i bellarijs. Colligēda ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrū in lucernā no-

DIOSCORIDIS

nam ingestum acceditur, fictiliq; operculato quod
superne in siphunculi speciem desinat, & infima
parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, &
subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dñ co-
aceruetur fulginis modus, quem facere institueris:
penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in
medicamentis oculorum, exiccare & adstringere:
fluxiones cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem
perducit.

Medicina lanarum. Cap. LXV.

Succidæ lane molles, è collo foeminibusq; laudæ-
tissime habentur. Subueniunt inter initia vul-
neribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fra-
ctis, aceto, oleo aut vino imbutæ: si quidẽ facile suc-
cos combibunt quibus immerguntur, & ob pecudũ
sordem & sic enim œsypum vocant remolliunt: ca-
pitis, Stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum
aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Cremata
rum lanarum cinis crustas obducit, excrescentias
in carne cohibet, & vlcera ad cicatricem perducit.
Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cetero-
rum more, vruntur. Nec secus fimbriati marinarũ
purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum
sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq;
modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter
se distantia componunt, & concerptas carmina-
tasq; lanas olco ita suffusas, vt ne stillare quidem
possint, assulis tedæ subiectis, et eisdem lanisq; per-

LIBER SECVNDVS. 69

mutatim interstratis, leuiter succendant, & vstas tollunt. quod si è teda pix, pinguitudoñe vlla profu-
xit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medi-
camenta: cinerem in labellis, aqua addita, mani-
bus confricant, & considere patiuntur: idq; sepius,
mutantes aquam, donec linguam adstringat, nec
mordeat.

Oesypum.

Cap. LXVI.

OEsypum vocant Græci, succidarum lanarum
pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est:
Succidæ molles, radícula non curata, calida aqua
lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, &
in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur,
magnoq; ipetu ligula, vti respumet, agitur, aut li-
gnea rude validiusculè cõturbatur, quò largius sor-
dida spuma colligi possit, deinde marina respergi-
tur, considere pingui quod supernatahat. collectoq;
in altero fictili vase, denuò aqua in labellum fusa
agitatur: spuma iterum mari persunditur, & de-
mum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum con-
sumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet.
Collectum æsypum manibus emollitur, & si qua
insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sen-
sim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceat-
tur, donec admotum linguæ æsypum adstringat le-
uiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spec-
tetur: cum in fictili vase conditur. Verum omnia
feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi

DIOSCORIDIS

da aqua eluunt, & manibus non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis et sordibus quibuscunq; exēptis, ac lento igne in aeneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernat at collectam, aqua, ut diximus, lavant. colactumq; in sicilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque Soli mandant, donec calidū fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aquam effundunt, novamq; adiiciunt. Melius est læve, radicula non curatum, quod succidarū uirus oleat, & si manu in concha fricetur cū aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habēs: ueluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypū excalscit, explet ulcera, et emolliat: præsertim sedis ac uulue, cum meliloto & butyro: in uellere appositum, menses & partus euocat, ulcera non aurium modo sanat, sed et genitalium cū anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas, quæ occalluerunt, & ciliorū defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactū in cinerē pinguitudinē amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, uti demonstrauimus: quæ in oculorum medicamenta commodè adli solet.

Coagulum. Cap. LXVII.

Leporis coagulum tribus obolis ex uino, ueneratorum morsibus, celiacis, dysentericis, & foeminis fluxione uulue laborantibus, ac reiectionibus à pectore auxiliatur. Sanguinē in grana

LIBER SECVNDVS. 70

mos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant: potum uero partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulū, quam hippacen aliqui uocant, priuatim coeliacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, himuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, uituli, bubali que coagula similes naturas sortiuntur: cōtra acointi potum in uino, et concretū lac in aceto, conueniēter assumūtur. Himuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires representat: comitialibus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cū alterius animalis, tum præcipue agni coagulum, madauerit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur aut castulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. Cap. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uulvæ uitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, uulvæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, qua altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligent-

DIOSCORIDIS

ter vase, flagrantissimo Soli exponitur: eliquescent
inde humor in fictile alterū excolatur, donec adeps
omnis absumatur, mox loco vehementer frigido re-
conditur, & ad vsus digeritur. Alij fictile fulciunt
super aquam calidam, aut tenuem & elanguidā
prunam, quæ Solis vicem penset. Est & alia curā-
di ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq;
in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento:
mox lineo colo transfusus reponitur. Utiliter in me-
dicamenta additur, quæ lassitudines & fatigatio-
nes leuant. Suillus adeps & vrsinus hoc curantur
modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum de-
tractus, in largiore aqua cœlesti, & quā frigidis-
sima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus con-
fricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq;
nova aqua abluitur: ceterum fictili capacitatis du-
ple inditus, in aquam demergitur, & subditis leui-
bus prunis spatha mouetur: eliquatusque colo
transfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & gut-
tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quò facilius sæculentum vi-
rus pessum eat: postea in pilam spongia madesac-
tā transfunditur. Vbi coire cœpit, residens in imo
sordes eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur,
repurgatusq;, fictili benè operculato, per quā fri-
gido locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum,
cervinumq; ita curato: Elotum ex his quodcūque,

LIBER SECVNDVS. 71

tunicis (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pila emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem coni cito, & adiecta aqua, vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratumq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem suum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutum fuerit, in fictilem ollam coni ciendum, et marina aqua, quæ non minus do drante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ cere drachmis: excolatumq; detractis quæ pes sum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: opertumq; Soli interdiu credendum, vt ad candorẽ reducatur, & odoris virus enanescat. Priuatim taurorũ pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insper seris, liquefacito: dein in nitentem aquam excolato, & vbi concre scere cœpit, manibus iterum cõ-

DIOSCORIDIS

fricando vehemēter lauato, aqua ſæpius infuſa reſuſaꝑ; donec quā optimē elotum videatur: rurſus in olla cum pari modo vini odorati decoquito, & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni vaſe, ibidē ſinito pernoctare: poſtridie ſi grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, vino odorato perſundatur: eadem quæ prius ſiunt, dum omne virus euaneſcat. Colliquatur & ſine ſale, præſertim affectio- num earū cauſa, quibus ſal aduerſari ſolet, ſed ita paratum non magnopere albescit. Eodē modo par- dorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinū autem & vitulinum pingue, necnō ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odoramentis imbui- tur, hac ratione: Pingue, quod odoratū reddi debet, demptis, quæ diximus modō, membranis, elotum & vino quā odoratiſſimo, nulla maris aqua di- luto, ferueſactum, pernoctare ſinitur: alterū id ge- nus vinum eadem mēſura infunditur, colliquatur, & exquisitē colatur: nouemq; eius heminis, iunci Arabici ſeptem drachmæ. Quod ſi ipſum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiꝯ ſc- drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & caſiæ modis adduntur: & xylobalsami, aſpalathi ſingu- læ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi, ſingule vnciæ: omnia exactius tunduntur, & af- fuſo vino odorato, in vaſe operto, quod ſupra car- bones firmiter collocatum ſit, ter efferueſcunt, & ſemoto ab igne vaſe in ſi pernoctant: poſtridie vi-

um effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur:
 Ter simili modo bene conferuescat. Deinde matuti-
 nis exempto adipe vinum effundatur, & abluto
 vase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. Po-
 stremo eliquatum pingue & excolatum, ad vsus
 reconditur. Hoc autẽ modo odoramentis imbuitur,
 quod antea curatum est. Verum antè dicta prius
 inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum
 vires adsciscant. Ataq; assumens quodcumq; horum
 voles, cum vino seruefacito, inpositis vnà myrti
 ramulis, serpyllo, cypero, item aspalatho plenius tu-
 so. Aliqui tamen ad hunc vsus, vno duntaxat ho-
 rum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exẽ-
 ptum leniter, & linteo colatum, aromatis, vti ex-
 positum est, imbuitur. Adipibus spissamẽta sic fiũt
 (quemcumq; acceperis, oportet ut recens tundatur)
 Sincerus & sanguinis expers adeps, reliquas ha-
 bens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam
 demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod
 semipedis altitudinem superet: lẽto igni seruescat,
 dum uernaculus odor aboleatur, planeq; vinum re-
 doleat. At ubi deposito vase refixit, due adipis
 minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sex-
 tarij, & seminis loti, eius, inquam, cuius è ligno
 ludicra tibie factitantur, tusi minæ quatuor adij-
 ciuntur: lento igni subinde miscendo decoquantur
 cũq; odoris uirus euanuerit, excolatusq; adeps refri-
 xerit, una contusi aspalathi mina, cum amaraci-

DIOSCORIDIS

ni floris minis quatuor, & vetere vino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue. Post tridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, una feruescunt, quousque & vim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquesces colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisime myrrhæ vino macerate, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Callinaceus anserinusque sic odoribus imbui solent: Cuiusvis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: erysi sceptri, xylobal sami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singulorum fescucia admiscetur: vini Lesbij veteris cyathus unus adijcitur: ea ter effervescent prius, mox vase sublato ab igne, die noctuque refrigerantur: post tridie liquata per linteum crassum, mundum in vas excolantur. Vbi vero adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & vrsinus, ceterique id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo: Curati quam optime adipis, præsertim taurini, mina una, tempestinique sampsuchi exquisitè confracli, sesquimina miscentur

LIBER SECVNDVS. 73

ſcentur, & inſperſo largiore vino degeruntur in of-
 fas, quæ in vaſe cooperto nocte quieſcunt: matutini-
 nis in fictili olla leuiſculo igni, affuſa aqua, leui-
 ter coquuntur: dumq; ſuum adeps odorem exuerit,
 defœcatus ac bene opertus, nocte tota permanet: po-
 ſtero die deterſa ſorde, quæ peſſum ierat, ſampſuchi,
 vt dictum eſt, contuſi iterum ſeſquimina priori pa-
 ſtillo adiicitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs
 quæ diximus peractis, decoquitur & colatur: & ſi
 quæ fundo hæſit ſpurcitia, deraditur, & frigido lo-
 co reconditur. Siquis tamen incuratum adipem an-
 ſerinum, gallinaceum, aut vitulinum, à putredine
 tueri velit, ita faciendum eſt. Quemuis adipem dili-
 genter elotum & ſiccatum in vmbra ſuper cribrum,
 per lintea munda manibus vehementer exprimat,
 linoq; conſutum vmbroſo in loco ſuspendat, & poſt
 multos dies noua charta inuolutum, frigido loco re-
 condat. Pinguia autem indito melle vindicantur à
 putre linis vitio. Vis omnium eſt excalfacere, molli-
 re, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus, & vituli-
 nus aliquantum adſtringunt: earundem virium com-
 pos leoninus: nam reſiſtere eum aiunt ijs, qui inſidias
 moliuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, ſerpē-
 tes fugiunt. Adſtringētior eſt caprinus: qua ex cau-
 ſa decoctus cum polenta, rhoe, & caſco, dyſentericis
 datur, & cam ptisanæ ſucco inſunditur. Ius deco-
 cti phthiſicis in ſorbitiōibus prodeſt. Datur quoq;
 vtiliter ijs qui catharidum venena hauſerūt hirci-

K

DIOSCORIDIS

nus, ut qui ualidissimè discutiunt: podagricis auxiliatur, cum fimo caprae & croco impositus: huic proportionè respondet ouillus. Suillus uerò contra uulua & sedis uitia idoneus est: ambustis igno medetur. E sue uetustissimus quisq; sale conditus excalfacit & emollit: elotus uino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corporis cōcolores reddere. Anserinus galinaceusq; cōueniunt mulieribus malis, et ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, et contra aurium dolores. Ursinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Felmatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquescant, et melli admisceantur. Viperae adeps cōtra oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo uetere: pilos alis emulsos perunctis radicibus recens et per se illitus obliterat, atq; renasci non patitur.

Medulla.

Cap. L X I X.

Laudatissima est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Collicuntur aestatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, in quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullae molliunt,

calfaciunt, rarefaciunt: ulcera explēt, ceruina per-
unctos uenenata fugiunt. Curātur recentes, adipis
modo, aquae respersu subactae, scelectisq; ossibus
tantisper elotae, et in linteum expressae, donec aqua
syncera emanet: et deterfa sorde penna, si qua in-
natet, liquatae in duplicato, uase in pilam exprimū-
tur: & ubi coire, omni faece, quae ad ima sedit, dera-
sa fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas
reponere, facito omnia quae de anserum & gallina-
rū adipe demonstrauimus.

Fel.

Cap. LXX.

FEl omne curatur hoc modo: Recens praeligato
ore folliculi lino tandiu demissum in feruentē
aquam, dum quis spatium trium stadiorū percur-
saret, mox exemptum siccatur umbroso loco, asper-
ginem nō redolente. Sed quod ad oculorum medica-
menta adijci solet, ligatū lino in uitreum uas, quod
mel habeat, immittitur: circūuoluto ad os uasis li-
ni principio, et operto uase reconditur. Est enim uis
omnium acris et exalfaciens intensis tamen et re-
missis uiribus differunt: si quidem praestantius in
effectu esse uidetur sel marmi scorpionis, & piscis
qui callionymus appellatur, marinae testitudinis,
hieneq; item perdicis, aquilae, gallinae candidae, &
syluestris caprae: quod priuatim prodest cōtra sus-
fusiones incipientes, et oculorū caligines, argemas,
et genarum scabritias. Onillo, suillo, hircino atque
ursino, taurinū multo efficacius. Felle omni persas-

K ij

DIOSCORIDIS

cilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tormentum aut fimbriam sedi subijciat. Priuatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis vlcera sanat, & ad cicatricem usque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur, & si bilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris & circumlitionibus, quæ contra venenata parantur. Phagedænicis vlceribus, colicis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optime purgat. Ouillum & vrsinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus indutum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitus reprimit. Suillam autem contra aurium vlcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

Cap. LXXI.

Sanguis anseris, anatis & hœdi, vtilissime in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lasciosisque illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis inassatus sartagi-

LIBER SECVNDVS. 75

nè, dysenterias & coeliacorum profluvia sistit. in vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginēsq; emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinae autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq;. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, septica vocât. Sanguine chameleonis genarum palpebras euellô creditum est. Hoc enim viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlito conceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier menstrua supergrediatur: leuat podagra dolores & ignem sacrum, illitus.

Fimum.

Cap. LXXII.

ARmentarie bouis fimum, si recens admouatur, vulnerum inflammatione: mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu compestcit: illitum ex aceto duritias, panos, & Arumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentes vulua reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

K ij

DIOSCORIDIS

Fimum caprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emēdat: mēses cit cum oloramentis haūstum, & partus euocat: tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, scēminarum profluvia sistit, ceterosq; sanguinis impetus ex aceto cohibet: medetur alopecijsexustum, & cum aceto aut oxymelite illitum: cū axungia uerò impositum, his, qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morsibus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadiciustionem hunc in modum accipiunt: In eo interstitio ubi pollex brachiali committitur, caua uelut lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruentes stercoris caprini pilule imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare: adustio id genus Arabica appellatur. Ouellum ex aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles uerrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syuestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit: uetustum lateris dolorē mulcet, adrupta & conuulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum quàm equorum fimum siue crudum siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba pascitur, siccam fimum liquatum in uino, mox

potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius ei excalfacit et urit, cum hordeacea farina mistū strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cū melle, lini semine & oleo: ambustis igni medetur. Galinaceum uerò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra uenena fungorum, et coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, ad opocijs medetur: cum thur & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat, sicco ex melle angina perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent, quæ cū teritur, fermenti acorem quidam tenuis refert. Adu terant eaq; sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile uendunt. Alij amyllum aut cimoliam miscent, et adscito anchusæ colore per rarum cribrū paulatim

DIOSCORIDIS

tim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea veneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum Stercus caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Urina.

Cap LXIII.

Humanam urinam suam cuique bibere, cōtra viperæ morsus, ac venena, incipiētemq; aquā inter cutem proderit scorpionis, viperæ marinorū, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus et lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manantia, fursures, psoras, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit nomas, & precipuè genitalium: cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decocta q; in calyce mali punice, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur decocta in aereo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illitu ignem sacrum mitisgat feruesfactum cum cyprino, inditumq; vuluæ dolores mulcet: strangulatus lenat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicae calculos, & potu expellit. Caprina ad aquamque cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum

extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitijs mederi. Lynceis vrinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coiréue in calculi duritiam, vulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Ad potum ex aqua, Stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asinine vrinae potu renu vitia sanari traduntur.

Mel.

Cap. LXXIIII.

P Rincipem locum obtinet mel, quod Atticae regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleu. Magis probatur dulcius & acre, odoratus, subflauus, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod obsequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergerendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera sinusq; commodissime infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum, item aurium sonitui et dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & foeda capitis animalia illitum necat, nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum calis

Mellis

proba-
tio qua-
lis.

Vulgaris

Vesicae pel-
lis a p[ro]prio

DIOSCORIDIS

ginem discutit, faucibus, tonsillis, anginae collutū
gargarizatū me medetur: urinam ciet, auxilia-
tur tussi, & à serpente percussis: contra haustum
meconium, cum rosaceo calidum assumitur: aduer-
sus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus in-
ctum aut potum proficit: crudum tamen aluum in-
flat, tussim laceßit, & ea de re despumati usus ap-
tior est. Primatum tenet in mellis genere uernum,
deinde aestiuum: hybernium uerò, utpote quod cras-
sius constet, deterimum reputatur, ceraginis hali-
tum expirat. Quod in Sardinia gignitur mel, ama-
rum est: quoniam apes inibi absynthio uescantur
quo uitia cutis in facie & macule aptissime per-
unguntur. Heracleæ in Ponto quibusdam anni tem-
poribus, propria quorundam florum dote, mel con-
flatur: quod qui edere, mente abalienantur, ac su-
dore disfluunt. Remedio sunt, esitata ruta, & sal-
samenta, aut epotum mulsum, resumpta, quoties
uomitione reijciuntur. acre autem est, & olfactu
sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, sce-
minarum cutem emendat, & cum sale sugillatio-
nes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod
saccharon nominatur. In India uero, et felici Ara-
bia in arundinibus inuenitur: salis modo coactum
est, dentibus, ut sal, fragile, alio idoneum, ei stoma-
cho utile, si aqua dilutum bibatur: uexatæ uesicæ
renibusq; auxiliatur, illitum ea discutit, quæ tene-
bras oculorum pupillis offundunt.

Mel Sar-
doni ama-
rum.

Saccha-
rum.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, et halitū quadāmtenus mel leū referens, natione Pōtica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candidās, et suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radiat album sincerumq; atq; transfundūt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petite, inspersoq; niri momēto decoquūt: eumq; iterum tertione inferbuit separatiū uas refrigerant, ac ceræ pastillū eximūt, deterfa sorde, si qua fortē adhæsit: tū denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: et uase dēpto ex igne fundum ollula nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, et quàm minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiatur. Orbiculi lino consuti, internacate spatia, suspendūtur, et iterdin, cōtinuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem faciliari, & identidē recoqui opere pretiū est. Nec desunt, qui pro marina, in murina quam accerrima semel aut iterum excoquāt. dein laguncula tenui, rotūda ansam habēte, extrahūt: postea orbiculos, substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec cādorem summum cōtraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus vere,

DIOSCORIDIS

cū sol remissa vehementia humorem pariat, vñ
nō facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, mo-
dice explet corpora: datur in sorbitione dysenteria-
cis ac milij magnitudine decem grana cere hau-
sta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Propolis. Cap. LXXVI.

Propolis eligi debet flava, odorata, styracem re-
ferens, in vehemente ariditate mollis, & mas-
siches more ductili. Magnopere calfacit, & euo-
cat: aculeos, et omnia infixā corpori extrahit, in ve-
tere tussi suffita proficit, impetigines admota tollit
ea in alueariorū foribus, cerosæ naturæ inuenitur.

Triticum. Cap. LXXVII.

Optima ē tritici generibus ad secundā valetus-
dinis vsus habentur, quæ recentia, & iā per-
fectē adulta, colorem luteum referunt. dein se-
quuntur trimēstria, quæ nonnullis sitania nomi-
nātur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignūt,
canum morsibus profunt, mansa & imposta: con-
fectus eorum similagine panis, plus alit, quā cū-
barius, ē trimēstrium farina panis leuiorem cibum
præbet, & qui facile in membra demandetur. Fac-
rina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduer-
sus nervorum fluxiones, quas Græci rheumatise-
mos vocant. Item contra interaneorum inflationes,
lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in
acri aceto decocti, turgentes mammas sedant vi-
perarum ictibus auxiliantur, & torminosi pro-

LIBER SECVNDVS. 79

sunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahē
diq; vim habet priuatim callos pedum, clauosq; ex-
tenuat, et cetera tubercula furunculosaq; ex sale cō-
coquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra vene-
natos iētus cū aceto aut vino cōmodissimē illinitur:
eadē si decocta inglutini modum delingatur, cruen-
tis excreationibus proderit: contra tussim, & exa-
speratus arterias, cū mentha & butyro decocta, ef-
ficax est. Tritici pollensi. ex aqua mulsa, aut hydre-
leo decoquatur, omnem discutit inflammationem.
Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsa inflā-
mationes omnes illitu mulcet, cum emolliat, et qua-
dāmtenus refrigeret. sed herbis succisue huic rei ac-
cōmodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adie-
ctis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens
muria maceratus, illitu vetustas ipetigines sanat.
Glutinum ex similagine, et polline, quo chartæ glu-
tinantur, sanguinē excreantibus prodest, si liqui-
dus ac tepidū cochlearis mensura detur sorbendū.

Hordeum. Cap. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purū me-
que: id minus quā triticum alit. Ptiſa-
na tamen ob cremorem in decoctione red-
ditum, plus alimenti præbet, quā polenta ex hor-
deo facta. Contra acrimonias atq; gutturis scabri-
tias, exulcerationesq; pollet. quibus etiā triticea pti-
sana præsidio est: sed plus alit, magisq; urinā mo-
net. Lac abundē suppeditat, si cū feniculi semine de-

DIOSCORIDIS

cocta sorbeatur. Hordeum absterget, urinā ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumore concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsā aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; discutiat: duritias cum resina, & simo columbarum concoquit: cum melioto autem, et papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cū lini semine, foenograeco, et ruta, illini iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, et impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut uino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus, cū cotoneis aut aceto prodest. decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita lepris medetur. Cremor uero farinae ex aqua, atq; cum pice, et oleo decoctus, puri mouēdo est: cum aceto subactus itidē, et cū pice, cōtra articulorū fluxiones prodest. Farina ex his aluū cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum. Cap. LXXIX.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit, renes & nervos tentat membranis, praesertim cerebrum uēstiētib; officit. inflationem parit, uitiosum succum creat, elephantiasin gignit, persusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi. Cap. LXXX.

Fit & ex hordeo potus, quē curmi nominant,

LIBER SECVNDVS. 80

eoq; saepe potu pro uino utuntur: uerum dolorē capitis mouet, malū succum gignit, neruis nocet. Con similia etiā potius genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quae occidentem spectat, & Britannia.

Zea seu semen. Cap. LXX XI.

Zea duorum generum est: una simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iungit. Vulgo splet a. Et gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

Crassior farina. Cap. LXXX II.

Crimnon crassior est ex zea triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abundē alit, facile conficitur, aluum uehementius adstringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. Cap. LXXX III.

Eidem generi siligo adscribitur, sed minus alit, quanto nutrit: in panes, ut zea cogitur. Fit quoque ē siligine crassior farina, quam Graeci crimnon uocitant.

Athera. Cap. LXXX IIII.

Athera ex zea fit tenuissimē molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

Tragos. Cap. LXXX V.

Tragos quandam halice frugis figuram gerit: multo minus, quam zea nutrit, quod multum aceris habeat, quare egrius conficitur.

DIOSCORIDIS

aluumq; magis emollit.

Auena. Cap. LXXXVI.

AVena, genicula quedam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeum. Pulte huius aluus sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. Cap. LXXXVII.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum suppressit.

Halica. Cap. LXXXVIII.

Halica fit ex zeu, quam dicoccon appellauimus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longe vtilior. decocta in aceto illitaq; lepras tollit, vnguium scabritias extricat, incipientibus & gilopys medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium. Cap. LXXXIX.

Milium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum, urinam cit. Torretur milium, seruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur, auxilio sit.

Panicum. Cap. XC.

Panicum, frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. eodemq; modo in panes subigitur:

LIBER SECVNDVS. 81

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & in-
trit, & stringit.

Sesama.

Cap. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus graui-
tatem facit, quoties inter mandendum commis-
suris dentium inhaesit: nervorum crassitiem illiti-
discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflam-
mationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus:
capitis dolores, qui estuatione concitantur, ex rosa-
cea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, præ-
sertim inflammationibus oculorum doloribusq;
prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium.

Cap. XCII.

Lolium, quod inter segetes nascitur, molitum,
illitu nomas, putrescentia vlcera, gangrenasq;
emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto fe-
ros lichenas, & ex aceto, et sulphure viuo, lepras:
strumas quoq; discutit, cum fimo columbino, & li-
ni semine decoctum in vino: rupit, quæ ægrius ad co-
ctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, uti-
lissimè ischiadicis illinitur: si cū polëta, thure, myr-
rha, aut croco suffiatur conceptionem adiuvat.

Amylum.

Cap. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod si ne mo-
la fiat. Optimum ex trimestri natione Cre-
ticum aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli hæc
est: Purgatum trimestre triticum madefacit quin-
quies die, &, si fieri potest, nocte: cum emollitum

DIOSCORIDIS

fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur, vbi mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teritum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximēdi, reliquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis cōfestim torreatur flagrantissimo in sole: nāq; si paulisper vdim maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cana q; vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, laetitia atq; obsonijs admiscetur. Fit etiā amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farina modo manibus subigitur: pressaq; feruētissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius ī medicina vsus, ad alia tamē cōueniēs.

Fœnumgræcum. Cap. XCIIII.

Fœnigræci farina vim habet emolliendi discutiendique: in aqua mulsa decocta aduersus tā internas, quā externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, sicū anserino adipepesti vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentiētibz. Decoctum eius prodest aduersus tensesmos,

foetidamq; dysentericorum proluuiē. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & genitaliū cicatrices absterget.

Linum.

Cap. XCV.

Linum vulgò notum est, cuius semen easdem, quas foenumgræcum, vires habet. Discutit, et emollit omnem intus forisq; inflammationem, cū melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie varosq; crudum tollit, illitum cū nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasq; discutit: vlcera, quæ serpunt, fauosq; cū vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectorij extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituat: tussim lenit, venerem stimulat: si farina piperris, & melle exceptum, pro placentia largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vulnūq; erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vulnū inflammationes in defensionibus perquā vtile.

Cicer.

Cap. XCVI.

Cicer satium aluo idoneum est, urinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menses ac partus expellit, lac auget, cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas infectiones, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginesq; contra carcinomata, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, cum melle & horum Cicer adeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur rictinū.

L ij

DIOSCORIDIS

tur: utrumq; cit vrinas, dato cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tagunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs sativo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod sativum præstat.

Faba.

Cap. XCVII.

Faba inflationem excitat, ægrè concoquitur, tum multuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cū suo cortice esitata, dysenterias, et cœliacorum profluvia sistit: contra vomitiones cōuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cōcolores facit, turgentes grumoso lacte mamas, etiam si inflammatione tententur, adiuvat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum scenigræci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, vuasq; reprimat: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertēdas fluxiones, frō

ti illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quò tardius purem erumpat, pueris imò vètri illinitur: vitiligine purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post emulsionem renascuntur, gracilesunt, & minus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo ipositi cortices, strumas discutunt: decocto earum lane inficiuntur. Faba depto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi, solet sanguinis defluxionibus ab hirundine concitatis: nanq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. Cap. XCVIII.

Aegyptia faba, quam aliqui Ponticā vocāt, in Aegypto * plerunq; prouenit: in Asia ēt Ciliciēq; laculus inuenitur. Folia habet ampla * etiam si ad arborum frondes cōparentur, caulem cubitalē, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine: & vbi flore exuitur, fert folliculos vesparum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullae modo, prominet. Ciborion aut Cibotion ideò nomināt, id est arculam, quoniā seratur ipsa, humenti glebae madata, et ita in aquā demissa. Radice firmatur harum dine crassiore, quae cruda coctāue estur: ei colocasia nomen est. Faba virens manditur, et exiccata nigrescit, vulgare magnitudine superat. Adstringēdi facultatē obtinet, et stomacho vtilē: dysentericis, coeliacisq; prodest, insperso, polēta vice, lomē

* ολεος id ē
 * plurima
 * Sic
 Plin. lib.
 21. c. 15
 Graecus
 habet,
 ος νετρα
 ου id ē
 istar galieri.

DIOSCORIDIS

to: datur quoq; in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si tenui inale cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

Cap. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, egrè coquitur, stomachum malè habet, eūq; & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi: qua ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primaq; aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmōi inutilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis aut mespilis, sorbifue, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionē abijciuntur, vel ruarum rhois, quæ absonijs inspurguntur. verū acetū cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionē stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, et illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in

aceto duritias & strumas discutit, cū cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, et hic quæ serpūt, igni sacro, peritionibusq; ut antea dictum est: cōtra mammas, in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Phasioli.

Cap. C.

Phasioli iſlāt, spiritus ciēt, egre coquūtur. Virides cibo aluū emolliūt, ad vomitiōes idonei.

Eruum.

Cap. CI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, an- Officinis
gusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, orobus,
e quibus farina sit, nomine eruina, ad medendi græca ap
vsus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluū pellatiōe
esu turbat, sanguinem per vrinam extrahit, elixo vocatur.
boves saginantur. Parande farine ratio hæc est:
Vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscen-
doque aqua respergunt, donec sufficienter combi-
bant: postea torrentur, vsque dum hians cortex
disrumpatur, molitaq; , farinario cribro incernun-
tur, postremò farina reconditur. Hæc aluo vtilis
est, vrinam ciēt, meliorem colorem efficit, sangui-
nem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-

L iij

DIOSCORIDIS

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cū melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie & maculas totūq; corpus emendat: nomas, gāgre nas, duritiasq; serpere nō palitur: māmaram duritias emollit, atra vlcera, quæ theriomata vocāt fauosq; emarginat, carbunculos rūpit: cum vino subacta illitu morsibus viperarū, canū, hoīumq; medetur: vrinae difficultates tenesmosq;, ex aceto mitigat. Eruunt tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptū, sumptumq;, conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini.

Cap. CII.

S Atius lupinus notus est: cuius farina cū melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, et cū sua amaritudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodē vlcera tetra, quæ theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiē, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimum. Menses et partus extrahit, cum myrrha et melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuorēsq; corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit, strumas in aceto cocta illitaq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua,

donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita vt tepente decocto abluantur. Cit vrinā radix cum aqua cocta. Lupini triti vbi maceratu dulcescere coeperint, cum aceto poti, fastidiū detrahunt, & cibi auiditatem faciunt. Gignuntur & syluestres lupini, satiuis similes, sed omnino minores, qui eadem, quæ satiuū possunt.

Rapum.

Cap. CIII.

DEcocta rapī radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem stimulat: decocto podagre, pernionesq; fouentur, cōtritoq; rapo atque imposito iuuantur: si excauatæ radici rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet, Cymæ eius decoctæ māduntur, & vrinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodina vocāt, idoneum est: potum contra venena salutare est, venerem concitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit: sed multo magis appetentiam recreat. Syluestre rapum in aruis nascitur, & fruticosum incubi & Vox ti altitudinem assurgens, ramosum, læue: in cacumine folia fert lævia, digitali latitudine, aut maiora adiecit. & fructum in siliquis calyculatis: cumq; eorū inuolucra aperiantur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina parua concipiuntur, feris nigra, intus alba.

DIOSCORIDIS

Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, utimur: præsertim q̄ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solēt.

Napus.

Cap. CIIII.

COcta napi radix inflat, modicum alit. Semē eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

Cap. CV.

Radix (que Græcis raphanus dicitur) exal-
facit, flatus gignit, ori suavis est: sed stoma-
cho aduersatur, ructus ciet, urinam pellit, aluo
aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis
eius distributionē adiuvet: quum aut præsumitur,
cibum suspendit: quare vomituris cōmodissimè da-
tur ante cibum. Sensuum aciem excitat: decocta cō-
tra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pecto-
re, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vo-
mitiones mouet: hydropicis cōmodissimè illinitur,
lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & uomas
amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alo-
pecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea fa-
rina emendat, his qui fungis strangulantur, tam
cibo quàm potu salutaris est. Semē vomitiones fa-
cit, urinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cū
aceto illitum gangrenas validissimè emarginat:
coctum cū aceto mulso anginis perquam utiliter
gargarizatur, cōtra cerastis morsus, potum ex vi-
no, auxilio est. Sylvestris raphani, quam Romani

LIBER SECVNDVS. 86

armoraciam vocāt, folia satiuo similia, sed magis
lampsanam imitantur: radix gracilis, & tenera, & μάλα
subacris. Tam foliū quā radix in olera recipitur: καὶ id est,
sed hæc excaľfacit, vrinam concitat, æstiosa est. mollis.

Sifer.

Cap. CVI.

Sifer vulgo cognitū, cuius radix decocta ori gra-
ta est, & stomacho utilis: vrinam ciet, & ap-
petentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. Cap. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant,
quod in acutum tendit, dura habens extre- Officiis
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi lapatiū.
dissimilis. Tertium genus syluestre, paruum, plan-
tagini proximum, humile & molle. Quartum est
quod alij & oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon
vocant. Folia eius syluestri ac exiguo rumici simis & Aceto-
lia, caule non magno, semine subacuto rubente, sa-
acri, in caule & agnatis appendicibus, emicante.
Omnium decocto olere aliis emollitur. Crudi illis
tu, melicerides, rosaceo aut croco adiecto, discus-
tiuntur. Syluestris & oxylapathi, & eius, quam
oxalida nominant, semen ex aqua aut vino utili-
ter bihitur, contra dysenterias, & coeliacorum af-
fectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu pa-
tietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, le-
pras, impetigines, & scabrosos vngues persanant:
sed antea locus aceto & nitro in sole perfrican-

DIOSCORIDIS

dus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si
 foveatur, aut in solijs balneari confricetur. Coctæ
 in vino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem
 mulcent, strumas parotidasq; discutunt, lienem cū
 aceto extenuant. Aliqui amolien. lis strumis radi-
 cum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tri-
 tæ & admotæ fœminarum profluvia sistunt: cum
 vino autem potæ regio morbo medentur, calculos
 vesicæ comminuunt, menses cient, scorpionum iētis-
 bus auxiliantur. Hippolapathonolus est magnum,
 in paludibus nascens: easdem habet vires, quas su-
 pradiēta rumicis genera.

Lampſana. Cap. CVIII.

L Ampſana syluestre olus est: plus alit quàm ru-
 mex, & stomacho vtilius. Cuius folia can-
 lesq; coquuntur in cibo.

Blitum. Cap. CIX.

B litum estur oleris modo, aluo vtile est, nullius
 in medicina vsus.

Malua. Cap. CX.

M Alua satina, esui longè aptior syluestri: sto-
 macho aduersatur, aluum iuuat, sed multò
 magis caules: interaneis & vesicæ vtilis. Cruda fo-
 lia cum salis exiguo manducata, ægylopas ex mel-
 le sanāt: verum cū cicatricem trahere cœperint,
 ea denum: citra salem vtendum est. Cōtra aculea-
 tos apium vesparumq; iētus illita efficax est. eadē
 cruda cum oleo irita peruncti, non feriuntur. Vlce-

ra manantia in capite surfuresq; cū vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaq;, vtilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in seffione mollit prodest erosionibus vesicæ, et intestinorum, vuluæ, sedisq;, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia venena auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est, lac euocat. Semen in vino potum addite loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

Atriplex.

Cap. CXI.

Atriplicem aliqui chrysolachanō vocant, cognitum olus est. Duo eius genera, sylvestre et satiuum. Coctum estur, vt olus. Aluum mollit, panos discutit, siue crudū, siue coctum illinatur. Semē cum aqua mulsa potum, regium morbū sanat.

Brassica.

Cap. CXII.

Brassica satiuā aluo est idonea, si modo leniter serue facta edatur (nam percocta aluū sistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur) stomachum autem malè habet: acrior est æstiuā. In Aegypto propter amaritudinē nō estur. Cecutiētibus, & tremulis esse prodest: summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxā restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus aluum mollit: cum vino quoque

DIOSCORIDIS

epotus viperarum morsibus auxiliatur: cum fœ-
nigræci farina podagris & articulorum vitijs il-
linitur: prodest & sordidis vlceribus & vetustis
illitus caput purgat naribus infusus: menses extra-
hit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illi-
ta, aut cum polenta trita, conferunt inflammatio-
nibus, tumoribusq;: epinyctidas, ignem sacrum, le-
prasq; sanant, carbunculos ex sale rumpunt: fluen-
tēs capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus
depascentia vlcera, gangrenasq; valent, lienosisq;
ex aceto cruda profunt. Mansa, deuorato succo, res-
tusam vocem instaurāt. Decoctum eius potu, aliu
& menses ciet. Flos post cōceptionem in pessa sub-
ditus, partum abortiu vtiat. Semen eius, præsertim
quæ in Aegypto nascitur, potum timeas repellit: in
antidota iheriaca additur. faciei cutem lētiginesq;
expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, et
adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolo-
res mitigant.

Brasica syluestris. Cap. CXIII.

Syluestris brassica, maritimis præruptisue
locis, magna ex parte gignitur: satiuæ simi-
lis, sed candidior, hirsutiorq; , amara: cuius
cyma in lixivia cocta, ori non insuavis. Folia illitu
vulnera conglutinant, & inflammationes tumo-
resq; d'scutiunt.

A N N O T A T I O.

Contendunt doctissimi quique eā esse

herbam, quam vulgò Soldanam, aut Soldanellam vocitant: quæ certè aristolochiâ rotundam, vt à Dioscoride hic depingitur brassica marina, folijs adamussim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adiiciatur, mendosum planè suspiciamur, ac fortè pro $\mu\alpha\chi\rho\alpha$ vt Græci codices habent, legendum $\mu\iota\chi\rho\alpha$ id est, parua: quod & ipsum Soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ folijs similia: quæ cum ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinata ferè esse rotunditatis, sæpe cōperimus. Suū tñ cuique in hac re esto iudiciū.

Brassica marina. Cap. CXIIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeūt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucò, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniâ cum pingui carne.

Beta. Cap. CXV.

Beta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cum lenticula, vt ventrem sistat: quod

DIOSCORIDIS

* Anti= magis radice eius præstat. * Candida aluo uti
qui hoc lis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem,
genus be quem habet in se, noxi succi est. Vnde succus earū,
te, ut au cum melle naribus inditus, caput purgat, auriū do
thor est loribus auxiliatur. Decoctū radice & foliorum,
Theo= fursures lentesq; deterget perimones fotu mitigat.
phrastus Crudis folijs vitiliginis, nitro antea perscriptas, alo
Siculum peciarū inanitates, scapello prius exasperatas, atq;
uocarūt: depascentia vlcera, illini prodest. Eruptionibus pa
quorum pularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.

exemplo

extrita

una tan

tum lit

ra Sicla

hodie di

aitur.

Portulaca.

Cap. CXVI.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, in
flammationibus oculorum, cæterisq; cū polen
ra Sicla ta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igne, vesi
hodie di cæ doloribus, auxilio est: commanducata dentium
aitur. Stupores sedat: stomachi & intestinorum estuatio
nem, fluxionesq; mulcet: renes et vesicam adiuuat,
etiam si erosionem sentiant: veneris impetus exol
uit: succus epotus simili effectu prodest, in febris
valens. Cōtra teretes ventris tineas, cruentam ex
creationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & pro
fluuiū sanguinis, percocta efficax est. Item contra
sepis morsus. Ocularibus medicamentis utilissimè
commiscetur, interaneis fluxione laborantibus, atq;
vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores,
quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo foue
tur: eruptiones papularum in capite, cum vino emē
dat:

dat: vulneribus que ad syderationem spectant, ex
polenta illinitur.

Asparagi.

Cap. CXVII.

Officinis

Corruda, siue sylvestris asparagus, vulgaris spara-
est notitie. Huius cauliculi in cibo cocti ven-
gus.

trem emolliunt, vrinam cient. Radicis decoctum co-
tra vrine difficultatem, regium morbum, renum
vitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cō
vino aut, phalangiorum morsibus auxiliatur. Si
decocti succus super dente contineatur, eius dolori
medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, vt
aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagū
etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis,
atque defossis: quod quātum equidem sentio, planē * In gra-
a veritate abhorret. * Altilis aut asparagus mul co codice
tis ramis fruticat, folijs fœniculi, lōgis, numerosis: hæc ad
radice rotunda, grandi, spongiam habēte. Huius te sylvestrē
neri cauliculi triti in vino albo, renum dolores se- quoque
dāt. Assus aut coctusue, vrine stillicidium, diffici- aspara-
tatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino gum res-
aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cū ferūtur,
ficis aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat: nec fit al
coxendicis cruciatus stranguriamq; leuat. Alliga- tilis men-
ta radix, aut haustum eius decoctum, conceptum tio. Mar-
adimit, & sterilitatem adfert. cello aut

Plantago.

Cap. CXVIII.

nidentur

Dvo plātaginis genera: minor folia habet an- adulteris
gustiora, minora, molliora, leuiora, & enuio- na.

M

DIOSCORIDIS

ra: cauliculo anguloso in terram inclinato: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera
** Oleris maior, letior, virentiorq; latis constans folijs, * ole nomine racei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, per anto angulosus, subruher, à medio ad verticem tenui se=*
nomasi à mine circūdatus: radicibus nititur teneris, hirsutis, Brassicā candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nasci=
intellige. tur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo Nec enī
utilior magna est. Vim habēt folia exicatoriam, simplici=
constringentē: quare omnibus malignis vlceribus, ter ad q=
& fluxioni opportunis atq; elephāticis, sordidisq; libet ole=
illata prosunt: profluvia sanguinis, vlcera quæ ser ra, quo=
punt, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent: rū diuer
vetera vlcera & inequalia cicatrice obducunt, chō sa admo
ronia sanant, sinus conglutinant: morsibus canis, dum fa=
ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidi= cies, fo=
bis, strumis, & gylopijs, illita cum sale prosunt. Co= lia plan=
Etum cum aceto & sale olus, dysentericis, cœlia= taginis
cisq; sumptum subuenit. Datur & in locum betæ referri
cum lenticula coctum. Et ad aquam inter cutē, cui possunt.
leucophlegmatie nomen est, datur & herba deco=
cta post aridas epulas, sic vt media antecedit: co=
mitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorū suc=
cus, colluta subinde oris vlcera, purgat: cū cimolia=
ant cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus pro=
dest, lippitudinibus & aurium doloribus idem suc=
cus instillatur. Additur quoq; in oculorū collyria.
Ginginis cruore suffusis, & sanguinis reiectioni=

bus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subijcitur, etiã si vulua fluxione laboret. Semẽ ex vino potũ, alui fluxiones et sanguinis excreationes sistit. Decocta radix et māducatu, & collutione, dentiũ dolores sedat: eadem cū folijs, vlceribus renum et vesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cū tribus vini cyathis, & pari aque modo, tertianis auxiliari: et quatuor, quartanis. Sunt qui radicis gestamine, discutiẽdis strumis vtantur. Lauer seu Sium. Cap. CXIX.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu, calculos rumpunt, atque excernunt: vrinas cient, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. Desio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm menthe, nègra, & ad erucam accedentia. Officinis Berula.

Sisymbrium. Cap. CXX.

Sisymbrium (alijs serpyllum syluestre vocant) in solo inculto nascitur, menthe hortensis similitu sine Balsamidine, odoratius, latiore, folio. Inseritur coronis. Calta. facien- di vim habet: contra stillicidia vrine, calculosq; semẽ ex vino bibitur: tormina et singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut tẽporibus illi- nũtur: itẽ contra vesparum apiumq; iẽctus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sisymbriũ genus, quod

Vulgò na-
sturiũ
aqua-
ti-
cum.

DIOSCORIDIS

aliqui cardaminam, alij sion appellant. Ea herba
rignis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, proue-
nit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod
gustu cardamum, id est nasturtium, repræsentet.
Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ mo-
do finduntur. Id excalfacit, urinas mouet, crudum
estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, nocti-
bus impositum, matutinisq; detractum.

Crithmum. Cap. CXXI.

Critimum, seu potius, ut aliqui, crithamon, fru-
tcosa & vndique foliosa herbula est, cubiti
altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, et
petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus,
ueluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso ge-
stu, flores candidi sunt, & semen, ceu roris marini,
odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur:
habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassi-
tudine, tres aut quatuor, grati odoris & iocundi.

Radix, semen, et folia incocta uino, potu urinae dis-
fuchsis facultati & regio morbo auxiliatur: menses cient,
Corno estur crudum coctumue in olere, seruatur etiam in
cerui uulnuria.

gò dictum. Coronopus. Cap. CXXII.

* στρεπιδ **C**oronopus oblonga herbula est, per terram * re-
peritur, id est, fissis folijs: coquitur in olere. radicem habet
est, stramentum, adstringentem, quod in cibo celiacis facit. Prone-
ta. nit in aggeribus, et locis incultis, & secus vias.

Sonchi duo genera: sylvestrior quidam est, & magis spinis horret: * alter teneritate * Vulgò quada[m] mollescit, cibus expetitus, anguloso rostrum caule, & inani interdū rubente: folijs in ambitu per porcinū. intervalla dissectis. Vtriusque vis refrigerat, modis * Vox excē adstringit: unde estuanti stomacho & inflāma Plinio re- tionibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosio posita. nes sorbitione mitigat, lac elicit, in uellere appositus sedis ac uulue collectionibus opitulatur. Tam her- ba quā[m] radix illia uibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, las- tis constans folijs: caulem in ramos exeuntē folia distinguunt, sed ad eadem pollet:

A N N O T A T I O.

Non video, quanuis & Græcus codex sic habeat, quō Seris satiua hortēsi, quod planè est idem, stomacho utilior dicatur: ut subesse errorē non parum suspicemur. Marcellus, qui aut integriore vñs fuit exē plari, aut locū, quem & ipse corruptū iu- dicabat, restituere conatus est, sic vertit: Latioribus folijs altera satiua & in cibus gravior.

Seris siue intybus. Cap. CXXIIII.

Seris duum generum est: altera sylvestris, quæ * Offici- picris & cichorion vocatur: * altera satiua, nis sca- latioribus folijs, cōstat, stomach- quā[m] hortensis viola.

M ij

DIOSCORIDIS

utilior. Quae iterum in duas species digeritur: una folio latiore prodit, lactucarū simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: aliu sistit cocta, si cū aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quādoquidem estuantē ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cū radice illita, percussit à scorpione subuenit, igni sacro cū polenta medetur. Succus cū cerusa, et aceto, valet ad illitus eorū, q̄ refrigerationē desiderant.

Condrilla. Cap. CXXV.

Condrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulē, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronuntiarunt, verū tenuior tota est in cuius ramulis, gūmi mastiches simillimū & tuberculo fabae inueniri solet: quod cū myrrha tritū, & linteo appositum, iustar oliuae, faeminarum mēses trahit. Tusa cū radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod itē tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoveatur. Cōtra viperas in vino pota proficit. Succus decocta, in vino, aut per sese potus, aliu sistit. Aliud habetur chondrilla genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo

* μυέθρα
κνερμιάια
id est, magnitudi-
ne fabae.

madentē lacteo. radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incōmodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in letis, & cultis.

Cucurbita. Cap. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramēta eius infantibus contra capitis ardorem, quā syriasin vocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflāmationes podagrasq; refrigerant. Succus ē ramentis tussis perse, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat: totius feruefacta, et expressa succus, cū melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinū in cucurbitam recētem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum lenigabit.

Cucumer satiuus. Cap. XXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquā vtilis habetur: refrigerat, corruptionē non sentit, vesicā prodest, olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semē modicē vrinam mouet: cum lacte aut passo, vesicā exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibis, vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti admota, oculorū fluxiones auertunt. Succus cum semine adiecta

DIOSCORIDIS

farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, dragmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundū coenam uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quoque illita cum melle ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant.

Lactuca. Cap. CXXVIII.

Lactucæ sativæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur: somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: uerū decoctæ magis alunt. stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinū imaginationes in somno, compescit, & ueneri refragator. Ipsæ uero frequentiores in cibo, claritati oculorum officiunt: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur, muria cōdiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam uanciscuntur, succo aut lacti syluestris lactucæ similem.

Lactucæ syluestris. Cap. CXXIX.

Syluestris lactuca sativæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora: amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis: unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema caliginemq; repurgat, contra adæstiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum

LIBER SECVNDVS. 93

allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter, quàm satiuæ, libidinem imaginationes in somno amolitur, ac uenerē arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est insolutum.

Gingidium. Cap. CXXX.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia nascitur: herbula syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. Oulus hoc crudum, coctum, conditumne estur magna stomachi utilitate. urinā cit. Decoctum ex uino potum uesicæ prodest.

Scandix. Cap. CXXXI.

Scandix, syluestre oulus est, amarum, subacre: quod crudum coctumne manditur, stomacho et uentri utile. Decoctum in potu, uesicæ, renibus, & iocineri confert.

Caucalis. Cap. CXXXII.

Caucalis, quam alij syluestre daucum uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, sceniculi modo per extrema multifidis, hispidisq: candida in cacumine umbellula, suauiter olente. Crudum, coctumne olerum modo estur: urinam mouet.

Eruca. Cap. CXXXIII.

Ruda eruca uenerem largiore cibo concitat.

Nostrū

Cerefo =

lium.

* & λᾱ

στο, id

est, pluri

mum.

* πικρό

τερον, non

εἰς ἀκρό

τον.

Scādix,

Actio li-

ber. i. au-

thore,

agreste

olus est,

gingidio

simile,

acre &

subama-

rum.

DIOSCORIDIS

Semen eodem effectu prodest: urinam cito concoctioni prodest, aluo per quā cōmodata. Semine ad cōlimenta vtuntur: quod, vt in longū tēpus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerūt in pastillos. Gignitur etiānum syluestris eruca, maximē in Iberia, q̄ occidētē spectat cuius semine pro sinapi incole vtuntur. Urinā vehemētius pellit, multō satina acrior. Ocimum. Cap. CXXXIIII.

*Officinis
Basilicō.* **O**cimum vulgō cognitū. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: egrē tamen conficitur. Allicitum cum polline polēta, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis iētibus per se prodest: et cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quo līdem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem māducatū, et in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiūciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflētari dolore.

Orobanche. Cap. XXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, et interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergēs

ex radice digiti crassitudine, & cū ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quedam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobanche sibi cognomentum vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Legumētis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. Cap. CXXXVI.

Barbula hirci, que ab alijs come vocatur, breui est caule, folijs croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. Cap. CXXXVII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cū hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthiū. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Tubera Cap. XXXVIII.

Tubera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs flauescētes: vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis. Cap. CXXXIX.

Hortensis smilax, frutex, cuius semen à nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos, vicinis

DIOSCORIDIS

* *Greæ* fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt
 cē eſt *ex* ut topiarias ſcenas repreſentare ui leātur: ſiliquas
μειρα δὲ ſcœnigræci proferit longiores & tonſiores, in qui-
ὑποπυ bus ſemina renū ſimilia, ſed inequali colore reclu-
ζοντα, duntur, * quæ quadam ex parte fulueſcunt. Sili-
 quod rez qua cocta, cū ſemine in oleribus, aſparagi modo,
 etius for eſtur. Urinam ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

Medica.

Cap. CXL.

M Edica, cū recenter prodijt, folijs &
 caule trifolio pratenſi ſimilis eſt: pro-
 cedens uero folia contrahit, caules edēs
 trifolij, & ſiliquas corniculorum modo intortas,
 in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id
 intelliga ſiccatum, iucundi ſoporis gratia, conditaneo ſali-
 mus Smi admisceſtur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt,
 lica hāc illitu ſuffragatur. Herba tota pro gramine utun-
 diuerſi tur, qui pecora alunt.

Aphaca.

Cap. CXLI.

A Phaca in aruiſ nascitur, altior lente, tenuis
 bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in
 quibus terna quaternæue ſemina nigra, lente mi-
 tamē ex nora, continentur: quæ adſtringendi uim habent:
 parte ſul quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſi-
 ueſcentia ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

precreare.

Porrum capitatum.

Cap. CXLII.

C Apitatum porrum inflationem facit, no-
 xium ſuccum creat: tumultuoſum ſom-
 num parit, urinam ciet: aluo accommo-

datur, extenuat, oculorū aciem hebetat, menses pel strem u-
lit: sed lēdit exulceratā uesicam, renesq;: cum pti- citant.
sana uero coctum, esu pēctoris uitia extrahit. Co-
ma eius in aqua maris, & aceto cocta, in desseſſio-
nibus, ad praeclusiones uuluae, et duritias, utilis ha-
betur. Porrum bis aqua mutata coctū, tum frigi-
da maceratum, dulcescit, & multo minus inflat.
Semen acrius est, & quandam adstrictoriā uim
habet: quare succus cum aceto, addito thure aut
manna, sanguinis profluvia sistit, maximē si nari-
bus erumpat. Venerem stimulat: cōtra omnia tho-
racis uitia tabemq; pro delinētū efficax est: arte-
riam esu purgat, sed si assidue estur, usus obscuri-
tatē inducit: stomacho aduersatur. Succus ex mel-
le potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxi-
lio est: ipsum quoq; cum aceto aut thuris polline,
lacte aut rosaceo, utiliter auriū doloribus, & so-
nitui instillatur. Varos tollunt folia illita cū uua
rhois, qua ad obsonia utuntur: epinyelidi meden-
tur: crustas ex sale illita rumpunt, ueteres sangui-
nis reiectiones cohibēt, si binis drachmis & aqua
li baccarum myrti pondere bibantur. Ampelopra-
sum stomacho magis aduersatur, et plus perro ex-
calfacit: urinam & menses uehementius ciet. Id
contra serpentium morsus esse conuenit.

Cæpa. Cap. CXLIII.

CAepalonga acrior est, quā rotunda, item
flaua quā cādida, & sicca, quā uiridis,

DIOSCORIDIS

& cruda quàm cocta aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiâ inuitant, sitim mouent, & extenuant: fastidium pariunt, et expurgant: aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus reserant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: angine eodem perunguntur: suppressos menses pellit, caput purgat naribus infusus: canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto aut perunctas in Sole, vitiliginis sanat: & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos eum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cū gallinaceo adipe utilis est: citæ aluo prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad prurulentas aureis, & eliciendum earundem aquam, valet: alopecie earum succo perfricantur, qui celerius, quàm alcyonium pilos euocat: largiore cibo cepa capitis dolores ciet, cocta q; vehementius vrinâ pellit: eos lethargicos efficit, qui ualetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æ quo nescantur: elixa, & cum passis uuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrimè rumpit.

Allium. Cap. CXLIIII.

Allion quoddam satium atq; hortense habetur, quod in Aegypto, singulari, ut porrū, capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum:

LIBER SECVNDVS. 96

reliqua uero magna, & candida, ex pluribus coag-
mentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas, Graeci
nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscoro-
don, id est anguinum, uocant. Vis allij acris est: excal-
facit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes fa-
cit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permo-
uet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum
esum hebetat. Eosdem effectus praebet anguinum, quod
& elaphoscorodon dicitur: latas uentris tineas in
cibo sumptum abigit, urinas detrahit: contra uipe-
rarum ictus, & priuatim haemorrhoidum, prodest, ita
ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur,
aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum
morsus & illitum, et cibo ualet. Magnae & allio uti-
litates contra aquarum mutationes: uocem clarificat,
peterem tussim crudum coctum uel lenit: potum autem
cum origani decocto, pediculos, et lentes auocat: cre-
mati cinis illitus sugillationibus cum melle, et alopec-
cys cum nardino unguine, medetur: eruptiones: papu-
larum cum oleo & sale sanat: uirilgines, lichenas,
lentiginis, ulcera capitis manantia, lepras, & fur-
fures, cum melle eximit: cum thure, & teda deco-
ctum, dentium dolorem leuat, si in ore continetur:
contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficul-
neis frondibus, & cumino illinitur. Feruifacile co-
mae ius, sceminarum defecationibus additum, menses
& secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia
sufficitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritum

DIOSCORIDIS

quod myttoton uocant, esurit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis uile. Scorodoprasum magnitudine porrum equat, qualitatum porri, & allii particeps: unde promiscuas sibi uires ex utroque uendicant, effectus allii, & porri præbens: inefficacius tamen, Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

Sinapi.

Cap. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi uocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, non magnopere siccum. sed quod fractum interne uirescat, & ueluti quodam succo madeat, caesium colore: siquidem recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamque arterie scabritiem, succus ex aqua, & melle, conuenienter gargarizatur: Sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur. Fœminas uulue strangulatu oppressas excitat: lethargicis, de raso capite, illinitur cum ficis admistum, donec rubescat
 * καὶ locus, & ad coxendicium cruciatus impositum, * ad
 πλῆνις lienēs, & omne genus dolores confert, cum permu-
 καὶ καὶ ὅς- tandē ualitudinis causa, ex alto uitia extrahenda
 λη ἴς sunt. Alopecyis illitum, medetur, faciem purgat, su-
 πρὸν χρὸ- gillata cum melle, adipe, aut cerato rapit. Ferae impe-
 νικὲν ἀλγῶν- tiginēs & lepræ, eo cum aceto perunguntur: con-
 170. tra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui,
 polentæ

polenta modo, inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuentibus, vtiliter admisceri solet: tritum, grauitati aurium & sonitui. cū fico impositum prodest. Succus ad hebitudines oculorū & genarum scabritias magna vtilitate illinitur. Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Nasturtium. Cap. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babylo-
nicum. Omnium semen est acre: excalfas-
cit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas
excutit, lienem imminuit, partus exanimat, men-
ses cit, venerem stimulat, sinapis & eruce simile
intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Il-
litum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat
pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus inco-
ctum. Serpentium venenis potum resistit, atque
eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: car-
bunculos ad suppurationem perducit, & rumpit:
coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illini-
tur, tumores collectionesq; discutit, emittit surun-
culos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem
effectus, licet minor.

Thlaspi. Cap. CXLVII.

Thlaspi, herbula angustis folijs, digitali lon-
gitudine, in terram versis, suppinguibus,
in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo,
tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu cir-
ca ipsum totum, ab extremo in latus se pandens

N

DIOSCORIDIS

* *Dioscori* te: semine nasturtij incluso * lenticulae vasis effi-
des, id est gie, nisi quod infringitur, (vnde nomen accepit) flor
 disci fi- albi- cat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;
 gura.

Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem vtrinque
 extrahit, potum acetabuli mensura: prodest ischia-
 dicis infusum: sanguinem potu educit, internas sup-
 purationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat.
 Alterum thlaspi tradit Crataeas, quod aliqui Persi
 con sinapi vocant, latis folijs, radicibus magnis:
 utile ischiadicorum infusioni.

Draba. Cap. CXLVIII.

Alij ara
his.

* *e' xβ* =
des, id est
 virgas.

D Raba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tes-
 nues spargens & ramos, & ex utroq; latere
 folia, ceu lepidum, sed molliora, & candidiora: in ca-
 cumine vero sambuci umbellam gerit, candidos flo-
 res habentem. Herba haec cum ptisana coquitur, in
 Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere
 obsonijs admiscetur.

Iris. Cap. CXLIX.

E Rysimon, Latini irionem vocant, iuxta vrbes,
 rudera, hortosq; nascitur, folijs eruce sylue-
 stris: cauliculis in lori modum lentis et obsequosis:
 floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vt
 fœnogræco, cornicularis: semine nasturtij, exiguo,
 vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax
 est, & si purulenta extussumtur: regio morbo, &
 coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum
 melle datur: illinitur ex aqua aut melle utiliter ca-

cis carcinomatis, parotidibus, duritijs mammarū,
& testium inflammationibus. In totum extenuat,
et calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua
madescat atq; torreatur, vel linteo illigatum, pin-
sita, farina oblitum perassetur.

Piper.

Cap. C L.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ
inter initia, prælongum fructum, veluti fili-
quam promit, quod longum piper est: habet intus
aliquid tenui milio simile, quod tandem in perse-
ctum piper euadit. Id aut suis tēporibus dehiscēs,
pādensq; sese racemos emittit, grana ferētes qua-
lia videmus. Ea acerba cādidū piper faciunt, aptū
ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus
quæ contra venenata parantur: theriaca vocant.
Longum vero vehementius mordet: & quoniam
prius, quàm ematurescat, decerptum est, subama-
rum relinquitur, antidotis & theriacis medicami-
nibus expetitur. Nigrum vero, utpote quod tem-
pestiua maturitate collectū fit, odoratum esse cō-
stat, candido suauius, acrius, & origratius, necnō
ad condimēta vtilius. Sed candidū, & adhuc in-
acerbū vergēs, antè dictis infirmius est. Eligi opor-
tet grauissimū, plenum, nigrū, sine multis rugis, re-
cēs ac minime fursurosum. Inueniūtur etiānum ī
genere nigri semina nutrimento defacta, cassa ina-
nia, minimiq; pōderis, quod vocāt brasma. Vis om-
niū excalfacit, vrinā ciet, cōcoquit, extrahit, discu-

N ij

DIOSCORIDIS

tit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. P
per, februm horroribus circuitu repetentibus, siue
potu, siue illitu, subuenit: serpentium moribus au-
xiliatur, partus extrahit. conceptum adimere crea-
ditur, statim à concubitu suppositum: iussi, omni-
busq; pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, suc-
currit: angine eo & melle conuenienter perungit
tur: potum cum recentibus laurij folijs, tormina di-
scutit: cum vna passa manducatu, pituitam à ca-
pite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appe-
tentiam mouet, concoctione adiuuat, ad intinctus
esculetorum additum: strumas cum pice discutit,
vitiliginis ex nitro emaculat. Fictili nouo, vt * le
ticula, motum torretur. Non est huius arboris raz
dix gingiber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo
post ostendemus. Naque piperis radix costo simi-
lis est, ora gustantium accendit, salinam ciet. Hæc
lienem reprimat, cū aceto illita, vt pota: caput etiā
purgat, manducata cum semine pedicularis here-
ba, quam staphidem agriam vocant.

* φακί,
nō φασι

Gingiberis. Cap. CLI.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglody-
tica Arabia magna ex parte nascens: qua vi-
rente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur,
& primis potibus & edulij admiscet. Huius ra-
dices, cyperi modo, parue sunt, candicantes, &
odoratæ, atque piper sapore imitantur. Eligi
debent quæ teredines non nouerunt. A multis

tamen ob id & conduntur, quòd celeriter cariem sen-
tiant, ac fectilibus in Italiam asportantur. Gingibe-
ris cibo conueniens est, & cum condimento assumi-
tur. Excalfactoriam vim & excoquentem habet:
aluum leniter emollit, Stomacho utilis est, efficax
aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt. In an-
tidota addi solet. In summa, piperis viribus re-
spondet.

Hydropiper.

Cap. CLII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stas-
cunt, aut pigro lapsu repunt: caulem edit ge-
niculatum, & prædurum, multis alis concavum: fo-
lia menthæ, maiora, molliora, candidioraq;: gustu
piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam fru-
ctum acrem, in surculis paruis, prope folia racema-
tim coherentem. Folia cū semine illita tumores ve-
teresq; duritias discutit, sugillata delēt: quæ post-
quam inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admi-
scentur. Radix parua, nullius in medicina momēti.

Ptarmica.

Cap. CLIII.

PTarmica exiguus frutex est, surculos habens
paruos, multos, & rotundos, abrotono non dis-
similes, & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in
cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotū-
dum, quod suo acri odore sternutamentum excitat:
vnde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugil-
lationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissi-
mè mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

N iij

DIOSCORIDIS
Radicula seu lanaria herba.

Cap. CLIIII.

Cēsetur
ea quā
uulgò sa
ponariū
dicunt.

S Trithium herba vulgò nota, qua purgadis
lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix
est acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinero
sis, orthopnœ ex melle sumpta, cochlearis mensu-
ra. aluum soluit. Eadem cum panace & capparis
radice calculos frangit, & cum vrina exturbat. du-
ritiam lienis absomit: menses imposita trahit, par-
tus efficaciter enecat. Cum polenta autem & ace-
to illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina
hordeacea, & vino decocta. Miscetur et malagma-
tis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sterni-
tamenta mouet, per os purgat, trita cum melle, &
naribus infusa.

Cyclaminus. Cap. CLV.

* πορφυ
ειζορτα,
purpura
scētibus.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea,
varia, in quibus suprà infraq; albicant
maculæ: caule nudo, quaternos digitos æ-
quante: floribus in eo * purpureis, rosarum effigie:
radice nigra, & aliquantum lata, vt rapum vide-
ri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam
aquamq; detrahit: menses potu appositū ciet.
Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur,
abortum fieri. Partum appensa accelcrat: contra ve-
nena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illi-
ta contra serpentium ictus, remedio est: immista vi-
no inebriat: regium morbum discutit, tribus drach-

mis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum, qui ebibit, multis vestibus contectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectioni autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deijcienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito vmbilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduam sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absomit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, perniionesq; foueri congruum est: ipsaq; in oleo vetere feruescunt, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cere momento, ut strigmenti crassitudinem vnguentum contrahat, cum primis vtile perniionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

DIOSCORIDIS

Altera cyclaminus Cap. CLVI.

Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophylon vocant: folijs hederæ, sed minoribus geniculatis caulibus, crassisque; circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, in vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per urinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. reliquias à partu purgat.

Dracunculus. Cap. CLVII.

Dracunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis, succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lagna impositus, polypum absument: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnoeis, ruptis, vulsis, tussi, deffillationibus, auxiliatur: humores pectoris ex-

creatu facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delin- gatur: urinam pellit, venerem excitat, cum vino po- ta. phagedenas vlcerum, & que cacoethe vocan- tur, trita cum melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos partus fieri solent: qui radice suas ma- nus perfricauerunt, à viperis ferri negantur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vule- neribus, linamentorum vice, conuenienter imponun- tur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest: casens folijs inuolutus, à putredine defenditur. Suc- cus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctaue, ad sanor- um vsus, pro oleris recipitur: in Gymnesijs insulis, que Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Ra- dix messibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatur in vmbra, & ita recon- ditur.

Arum.

Cap. CLVIII.

A Ron, apud Syros lupha vocitatum, folia emit lartus of- tit dracunculi, sed longiora, & paucioribus ficinis. distincta maculis: caulem suppurpureum, dodran- talem, pistilli specie, à quo croceum semen exit. ra- dice dracunculi alba, que decocta estur, vtpote cū minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen & fo-

DIOSCORIDIS

lia, dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fumo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arifarum.

Cap. CLIX.

Arisarū exigua herbula est cuius radix olea magnitudinem implet, longè maioris quàm aron acrimonie: vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radice, genitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

Hastula regia.

Cap. CLX.

Offici-
nis A=
phrodi-
los.

HAstula regia vulgaris notitiæ est, folijs maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt: vrinas & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida, & depascentia, māmaram quoque & testium inflānationes, tubercula, furunculosq; decoctis in fæce vini bulbis, recentibus inflātionibus ex polēta auxiliatur. Radicis succus adiecto, vetere uino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitq; perquàm vtile oculis medicamentum ad purulētæ.

aureis per se: & cum thure melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem: infusus, * * * * * dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alo * * * * * pecias ad pilum reducit. Oleum in excavatis radi- * * * * * tibus igni decoctum, illitus exulceratis pernionibus & ambustis igni, conducit: & surditati instillatũ in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, * lin * * * * * teo antea perfrictam in sole, illito radix emendat. * * * * * Semen floresq; in vino poti, scolopendræ et scorpionũ * * * * * venenis, mirũ in modum resistũt: aluum purgant. * * * * *

Bulbus esculentus. Cap. CLXI.

Esculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: Stomacho & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarus verò & scillinus, Stomacho aptior est, & concoctione adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt: luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrenas & podagras ex melle aut per se, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent, sudores compescunt: Stomachi dolores mitigant: fursures & vlcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt, sugillata varosq; per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant, fractis auriculis unguibusq; ex polenta medetur. ijdẽ

DIOSCORIDIS

calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è menarum capitibus, impositi: cremati verò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atque trasq; cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus uomitorius. Cap. CLXII.

*β'αβω**B**ulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, & cortice nigro. Ea radice mansa, aut decoctum eius potum, vesicae malis moderetur. vomitiones movet.

Scilla. Cap. CLXIII.

Officinis
squilla,
Varronis
more.**S**cilla vim acrem atque feruentem habet: assatam ad multa vtiliorem esse constat. Poliline ad crustam subacto, aut luto oblita, in clibanum coniicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: quae exempta si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quae prius sunt: nam quae ita non assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quae in furnum demittatur. Sumi etiam solet quod maximè est medium, direptis viro tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidem parte se contingant: his scillae segmi

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum, uti-
mur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ
in oleo feruesacta, aut cum resina liquefacta im-
ponitur: decocta in aceto demorsis à vipera, cata-
plasma est. Ad singulas assæ partes adiectis octo-
nis tosti salis, cochlear vñ aut alterũ damus ieiun-
nis, ad emolliendam aluũ: in potu aut & odoratis
medicaminibus, & quibus urinam ciere volumus
hydropicisq; & stomachicis, quibus inmatat cibus
regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis,
& ore reijcientibus tres obolos, in delinctu ex mol-
le sumpsisse satis est. Coquitur cum melle, et estur
eorundẽ gratia, maximè vt cõcoctionem adiunet.
Strigmenta per aluum extrahit. Cocta & simili
sumpta modo, eosdem præbet effectus: sed cauendus
scillæ vsus his, qui intestinum sentiunt vlcus. Ad
pensiles verrucas & perniones, tosta efficaciter il-
linitur. Tertium semen, & in carica aut melle de-
uoratum, aluum emollit. Scilla tota in limine iae-
nuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

De Pancratio. Cap. CLXIII.

PAncraticum, quod aliqui scillam appellant, ra-
dice est magni bulbi, subrufo colore, aut sup-
purpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lilij, sed
longioribus. Scillæ vires & preparationem ha-
bet, eodẽque pondere in morbis efficaciter assu-
mitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas in-
est. Radicis succus cum erui farina digeritur

DIOSCORIDIS

in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

Capparis. Cap. CLXV.

Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum delihscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis punicorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosus spargit, grades, numerosasq;. Tenui plerumq; solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis et fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat. Stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quam cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absunit, & urinam cruentamq; ex crementum emit: bibitur utilissime in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat Dentium dolore sedat semine ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit: ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ occaluerunt, expurgat: lienosis comfarina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur. cum aceto trita, vitilignes albas, absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias dissentiunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat.

Aphrica, & præsertim Marmarica capparis, vehementer inflat. Apula vomitus facit, & quæ à Lybico, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat gingiuasq; osse tenuis exest: quare in cibis non ab re damnatur.

Lepidium. Cap. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Cēsetur vulgò nota: muria cum lacte seruatur. Vis fo piperisoli-
liorum & acris & exulcerans: quapropter ischia torum,
dicis trita, præsentissimum est auxilium, si cū hele-
nii radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis si-
mili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa
collo, dolore dentium liberare exstimatur.

Ranunculum. Cap. CLXVII.

Complura ranunculi genera: vis tamen oībus Vulgò a-
cra, acris, & vehementer exulcerans. Nam pīū risus
vñū coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis
pinguibus: flore luteo, interdū purpureo: caule gra-
cili, cubitum alto: ra. lice alba, exigua, amaraq;
multis capillamētis, hellebori modo, fibrata: nasci-
tur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius,
longiori caule, pluribus foliorum incisuris, * ple * πλε
runq; in Sardinia proueniēs, quā acerrimum, quod στερ, αλ ε,
sylvestre apium appellant. Tertium minimū, odo- copiosū.
re graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore la-
eteo. Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exul-
cerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare

DIOSCORIDIS

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, Stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaq;, Sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem ap-
pensa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone. Cap. CLXVIII.

Duo anemones genera, vnum syluestre, alteru in cultis nascens. Cuius multae species: vna pœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, vut purpureum. Harum folia coriandro similia, cæterum scissa tenuius in terrâ inclinâtur: caule languinosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea. radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, et multis radicum capillamentis. Acrior est, qua nigra habet folia. Vis vtriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commantuscata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari cupatorium

ri eupatorium putent: quoniam à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellât (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas vero candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

Argemone. Cap. CLXIX.

Argemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florē puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, et summis partibus latum: radicem rotundā: succū croci colore, acrem, dimittit. Argema et nubes expurgat. Folia illitu inflammationes cōpescūt.

Anagallis. Cap. CLXX.

Dvo anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi

○

DIOSCORIDIS

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori
aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gar-
garizatu purgat: & naribus infusus, dolorem den-
tium lenit, si in aduersam na rem iniiciatur: arge-
ma cum melle Attico emendat: retuse oculorū aciei
auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris &
renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt
eam, quæ cœruleum edit florem, prociduum sedem
reprimere: quæ uerò phœniceum, illitis euocare.

Hedera. Cap. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie sortis-
tur, summas autem genere treis. Nam
quedam candida est, altera nigra, tertia
helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, ni-
grum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam
vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet
viticulas, & folia parua, angulosa, & & concina
miora. Hedera omnis acris est, & adstringens: ner-
uos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad
dysentericos, in vino bis die potus: ambustus cum ce-
rato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta,
aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū
& corymborum succus, cum irino vnguento, mel-
le aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres
capitis dolores & caput eo cum aceto, & rosaceo per-
fundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus,
cum oleo medetur. Nigris hederae succus, aut epoti
corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant lar-

* εἰς τὴν
καὶ τὴν
non ἐστὶν
ἴσως

* ἀρμῶ-
ς καὶ
ζω καὶ

gius sumpti. Acini quinque triti, cal factiq; in pua-
 nici mali cortice cum rosaceo, si instillantur à con-
 traria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant
 capillū, illiti corymbi. Folia in vino decocta, illinum-
 tur omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint:
 vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea
 diximus. decocta. Mouent menses triti & subditi co-
 rymbi: ydem poti, post purgationes fœminarū, dra-
 chmæ pondere, concipiendi spem adimūt. Pediculus
 oliorū melle irrigatus ac uulue indicus, menstrua
 et partus extrahit. Instillatus succus putrida tedia
 nariū, graueolētiamq; emēdat, et sanitati restituit.
 Lacryma hederæ psilothrū est: illitu pediculos ene-
 cat. Succus radicū in aceto potus, contra phalāgia
 prodest.

Chelidoniū. Cap. CLXXII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubi-
 tali aut altiore, agnatis foliosis: folijs ra-
 nunculi, mollioribus tamen, & colore cæ-
 sijs: flore uiolæ albæ, secundum singula folia pro-
 deunte: in eo succus croci, mordax, acris, & aliquā-
 tulum subamarus. grauiter olēs: radix superne sin-
 gularis, infernè in multa crocea capillamenta fibra-
 tur: siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in me-
 te figuram longa: in qua semen papauere maius
 recluditur. Succus in aëreo uase, cum melle prunis
 decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, ra-
 dice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus
 in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso

DIOSCORIDIS

& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpunt: imposita cum vino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quòd aduentu hirundinum exoriat, et discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. Cap. CLXXIII.

Vulgò
Scrofula
ria mix-
ta.

Chelidonium minus, quod triticum syluestre aliqui nuncupant, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs hederæ, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in grarum tritici modum acervatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo, summam cutem exulcerat: psoras et scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. Cap. CLXXIIII.

Varie
de Othō
nā sentē
tiæ.

Othonnam aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum floribus corniculati pipaueris expressum. Alij permixtos cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse continent. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbe succum, quæ othonna vocatur: na-

sciꝑ; eam in eo Arabia tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs eruce, perforatis cribri modo, & veluti à tineâ derosis, squallore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidã anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorũ medicamentis adiicitur, vbi expurgare est opus: mordet enim & absterget omnem caliginem quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. Cap. CLXXV.

MVris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus; & tenuibus cauliculis ex alarũ sinu prodeuntibus: flosculo, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægylopiâ sanat. Sunt qui al sinem, muris auriculam vocitent.

Glastum. Cap. CLXXVI.

Satium glastum, quo insectores lanarum vtuntur, folium habet plantagini simile, verum pinguis nigriusq;: cuius caulis duum cubitorum altis

DIOSCORIDIS

tudinem excedit. Illita folia tumores omneis discutiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedenas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre glastum satiuo simile est: folia fert maiora, lactuca-
* *Λιωτόριος*, id est, tenuiores.
ceis proxima: caules * prætenues, multifidos, quadratenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprâ dicta præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur.

Telephium. Cap. CLXXVII.

Vulgo
Crassula
la ma-
ior, &
faba in-
versa.

Telephium herba portulacæ similis est, & caule, & folijs: alas binas in singulis foliorum gemiculis annectit, ramuli à radice semi septeniue prodeunt, folijs referti cœruleis, crassis, lentis, ac carnosiss, flore luteo, aut candido. Nascitur inter vites, & locis cultis vere. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt, sed ubi inaruerunt, absterguntur.

SECUNDI LIBRI FINIS.

PEDANII 108
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER III.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



VPERIORIBVS, charissime Aree, cōmentarijs, tradidimus de aromatibus, vnguentis, oleis, arboribus, earum fructibus & lacrymis, item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia praeditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quae vernacula & inter se cognata censentur, quaeque pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum.

Cap. I.

AGaricum radix fertur laserpitij similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosoque tota contextu. Duo eius genera: scemina, quae praefertur, rectis intus venarum discursibus constat. mas rotundus est, & undique compactior. Vtriq; gustus in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudinem transit: gignitur in Sarmatiae regione, quae Agaria dicitur. Sūt qui radicē

O iiij

DIOSCORIDIS

esse plantæ affirmant: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quādā putredine. Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est contra tormina; cruditates, & rupta: prodest itidem cōtusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentientibus: febriculosis verò, in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis. Atē si vrina egrē reddatur, si vulue strangulatus vrgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio Stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acida ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: foeminis, quas inflatio vulue vexat, vtiliter æquali modo datur. Horrores soluit datum ante febrium accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumq; subfixerūt, tribus obolis ex vino potum, mirē auxiliatur. In summa, internis omnibus vitijs conuenit, pro viribus, & ætate datum, nunc

ex aqua, nunc ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum.

Cap. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhapōticum vocāt, Ignora =
provenit in ijs, que supra Bosphorū sunt re = tur. Nec
Gionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centau =
rio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, ali quod
quantum lævis, sine odore. Optimum habetur, quod Reupon =
teredines non sensit. si gustatu cum remissa adstri tici no =
etione lentescat, māducatumq; colorem reddat pal mine ho =
lidum, aut ad crocum inclinantem. Id epotum facit die indi =
ad inflationes, Stomachi imbecillitatē, & omne ge catur.
nus dolores, ad cōulsa, lienosos, hepaticos, tormina,
ad renum, vesice, & pectoris vitia, aduersus inten =
ta præcordia, & vulue mala, coxendicum dolores,
sanguinis excreationes, sospiria, singultus, dysente =
rias, & coeliacorum affectus, contra februm cir =
cuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis
valetudinibus eodem, quo agaricum, pondere, et cū
eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin ali =
ter, ex aqua mulsa. si tabem experiuntur, ex passo:
si lienis exercet in aceto mulso si dissolutio est sto =
machi, id est cū cibi tenax non est, manditur, &
sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia, lichenasq;
tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omneis ve =
teres ex aqua oblitum dissipat summa eius vis ad =
stringens cum aliquanto calore.

Gentiana.

Cap. III.

DIOSCORIDIS

* Gra- **G**Entiana inuentio prima assignatur * Gentio
 cus Gen- **G**illyriorum regi, à quo cognomentum habuit.
 tidi. **F**olijs partim proximè radicem, iuglandi plantagi-
 nūe similibus, subrubris, partim à medio caule, &
 praesertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule
 cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex
 intervallis maioribus foliato, binum saepe cubitorū:
 semine in calycibus lato, sine pondere, glumoso, sa-
 tis ad sphondylii semen accedente: radice longè ar-
 stolochiae, crassa, amara. Nascitur in sublimibus
 montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice
 excafactoria, & adstringens: contra morsus ser-
 pentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vi-
 no pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, late-
 rum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, &
 conuulsis, prodest hepaticis & stomachicis, pota
 cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita,
 partus eijcit: imposita, ut lycium, vulneraria est,
 & ulcerum cuniculatim depascetium medela. Suc-
 cus praecipue eodem affectu prodest: oculis inflam-
 matione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs
 acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget.
 Succus extrahendi ratio haec est: Cōtusa radix quin-
 que diebus aqua maceratur: postea in eadem tan-
 tisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrig-
 erit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum
 mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Aristolochia.

Cap. II II.

Aristolochia nomē ex eo sibi adaptavit, quod existimetur optimē puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotūda, quæ fœmina vocatur, folijs hederaceis: præstanti odore cū acrimonia, mollibus, subrotūdis, multis ab vna radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, grauitè olet. Longa, mascula appellatur: nōnullis dactylitis, longiore quā rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauitè olēte, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotunda, in orbē conglobata, rapi modo. Longæ verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nōnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiānum tertia longa, quæ clematitis vocatur, ramulos habēs tenuēs, refertos folijs subrotūdis, minori semperuino similibus: flores rutæ: radices longiores, tennes, crasso cortice odoratoq; vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis cōuenientes. Rotunda ceteris venenis resistit. Longa verò aduersus angues, & venena, drachmæ pōdere ex vino bibitur et illinitur pota cū pipere, et myrrha, menses, partus, et omnia vuluarum onera eūcit: eadē efficit subdita in pessa.

Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit, ossium squamas illitu

DIOSCORIDIS

adimit, vlcera putrida exest, & sordida expurgat: cauat cum iri, & melle explet, gingiuas, & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

Cap. V.

Liquiri-
tia offici-
nis.

* maxp's
id est, lon-
gas.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus. folijs lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummeis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquis lentium modo habet, rufas & * paruas: radicibus longis, vt gentiane, coloris buxei, sub acerbis & dulcibus: que densantur in succum, lycij exemplo. Is in arterie scabritia efficax habetur: verum oportet vt lingua subditus eliquescat, & stuati stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus accommodatur, commanducatus ori prodest: recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygij commodissime inspargitur.

Centaurium magnum. Cap. VI.

Censetur
Rheupon-
ticum of-
ficinarum.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab rabice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos caeruleus: semine cnico simile, ceu lanis floccis

LIBER TERTIVS. III

quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo pregnans, cū adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam et Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuēlibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris, in vino. Item ad tormina, & vulue dolores. Ramenta eius in collyrij formā vulue subdita, menses atque partus extrahunt. succus eadem præstat, vulneribus prodest: nam recens tussa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tussa si mul decoquatur, In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaurium minus. Cap. VII.

Centaurium, limnesion aliqui vocauerunt, quoniam in rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rute, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & supernacua, que gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tussa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrices obducit: bilem crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur. trahit enim sangui-

DIOSCORIDIS

uem & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat: in uellere appositus, menses & partus extrahit: epotus peculiariter nervorum vitijs succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine prægnas, & diebus quinque mada facta, decoquitur, donec superemineat aqua: mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem gravidamq; contundunt, atque succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignæ rude assidue mouentes, inspissant. Quod siquid cōcretum faucibus uasis adhaerescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt. Noctu diligenter operiunt: nanque ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta (ut in gentiane mentione retulimus,) præparantur: sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mādragora reliquisq; similibus succus sic ex acerbis uuis melligo elicitur. Lycium tamen, & absynthium, hypocistis, & consimilia, decocta, eo, quo diximus, modo coguntur.

Chamæleon albus. Cap. VIII.

Chamæleon albus, iuxta ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis uiscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur mulier

LIBER TERTIVS. 112

res: folia habet silybo aut carduo similia, * aspe= * Sic Pliniora, acutiora, nigroq; chamæleone ualidiora: cau= ni. græ= lem non promit, uerum ex medio spinas, echini ma= cus co= rini, aut cinara modo, erigit: flores purpureos, ueluti dex= papporum lanugines emittit: semen cnici simile: ra χύτρεα, dicem in latis collibus crassam, in mōtosis uerò gra id est ciliozem, in profundo albam: aliquatenus aromati= crassio= cam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli men ra: ni sura, latus interaneorum tineas pellit. Bibitur autē forte in uino austero, cum origani feruesacti succo. Hy= τρεαχύτρε dropicis commodissimè drachma in uino datur, et= pa legen enim eos extenuat: contra difficultatē urinae deco= dū: quod etum propinatur. Hausta in uino, serpentium uene ex her= nis resistit: occidit canes & sues: mures uē necat, barū col subacta cū polenta aut aqua, & oleo madefacta. latione,

Chamæleon niger. Cap. IX. si quādo

Chamæleon niger, folijs scolymo similis es uidere cō set, nisi minora, tenuioraq; , ac rubro di= tingat, stincta uiderentur: caulem emittit dodrā facile di talem, crassitudine digitali, subrubrum: & in um iudicaue bella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, uer= ris. sic colores: radice crassa, nigra, densa, interdum exce sa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mor= det. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tra ctibus, & maritimis. Radix trita, addito atramen ti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiē abigit: eadem, cū sibi sulphur & bitumen ascie nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abs=

DIOSCORIDIS

terget Decoctum collutione dentium, dolorem miti-
gat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolent
denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto deco-
cta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scripto-
rio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, uir-
tiliginesq; cum sulphure emendat: erodentibus me-
dicamentis adniscetur: phagedenas, tetraq; vlcera
Nominis illitus sanat. Quare chamæleo vocetur, à varietate
ratio. foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem:
hic viridia, illic albicantia. alicubi cœrulea, nonnus-
quam rubra inueniuntur.

Crocodilium.

Cap. X.

Crocodilium chamæleontis nigri figurā ha-
bet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui,
aliquantum lata, odore, ut nasturtij, acuo-
to. Ferues facta in aqua & pota radix, sanguinem
copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos eu-
denter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex
uti scutum, quod suapte vi vrinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris. Cap. XI.

**Virga
pastoris
vulgò.**

Dipsacum, aculeatarum generis est, caulem
habet altum, spinis horridum, folijs lactuce,
spinosis, binis genicula singula complectentibus,
prelongis, ceu quasdam bullas intus & extra acu-
leatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum
sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsa-
ci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine cau-
lis, singula circuli capitula insunt, oblonga, echin-
nata

nata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissecta q; medullatenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulas q; si tusa & decocta in vino radix, usquedum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum area pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucis q; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in solliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba.

Cap. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulē supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantē, intus cauum: in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semē cenicum, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & qui cruēta extussiunt, efficax est: urinā, cit tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen convulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica.

Cap. XIII.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæteras q; fluxiones radix etiamnum valet. Proue-

P

DIOSCORIDIS

nit in asperis.

Carduus.

Cap. XIII.

Est gallo-
rum Ar-
tichau.

C Arduus, Græci scolymon vocant, folia char-
maleonis habet, aut albæ spine, nigriora, &
crassiora: caulē longum edit, foliosum, capite spi-
noso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolen-
tiam alarum totiusq; corporis emēdat: item si de-
cocta in vino bibatur. Copiosam autem urinam
foetidamq; expellit. Herba cum recens tenerescit,
in olera, asparagi modo, transit.

Poterium.

Cap. XV.

P Oterium, Iones neurada vocant, largē frutis-
cat, cortice obductum tenui, spinis horridum,
lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, te-
nuibus, tragacanthæ proximis: folijs parvis, rotun-
dis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius
usus, sed gustu acuto et odorato. Nascitur in aquo-
sis, et collibus. Radices demittit binum ternūque
cubitorū, neruosas, & firmas: quæ proximē terrā
recisæ, dant succum gummi similem. Tusa, præcisis
neruis & vulneribus glutinandis illinuntur. Deco-
ctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

Acanthium.

Cap. XVI.

* Addi-
tū ex Pli-
nio.

A Canthium albæ spine simile, folijs nuclea-
tis per extremitates, & lanugine araneo
sa obductis: ex qua collecta & neta, vestes lio-
bycinæ similes texunt. Folia vel radices ad reme-
dia episthotoni bibuntur.

LIBER TERTIVS. 114

Acanthus. Cap. XVII.

A Canthus, Romani paderotam vocant, nam Officinis
scitur in hortis, petrosis, & riguis: folia ha- Bracav
bet multo lactucaceis latiora, & longiora, eruce sina.
diuisura, nigricantia, pingua, laeua: caulem binu
cubitorum, digitali crassitudine, laeuem, prope vera
ticem ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nuc
menta quaedam oblonga referentibus, spinosis, e
quibus flos proilit albus: semen oblongum, luteum:
caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mu
cosis, rubris, & glutinosis: quae vstis igni & luxa
tis artubus illitae subueniunt: potae urinam ciunt,
sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sen
tientibus, mire profunt. Nascitur et syluestris acan
thus, scolymo similis, aculeatus, breuior quam sa
tiuus, & is qui hortis prouenit: cuius radix ad eam
dem, ad quae superior, efficax.

Anonis. Cap. XVIII.

A Nonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgo,
mes habet fruticosos, dodrantaes, aut pau- Resta bo
lo maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis uis.
alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticu- * Suspi
le, tenuibus, pusillis, ad rute aut * pratensis loti cor lotu
folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non in- syluestre
incunde olentibus. Muria conditur, ante quam intellige
spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus dum: ac
spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent: ra- ob id for
dicem mittit candidam, quae excalfacit, & exte- te pratē

P ij

DIOSCORIDIS

sem dici, nuat: huius cortex ex vino potus, vrinam ciet: calcu quod tri los comminuit, margines vlcera erodit. Radix cū folij pra decoquitur in posca, dolorem dentiū colluti. .e miti tēsis cō= gat. Decoctum eius potu hēorrhoidas sanare stet folijs creditur.

vt vo =

Leucacantha. Cap. XIX.

lumine

quarto à

Dioscori

de depin=

gitur.

L Eucacantha, prædita est radice cyperi, valida & amara, quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri lateriū dolori, atq; ischiadicis prodest, de decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdē præbet effectus.

Tragacantha. Cap. XX.

Officinis

Draga=

gantum.

T Ragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde sirtulos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spi nas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiamnū tragacantha, lacryma, quæ, vulnerata radice ma nans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, lauis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medi camēta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas vo ces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoq; lingue liquecit, & in passo made facta, drachmæ pondere bibitur, contra renum do lorem, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto et eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryngium aculeatarum generis est. Cuius fo= Nūc cor
lia in principio, sale condita, in cibos recipiunt rupto vo
tur: lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, cabulo
gustu aromatica. Sed ubi adoleuerunt, circa cōplu Iringū di
res caulium eminentias in spinas aculeantur, in citur.
quorum summitatibus globosa capitula, durarum
acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim cir= *Per an
cumuallantur, quorum colos aliās viridis, aliās al= thericū
bus, interdum cœruleus inuenitur. Radix oblonga, caulē A=
lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitu= sphodeli
dine, odorata. Nasctur in asperis & cāpestribus. cui aptis
Vim habet calfactoriam: pota menses & vrinas simè cō=
pellit, tormina inflationesq; discutit. contra iocine= paratur
rum vitia, serpentium morsus, & hausta venena, Aloe, hic
cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cū se intelligi=
minis pastinace drachma vna: appensa illitāue, mus quā
tubercula discutere proclit. Pota cum hydromeli vis Dios
te radix, opisthotonicis & comitialibus medetur. scorides i

Aloe.

Cap. XXII.

Asphode

Aloes folium scille similitudinē habet, cras= li siue ha
sum, pingue, modicè latum, rotūdum, retror stule re=
sus pan lum: folia vtrinq; ex obliquo longioribus gie histo
interuallis striantur, & in spinulas desinunt retu ria, eius
sas truncasq;. Caulis emittitur non dissimilis * florē hoc
antherico: flos albus: fructus hastule regie cognā appellari
tus: graui tota est odore, & gustu amarissima: ra nomine
dice vna, ceu palo, in terrā depacta. Plurima prae tra lat.

P iiij

DIOSCORIDIS

pinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet * *syn-*
** Plin.* cera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculeorum ex-
pinguis, pers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta
qui non facile liquefscens, eximie amaritudinis: improba-
καταράν, tur nigra & fractu contumax. Gummi eam adul-
vt nostri terant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, et
codices valido odore. eoq; argumento, quod digitis friata
habent, non ad minima vsq; frustra resoluitur. Nec desunt,
sed λιπαρά qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare,
εάν vide exiccare, somnum allicere, & corpora densare, al-
tur legis uum resolvere. Stomachum repurgat binum co-
se. chlearium mensura, in aqua frigida aut egelida
pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum
purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ ponde-
re in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel
melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis per-
fectæ causa, tribus drachmis sumitur: alijs purga-
torijs medicaminibus admista, præstat vt minus
stomachum infestent: sicca glutinâdis vulneribus
inspargitur, ulcera ad cicatricem perducit, cohi-
betq; : eadem peculiariter exulceratis genitalibus

medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabrae lippitudines, pruriginesq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pēnaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimū, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Absynthium. Cap. XXIII.

Absynthiū, aliqui bathypicron herba vulgò cognita. Præstātius in Ponto, & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi et adstringēdi: bilem expurgat, quæ & stomacho et ventri inhæsit: urinā cit, & crapulam præsumptū arcet. Ad inflationes ventris, et stomachi dolores prodest, cū seseli et nardo Gallico potum: fastidia discutit, et arquatos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cū melle appositum. Cōtra fungorū strāgulationes conueniēter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cū vino itē cicula, et muris aranei morsibus, et draconis marino.

DIOSCORIDIS

Angina eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs et iocineri, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoq; longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cū ficis autem, aceto & loliacea farina, aque inter cutē lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absynthiten vocant, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cū febris carent: alioquin in æstate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. Insparsum arcis absynthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentū librarium diluto eius tēperatum, literas à murium erosionē tuetur. Existimatur liquamentū eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniā stomachū malè habet, & capitis ciet dolorem. Sūt qui cocta amurca, liquamentū adulterāt. **Marinum Absynthium. Cap. XXIII.**

Absynthium marinum, quod aliqui seriphū vocant, copiosissimum in Tauro monte: iuxta Abroxta Cappadociam & in Taphorisi Aegypti gitionū magnitur: quo Isiaci pro olivæ ramo vtuntur. Herba ē rē intelli tenuis, & abrotoni parvi similitudine, referta mignutulis seminibus, subamara, stomacho inimica.

Ea graniter olet, et cum quadam calfactione adstringit: per sese, aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum lenigat: cum edulio autem vel lenticula decocta, eadem prestare potest. Peccora maxime pinguescit hoc pabulo. Tertium genus absynthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Sātonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absynthio non dissimile, verum subamarum est, nō adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

Abrotonum. Cap. XXV.

Abrotonum duorū est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim, incis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodit, suaviter olet, cum gravitate quadā & amaro gustu: id genus Siculum esse cōstat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis vti absynthiū. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritū & feruefactū ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, convulsis, ruptis, coxendicibus, urinae angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialiū venenorum antidotū est: horroribus ex oleo illinitur: serpētes & substratu & udore fugat: contra ictus eorum cum vino po-

DIOSCORIDIS

tum prodest priuatim efficax contra scorpionū & phalangiorum venena: oculorum inflammationibus commodè illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane tritum cū farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: irini compositionibus admiscetur.

Hyslopum. Cap. XXVI.

Hyslopum, herba nulli nō cognita, duum generum est, montanum & hortense. Optimum est Ciliciū. Vim habet extenuandi & calfaciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspiriosis, destillationibusq; & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Adem facit, si cū melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctū ex aceto mulso epotum: & ad subducendam aluum cū ficis viridibus detritis manditur, vehementiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit: colorem in corpore fouet lieni, & aque inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex vino illinitur: cū feruente aqua impositum, sugillata discutit cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collatione sedat: inflammationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Stoechas. Cap. XXVII.

Stoechas iuxta Galliam in insulis eiusdē nominis, Stenae è regione Massilie gignitur, unde cognomen accepit. Herba tenuibus surculis, comæ thyni, longiore folio, subamara gustu, et aliquantū acris.

Cuius decoctū hyssopi modo, ad pectoris vitia effi-
cax est Antidotis miscetur. Viscera omnia & vni-
uersum animantis habitum extenuat, ab obstru-
ctionibus & sacris liberat.

Origanum. Cap. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod & cuniculū
vocant, folium habet hyssopo non dissimile:
umbellam aut non in rotā speciem orbiculatā, sed
veluti multifidam, semine in summis virgis haud-
quaquam denso. Excalfacit: unde decoctum cū vi-
no potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam
aut meconion hauserunt, ex passō: si gypsum aut
ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, con-
uulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Aridum ace-
tabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humo-
res per aluum extrahit: menses ciet, & iussi cum
melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, re-
giumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Suc-
cus virentis tonsillas, vuam, & oris vlcera sanat,
& per nares, ex oleo irino infusum, trahit: aurium
dolores cū lacte mulcet. Conficitur ex eo, & capis,
et rhois frutice, quo ad obsonia vtuntur, vomitoriū
medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies
bis videnos insolatis, dum caniculæ sydus flagrat.
Herbæ aut substratu serpentes fugantur. Quæoni-
tis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo simi-
lior: Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis
ei origani Heraclei, sed multo inefficacior. Syluestris

DIOSCORIDIS

origanum, aliqui panaces Heracion, alij cunilam
vocat, ex quibus est Nicader Celophonius. Folijs
est origani, ramis tenuibus, doratē altis, in qui-
bus umbelle anethi insunt, flores candidi: radix te-
nuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente,
folia & flores ex uino poti auxiliantur.

Tragoriganum. Cap. XXIX.

Tragoriganum tenuis frutex est, sylvestri ser-
pillo aut origano similis, folio & ramulis.
Quibusdam in locis latius virentiusq; inuenitur,
& latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exili-
bus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prasiū
vocaere. Optimum est Cilicium, & Cretense, &
Smyrneum, & in Chio cooq; proveniens. Omnia
excalfaciunt, urinam cient, aluo accōmodantur,
decocto poto bilem deijciūt, lienosis ex aceto bibere
prodest, cōtra pota ixiē venena in vino bibuntur,
menses trahunt: peripneumonici, tussientibus, ex
melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorū po-
tio est: quare cibum fastidientibus & stomacho
acida ructanti, imbecilloq; traditur. Itē si a maris-
tima iactatione nausea et æstus præcordiorū exci-
tetur. tumores vero cum polenta illita discutunt.

Pulegium. Cap. XXX.

Pvlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat,
calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac par-
tus eijcit: pulmonis vitia ex melle & aloe potum
extrahit, & convulsis auxiliatur, nauseas stomas

chiq; intercisiones, ex posca permulcet: atrā bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimè cōtra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingivas aresacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omneis sedat, podagris per se subuenit, impositum vsque dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit, lienosis cum sale vtiliter illinatur: decoctum eius ablutas pruriginis mitigat, conuersas vulvas corrigit, contra inflationes duritiasq; vulue, n des sessiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui ble chona, quoniā dum floret, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium. Cap. XXXI.

Dictamnium, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretēsis herba est, acris, leuis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ satium pulegiū, sed efficacius multò. nam non potum modo, sed appositū quoq; aut suffitum, defunctos partus eūcit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polēta tritus. Herba impactos pedibus reliquoue corpori aculeos, illitu reficit. Ad lienis dolorem efficax habetur: si quidē ipsum imminuit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit, partus accelerat. Succus cum vino

Græcus,
Dicta =
mum: ac
sic etiam
Plinius.

DIOSCORIDIS

potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta
herbae facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae
venenato ictu saeviunt, appensaque contactu exanimet.
Vulneribus ferro illatis, & venenatis mor-
sibus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam
ab instillatione statim in potu assumatur. Quod
pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur,
ante dicto simile, sed minus quam illud acre.
Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multo. De
fertur à Creta alterum dictamni genus, folijs si-
symbrum, ramis maioribus: in quibus flores sylves-
tris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisym-
brium & saluam iucundissimus. Efficax ad eas-
dem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris et
medicaminibus, quae aduersus serpentium iniurias
confinuntur, theriaca vocant.

Salvia.

Cap. XXXII.

Salvia siue elelissphacon, frutex est ramosus, longus,
virgas habens quadrangulas, & canas:
folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora,
crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium
scabritie referant, hirsuta, subalbida, perquam iu-
cundo odore, sed graui: semen summis in caulibus
sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur.
Menses cit & urinas, decoctum foliorum ramoso-
rumque potus, & partus extrahit, et pastinaca ma-
rina ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerum
sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat: testium pro-

ritus sedant rami foliaq; , si & decocto eorum so- & ου
ueantur. p i v w q

Mentha. Cap. XXXIII.

Mentha, cognita herba est, calfaciendi, adstrin-
gendi, atq; exiccandi vim habet. Sistit san-
guinem, potio ex aceto succo: lineas in ventre tere-
tes enecat, venerē stimulat, singultus, vomitiones,
cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati
succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta
illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet:
mammæ, si tendantur, aut lacte turgeant, compe-
scit: cum sale, canum morsibus illinitur: aurium do-
loribus cum aqua mulsa subuenit: vulvæ ante coit-
um admota, cōceptioni resistit: lingvæ scabritiem
confricta lenigat: coire lac, densariq; in caseum nō
patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In
summa, stomacho utilis est, & in condimentis pe-
culiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Lati-
ni menthastrū vocant, hirsutior est folio, & pror Mentha
sus maiore, quàm si symbrū, odore magis viroso: Strum.
quare minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha. Cap. XXXIIII.

Ex calaminthæ generibus quedam montibus Calamē
familiaris, folia ocimi habens, incana, surculum of-
los, & caules angulosos, purpureum florem: Alte-
ra pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre
pulegium ideo appellarunt, quòd odore ipsum
emuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia men- Nepeta.

DIOSCORIDIS

thastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia, & acria: radix supernacua. Nascitur in cāpestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, et vrinās expellit: ruptis, coluulsis, orthopnoe, torminibus, choleris, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: praesumpta in vino, venenu resistit: tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum sale et melle pota, enecat: nec secus cocta crudae, si teratur. Elephanticos esitata adiuvat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accēsa aut substrata, serpētes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & sugillata tollūt. Calamintha ischiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, summā cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Thymum. Cap. XXXV.

THymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs, multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpurascēte refertis. Gracili solo, & petroso prouenit. Vim habet hanc, vt cum sale & aceto potum, pituitā per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit: vrinās ciet: cum melle in coleg

in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit: ischiadicis cum vino, & polenta imposita subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum, qui recte valent.

ANNOTATIO.

Herba, quam Medici pro satureia hodie vsurpant, hyssopi folio, thymum magnitudine longè exuperat, vt non esse genuinam, ac hic descriptam, satis eius historia conuincat.

Satureia. Cap. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamè, & tenerior: desert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadè potest quæ thymum, si modo cõsimili sumptitetur. Aptus sanis vsus: Est etiãnum quadã satina, syluestri prorsus minor, q̃ propter mitiorem acrimoniam, cõmodius in cibos recepta est.

Serpyllum. Cap. XXXVII.

Serpyllum duorum generum est: Hortense odore sampsuchum imitatur, atq; in coronas addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terrã attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores: in maceris multo procerius assurgit. Sylue-

Q

DIOSCORIDIS

stre, xygis appellatum, non serpit, sed in altitudine
 increscit, ramulos edens tenues, surculosos, folijs re-
 fertos, longioribus quam rutæ, & durioribus, angu-
 stis: flores incunde olent, gustanti acres: radicis nul-
 lus usus. Nascitur in petris, satius efficacius, atq;
 magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius.
 Menses trahit, urinam potu ciet: torminibus, ruptis,
 vulsis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur:
 & aduersus serpentes potu illi uide: capitis dolores
 mulcet coctum, adiecto rosacco, & madefactum
 in aceto: maximè vero phreniticis, et lethargicis co-
 uenit. Cruetos vomitus sedat succus, drachmis qua-
 tuor ex aceto potus.

Sampfuchum. Cap. XXXVIII.

Sampfuchum in Cypro, & Cyxiceno laudatissi-
 mum: secundum sibi locum vendicauit Aegy-
 ptium. Amaracum gens Sicula, et Cyxigena appel-
 lat Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius
 calaminthæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, &
 rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo coronis
 inseritur. Vis eius excalfaciens: Succus decocti po-
 tus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos
 urinae difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex
 melle arida folia, sugillata tollunt: menses subditi
 in pessa trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto &
 sale illinuntur: luxatis tumoribusq; cerato excepta
 imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tu-
 moresq; cum polline polentæ illini prodest. Acapis ma-

lagmatisq; calfaciendi gratia commiscetur.

Melilotos, siue fertula Campana.

Cap. XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyxico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vini habet adstrictoriam: inflammationem omnem emollit, praesertim quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum aut addito oui luteo assato, aut sceni graeci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intyboe. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, et cruda, & cocta cum aliquo ex antea dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum. Cap. XL.

Marum herba cognita vulgo, surculosa, flore origani, folijs multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet si symbrio consimile. Substringit enim, & modice calfacit: qua de causa illitu serpentia ulcera sistit, et in calidas illitiones additur. In iuxta Magnesiā & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos. Cap. XLI.

Acinos aut aconos à Graecis dicitur, tenui siccacoque ramulo herba, ocimo similis, odore

Q ij

DIOSCORIDIS

rata, sed hirsutior qua coronæ factitantur, à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis.

Cap. XLII.

** id est odorata.* **B**accharis herba & fruticosa, q̄ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicâte, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squallidumq; solū amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ tussis, & vrinæ difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in vino. Recens radix apposita, partū extrahit puerperis eius decoctū in desensionibus prodest: in diapasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu prosunt: oculorū inflammationibus, māmīs tumentibus à partu, egypcijs incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta.

Cap. XLIII.

Ruta montana sylvestrisq; sativa et hortensis acrior est, & in cibis damnata: sativa vero quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraq; vrit, calfacit, exulcerat: vrinā ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibove lethæ

lium medicamentorum antidotum est, si semen ex vino, acetabuli mēsurā, ebibatur. Folia per se prae sumpta, aut cum nuce iuglande, aridisq; ficis, inef ficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit: genituram cibo po- tūe extinguit: cum anetho sicco decocta tormina sedat. Facit ad pectoris laterumq; dolores, difficul- tatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, co- xendicum articulorumq; cruciatus, & horrores fe- brium circuitu repetētes, pota vt antē dictū est. Atē ad inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini, cū oleo decocta, & infusa. Foeminas vuluæ strangulatio liberat, si à genitali, sede tenus cum melle subijcia- tur. Feruesfacta ex oleo, & pota, vētris tineas ex- cutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cu- tem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias parteis, et oblita. Cru- da conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores ocn- lorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cū rosaceo, & aceto illita auxiliatur, profluentē nari- bus sanguinem sistit trita & indita, testium in- flammationibus cum laureis folijs imposita, et erup- tionibus papularum cum myrto, & cerato pro- dest. Cum pipere aut, uino, & nitro affricta, albe- nitigini medetur. Cū eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas, quæ thymi florē representant: contra impetigines cum alumine, & melle utilissi- mē imponitur. Succus in mali punici calyce calfa-

DIOSCORIDIS

Etus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum sceniculi succo ac melle peruncti iuuatur: ignem sacrum, vlcera quae serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerusa persanat: mansu, alliorum caparumque acrimoniam domat. Montana, si copiosius estur, interficat. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam vnctis antea manibus, et facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum feles arceret. Adijciunt eam, quae in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinentiam urinae tostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly uocatur. Syluestris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicis doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

Syluestris ruta. Cap. XLIIII.

Vocant etiamnum syluestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice, multos emittit cauliculos: folijs multò, quam alterius rute longioribus, tenerioribusque, odore grani: flore cā

dido: capitulis in cacumine paulò maioribus quàm
satiue rute, quæ tribus maximè partibus cõstat:
in quibus triangulũ semen, subrusum, gustu ama-
rum recluditur, cuius est vsus. Semen autumnino ma-
turefcit: quod cũ melle, vino, croco, & fœniculi suc-
co, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculo-
rum aciem. Sunt qui eam harmalam vocent, Syri
besasan. Qui Cappadociã incolunt, moly, quoniã
quandã cũ moly seruet similitudinẽ: radice nigra,
flore candido. In collibus, & leto solo prouenit.

Moly. Cap. XLV.

Molyfolia habet graminis latiora, humi spar-
sa: florem albæ violæ similem, sed minore,
ac magnitudine violæ purpureæ respondentem, la-
et ei coloris: caulem candidum, quaternum cubito-
rum, in cuius cacumine inest aliquid, quod allij spe-
ciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in
modum valet ad aperiendas vuluas, si trita cum
rino vnguento, in pessa subiiciatur.

Panaces. Cap. XLVI.

Panaces nonnullis heracleũ dicitur, ex quo
opoponax colligi solet. Plurimum in Bœo-
tia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq;
cõpendij, & quæstus, qui ex eo liquore factitatur,
gratia studiose colitur. Folys est asperis, in terra ia-
centibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea ac-
cedentibus, in ambitu quinquepartitò diuisis: cau-
le, vt ferule, altissimo, qui lanugine quadam in-

Q iij

DIOSCORIDIS

canescit, folijs etiam minutioribus obsitus, muscae-
rũs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine
odorato feruenteq;: radices habet multas ab origine
uua, candidas, graueolentes, crassi corticis, & sub
amari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Ma-
cedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti cau-
lium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui
siccatus in summa cute croceum colorẽ contrahit.
Effluentem aut succum excipiunt, folijs excauato
solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo cau-
le mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Me-
liores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq;: siccæ,
quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gu-
stu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed
ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret Ma-
ximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissi-
mus, internè albus, aut subfuluus, foris ad croci co-
lorem inclinans, leuis, pinguis, friabilis, tener, stat-
tim in aqua eliquescent, graui odore. Niger impro-
batur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut ce-
ra: sed synceri experimentum est, si digitis in aqua
friatus resolvatur, & lactescat. Excalfacit, mol-
lit, extenuat: horroribus febrium circuitibusq;: uul-
sis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio uri-
ne conuenit. Contra uesticæ scabiem ex aqua mul-
sa aut uino bibitur: menses trahit, foetum enecat,
inflationes, quæ uuluam malè habent, duritiasq;:
ex melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur, aco-

pis & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum uua passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, canis inditus: oculorum aciem illitu excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum cōtra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conscissa, uulue admoda, partus extrahit: ad uetera ulcera efficax est, nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semē cum absynthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ uenenum eiiculantur, & contra uulue strangulatus in uino bibitur.

Panaces Asclepij. Cap. XLVII.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuē, cubitalem, geniculatum, circa quem folia scæniculi funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq; odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicant aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliarem uim habent flores & semina, cōtra ulcera, phagedænas, & tubercula, si trita cū melle imponantur: aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum uocant, aliū cumilam, de qua in origani mentione diximus.

Panaces Chironium. Cap. XLVIII.

Panaces Chironium, in Pelio monte maximè prouenit: solium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu

DIOSCORIDIS

acris. Pota radix serpentium veneno resistit, illita
Loma, eadem præstat.

Ligusticum. Cap. XLIX.

Galenus
Ibysti-
cum.
Ligusticum, quod alij panaceam, alij panaces
vocant, plurimū in Liguria nascitur in mon-
te Apennino, Alpibus contermino: unde nomen tra-
xit. Panaces incolæ non ab re appellant: quoniā &
radice & caule, heracleotico panaci simile sit, &
viribus eisdē præditum. Gignitur in altissimis aspe-
risq; montibus, ac vmbrosis, maximè uero iuxta
fluenta. Cauliculum fert anethi, geniculatum, te-
nuem, & in circuitu folia fertulæ campanæ, mol-
liora, odorata, prope verticem graciliora, & longè
magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semē
dependet nigrum, solidum & oblongum, sceniculo
proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix
candida, heracleotici panacis similis, odorata. Ra-
dicis seminisq; vis excalesfactoria, concoquens: pro-
dest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones.
Item ad inflationes, præsertim quibus Stomachus
turgeat: & contra serpentium ictus: urinas & mē-
ses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita
radix. Semen cū radice oxyporis & medicamentis
decoquentibus admiscetur: ori perquàm utile: qua-
re pro pipere vtuntur eo indigenæ, a l obsonia. Adul-
teratur semino quodam simili, quod facile gustu
discernitur: amarum enim est. Alij semen sceniculi
aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Pastinaca.

Cap. L.

Pastinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara. caulē rectum scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferē ad croceum accedente: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, que cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua movet. Iis convenit in potione, quos urinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutē subiit: serpentium morsibus ictibusque prodest: praesumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuvat. Radix urinam pellit: venerē stimulat, partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedenas ulcerū purgāt. Sativum ad eadem pellet, efficacior tamen, & cibo aptior.

Seseli.

Cap. LI.

Seseli Massiliense folia sceniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum: degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent: potu stranguariae & orthopnoe medentur, suffocationibus mulierum comitialibusque prosunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterem sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus utile, & contra perfrictiones in itineribus, cum pipere

Recentioribus
Siler mane
tanum.

DIOSCORIDIS

& uino bibitur: capris, ceterisq; pecudibus, datur
 in potu, quo facilius suos foetus enitantur. Aethio-
 picum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad pe-
 riclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmi-
 tibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedali-
 bus, capitulo anethi: semine in tritici morem den-
 so, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore,
 multum suauis. Peloponnense folia habet cicutæ,
 latiora, et crassiora: caulem supra Massiliensis ma-
 gnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine
 umbellam, in qua semen latius, odoratum, & car-
 & & idem, nosius pendet. Eisdem uiribus præditum est: nascitur
 id est, in tur in asperis, riguis, & collibus: inuenitur & in
 Ida mon insulis.

te,

Creticum seseli. Cap. LII.

TOrdylum, quod aliqui Creticum seseli uocant,
 iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, her-
 bula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum
 effigie, odorato, subacri. Contra urinae difficultatē
 bibitur, potu cit menses. Succo seminis, caulisq; ui-
 rentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto,
 renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pecto-
 ris excreationes, in delinctu cum melle.

Hic omis

Silon.

Cap. LIII.

sa est ab **S**ilon exiguum semen est, in Syria natum, apio
 interpre- simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lie-
 te descri- nis uitia bibitur, urinae difficultatem potu emen-
 ptio. dat, remoratos menses citat. Quo in condimentis,

cum cucurbita, & aceto, indigenæ utuntur. In cas-
cumine granula multa gerit.

Anisum. Cap. LIIII.

ANisum in summa excalfacit, exiccat: oris ha-
litum iucundiolem facit, doloris lenamentum
præstat, urinam ciet: aquam, quæ subijt cutem, dis-
sipat, potum sitim cohibet, animalium uencenis ad-
uersatur: ualet ad inflationes, aluum & alba fœ-
minarum profluuia sistit, lac ad mammas elicit,
uenerem stimulat: dolores capitis lenat, suffit nã
ribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis au-
ribus medetur. Melius semper recens, plenum, non
sursurosum, odore præstans, Inter prima laudatũ
est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. Cap. LV.

CArum, semẽ est uulgaris notitiæ. Excalfacit,
urina concitat, stomacho utile, os commen-
dat, concoctionem adiuuat, utiliter miscetur anti-
dotis & oxyporis: anisi uicem præbet. Radix co-
cta, pastinacæ modo manditur.

Anethum. Cap. LVI.

ARidis anethi comæ seminisq; decoctum, potus
lac euocat, inflationes & tormina sedat,
aluum uomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus le-
nit, oculorum aciem hebetat, & genituram res-
guit assidue potum. Fœminis uulue malo oportu-
nis, ad desefiones utile, & condylomata illitus eius
cinis tollit.

DIOSCORIDIS

Cuminum satium. Cap. LVII.

Cuminum satium ori gratū est. sed multò magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locum tenet Aegyptum: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina ceratōue, Mensium abundantiam inhibet. Cōtritum autem in aceto, & naribus obiectum sanguinis profluvia sistit. Colorem bibetium aut perunctorium mutat in pallorem.

Syluestre cuminum. Cap. LVIII.

Syluestre cuminū, plurimum efficaciusq; in Lybia & Scia & Galatie Asia, atq; Carthagine Hispania Graecia gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac teretius: sed nui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, veluti serotius ratis, & gingidij diuisura. In cacumine capitula Marcel = quina, aut sena habet. mollia, rotūda: in quibus est lili, Gala semen acerosum, gustu satiuo acriore: nascitur in Asia. collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesq;: item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat, stomacho vtile, quem humor vexat, sugillata tollit, si manducatum cum melle, & uua passa illinatur: testium inflammatio-

nibus, adiectis eisdem illitū medetur. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus promit cornicula in sublime exerta, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpētium morsibus præsidio est. Calculosis & ijs qui vrine stillicidio vexantur, aut cōcretum sanguinem cū lotio reddunt, auxiliatur, sed apij semen feruesfactum postea bibendum est.

Ammi.

Cap. LIX.

Ammi * Aethiopicum cuminum appellant, * *ἄμμι*
* plerique hoc natura diuersum esse ab illo *καὶ τὸ*
existimāt. Vulgò notum est: semen exile, multò mi- ** οἱ δὲ*
nus cumino, origanum * resipiens. Eligendum est *βασιλ*
purum, minime fursufosum. Vis ei excalfactoria, *κόνιν*
feruens, & exiccans: facit ad tormina, vrine diffi- *κόνιν*
cultatem, serpentis iētus, cum vino potū. menstrua *δὲ &c.*
ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medica- ** τῇ*
mentis, quæ ecdoria vocant: vt inde exortis vrine *σκι*
difficultatibus resistat. Sugillata cū melle tollit, co-
lorem potus aut illitu mutat in palliorem. Suff. tum
cum uua passa aut resina, uulvas purgat.

Coriandrum.

Cap. LX.

Coriandrum, aut corianum, vulgaris est notie, vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, medetur: epynictidas cum melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosque sanat: cum faba fresa, strumas & tunc

DIOSCORIDIS

ἰλίου,

bercula discutit: tineas interaneorum expellit & fēmen cum passo potum, et genituram adauget: largius autem sumptum, mentem nō sine periculo mouet, quare cōtinuo, & copiosore usu abstinendum. Succus cum cerusa, spumāue argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Hieracium.

Cap. LXI.

Hieracium magnū, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitū: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi, habet, & modicè substringendi: unde illitū, stomacho aestuati, inflammationibusq; prodest. Succus erosionē stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpiōe ictibus auxiliatur. Hieracium parvū, folia eodem modo obtinet ex interuallis diuisa per ambitū, cauliculos teneros, uirētes, in quibus lutei flores, orbē circumātes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ. Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in iudicij, sensu, κεφαλαία μεκωνία περιμεφερή. id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autē locus ex Theophrasto ac Plinio quo Oreoseliaon cicutę folio describunt, hoc modo posse restitui: φύλλα μεκωνία περιμεφε-

ρή,

πεμφεῖν, id est, folia cicutæ non absimilia:
quo d cum alijs satis aptè cohæret. Velim
tamen in hac re, vt & alijs omnibus, suo
quenque vti iudicio.

Apium.

Cap. LXXII.

Hortenſis apij herba ad eadem, ad quæ coria
num, conuenit: inflammationibus oculorū, Noſtrū
cum pane aut polenta illinitur: æſtuantem ſtoma- Petroſeli
chum mulcet: māmaram duritiā ex lacte cōcre num, vt
to contractā reprimi: vrinā ciet, ſiue crudam, ſiue colligi-
coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potum, ve tur ex no-
nenorum noxæ reſiſtit, quum vomitiones excitet: tis Plinij.
aluum cohibet. Semen vehementius vrinā pellit
contra ſerpentium venena, aut epotā argenti ſpu-
mā auxiliatur: inflationes diſcutit. Admiſcetur me-
dicamentis, quæ dolorum leuamenta præſtant: the-
riacis quoq; , ac tuſſis remedijs. * Eleoſelinum in * Apiū
humidis naſcitur, ſatiuo grandius, & ad eadem officina-
efficax. Oreoſelinum, caule eſt dodrantem alto, ab rum.
radice tenui exeunte: per cuius ambitum ramuli,
* et capitula cicutæ, multò tamē tenuiora: ſemine
cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui: naſcitur
in petroſis & montibus. Vrinam ciet, ſemine ac
radice in vino potis: menses trahit. Antidotis,
necnon medicamentis vrinam cientibus, & exal-
faſlorijs, inferitur. Nec allucinari nos oportet, exi-
ſtimātes oreoſelinum eſſe, quod in ſaxis prouenit:
aliud enim eſt petroſelinum. Petroſelinum in Ma-

R

DIOSCORIDIS

cedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammi
odoratiore, sapore acri, aroma olente. Urinam cit
ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes;
& tormina prodest: laterum, renum, & vesicæ do
loribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis vri

* Gale-
us smyr
nium. de
quo se-
quēti ca.
Romanis
sic dictū
fuisse, li.
2. de A-
lim. fa-
cult. tra-
dit.

nam cientibus Hipposelinum, & Latini olusatrum
appellant, aliqui smyrnion, quauis aliud sit, quod
proprie smyrnion dicitur, ut paulo post referemus.
Est autem maius & satius apio candidius: caule
alto, cauo, molli, habente veluti lineas: folijs latiori
bus, in puniceum vergentibus: coma roris marini,
florum plena, dependentibus in cacumine corymbis,
ante quam deflorescat: ea semine turget nigro, ob-
longo, acri, solido, aromatico: radix dimittitur odo-
rata, candida nec crassa, quæ os comendat. In um-
brosis & palustribus enascitur. olerum generis, ut
apium. Radix cruda coctæue estur. Folia cum cauli-
bus decocta manduntur, & per se aut cum pisci-
bus preparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim
hanc habet, ut poto semine ex mulso vino menses
cieat: algentes calfacit potu aut illitu: urine stilli-
cidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrnum. Cap. LXIII.

Smyrion, quod in Cilicia petroselinum vocat,
plurimum in Amano monte gignitur. Caulem
habet apij, & stolones multos: folia latiora, sub-
pinguia, ad terram infracta, robusta, odore medi-
cato, cum quadam acrimonia incunda colore in

luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, vt anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, sapore aspero, sicut myrrha, ita vt alterum alterius loco cedat: radix quoq; odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, et collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae, et seminis excoctacere. Folij muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum sistunt, radicem contra serpentium ictus bibere cōuenit, tusses & orthopnoeas mitigat, vrine difficultati medetur: recentes tumores, collectiones, duritiasq; discutit, illita & vulnera ad cicatricem perducit: paritus abortu vitiat, si feruefacta subiiciatur. Semē, lienis, renum & vesicæ vitij prodest: menses & secundas pellit: commodè datur ischiadicis in vino, & Intell inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus. ge nō co Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra ronariā febrium circuitus.

rosmari

Elaphoboscum. Cap. LXIIII. num: sed

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, & aut eā, quæ rorimarino similis, geniculatus: folij duū simplici digitorum: latitudine, vt terebinthi, prælongioribus, aliquantum asperis, circumfractis: adnata noīe apē multa habet, ferentia umbellas anethi similes, & pellatur. semina eiusdem florem subluteum: radice ternum de qua digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, c. 70. huc candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro oleris ius libri.

L ij

DIOSCORIDIS

manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium morsibus resistere.

Fœniculum. Cap. LXV.

Fœniculū si herba edatur, aut semen cū ptisanā bibatur, mēmas lacte replet. Comæ decoctū in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinā excitet: contra serpentium ictus in vino cōuenienter bibitur: mēses: ciet: in febris nausēam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices et cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandā oculorum aciē commodē temperantur. Extrahitur succus ad eadē valens, etiam semine viridi, ramulisq; et radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occidentē spectat, succum reddit gummi similē. Caulem medium, dū herba floret rustici demetunt, igniq; admouēt, quod facilius vt caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hippomarathrum. Cap. LXVI.

Est & sylvestre fœniculum, magnum: fert autem semen canchryi simile, cuius radix iucundè olet, potāque stranguriæ medetur: menses imposita ciet: ventrem sistit, radice aut semine poto, & contra serpentium morsus auxiliatur, calcu-

losq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-
 Etis abundantiam facit decoctum foliorum hau-
 ſtum, et ſceminas à partu purgat. Traditur aliud
 hippomarathri genus, longo, exili, & anguſto fo-
 lio: ſemine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
 calfaciendi naturam habet, & viribus ſceniculo
 reſpondet, ſed ad omnia infirmius.

Daucum. Cap. LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creticum fo-
 lijs ſceniculo ſimile, minoribus & tenuiori-
 bus caule dodrantali, vmbella coriandri, flore al-
 bo: ſemine acri, candido, hirsuto, ſuauiſſimi odoris
 in mandendo: radix digitali craſſitudine & dodra-
 tis longitudine adoleſcit: in ſaxoſis naſcitur, & lo-
 cis ſole illuſtratis. Aliud eius genus, ſylueſtri apio ſi-
 mile, acre, odoratũ, aroma olens, feruentis guſtus.
 Probatiffimũ Creticũ. Tertium aſſignatur genus
 folijs coriãdri, floribus albis, capite & ſemine ane-
 thi, muſcario paſtinacę: ſemine oblongo, ceu cumini,
 acri. Omniũ ſemẽ excalfacit: potum vrinã, mēſes,
 & partus extrahit, torminibus liberat, veterẽ tuſ-
 ſim mitigat: phalãgiorũ morſibus potũ in vino au-
 xiliatur: tumores illitu diſcutit. Seminis dũtaxat i
 alijs generibus inualuit vſus: in Cretico, etiã radi-
 cis, quę maxime cõtra venenatorũ iniuriã in vino
 bibitur. Delphiniũ. Cap. LXVIII.

DELPHINIUM, ſurculos emittit à radice vna
 ſeſquipedales, aut maiores, à quibus folia

DIOSCORIDIS

exerunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant: unde tractum nomen est. Flos violæ albe non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud utilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque ignis uos torpescere: semota uerò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphiniū, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrum. Cap. LXIX

Pyrethrum Romani saluaream vocant, folia caulemque; emittit ut daucum syluestre & fœniculum: umbellamque; anethi, circumnate rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit: ideò in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituita extrahit: sudores ciēt, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax est & contra perfrictiones membrorum, resolutionesque; eximie conducit.

Rosmarinus. Cap. LXX.

Cāchrys

Dvorosmarini genera: unum fœcundum frugiferumque; cuius semen canchrys vocatur. folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concanum alis: in

cacumine umbellam, in qua semen copiosum, canis-
didum, sphondylo simile, intundū, angulosum, acre,
resnaceum, quod in mandendo linguam exurit: ra-
dix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alte-
rum omnino consimile, semen ferens latum, nigrū,
vti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radi-
ce foris nigra, intus si frangatur, alba. Verū id
quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem re-
fert: sed neque caulem, neque florem, neque semen
promit. Nasctur in saxosis & asperis. Trita om-
nium herba communiter hæmorrhoidū profluvia
sistit, sedis inflammationes & condylomata miti-
gat, concoquit strumas & abscessus, qui ad matu-
rationem egrè perducuntur. Siccæ radices cum mel-
le vlcer. i purgant. torminibus medentur cum vino
potæ, & contra serpentii morsus conueniunt: men-
ses et vrinas cient, veteres tumores illitu discutiunt.
Tam radices quàm herbæ succus, adiecto melle illi-
tus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadē
pollet, si comitiale malum sentiatur, aut vetus pe-
etoris vitii, auxilio est: regio morbo laborantibus
cum vino & pipere datur: sudores mouet, cū oleo
peruncum: ruptis & conuulsis prodest podagris,
cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur: pur-
gat vitilignes, addito aceto quàm acerrimo. Semi-
ne in potionibus vtendum, eius quidem quod can-
chryn non ferat, quippe illud sua acrimonia ar-
teriam exasperat. Rosmarinum cum erica nae

R iiij

DIOSCORIDIS

sci, folijs lactuce sylvestris amaræ asperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus author est: potuq; id ipsum alterutra parte purgare. Cancchrys vim habet excalfaciendi, & vehemēter excicandi, quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die solvatur.

Rosmarinum coronarium. Cap. LXXI.

Rosmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia. subter incana, supernè virentia, & diu Mar graui odore. Excalfactoria vi præditum est: regiū cellus, cū sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & vbi laborans exercitationi se crete odora diderit, in balnea descendat, & merum potet. Aco-
ta. pis, gleucinoq; vnguento admisceri solet.

Sphondylium. Cap. LXXII.

Sphondylium folia quadāntenus platani & panacis habet: caules foeniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, et magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocineris vitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vulnarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat: cum alio cōmodè infunditur capitibus phrenia.

ticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrassa eadem, & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula. Cap. LXXIII.

F Viridi ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationes, coeliacosq; & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur sudores ciet, vincto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: maria condiuntur. * Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum: folia sceniculi, longe asperiora, & latiora. qua ab imo caule vulnerta, sagapenum efficitur.

* Desunt
in codice
nostro
græco,
ac anti-

Peucedanum. Cap. LXXIII.

P Eucedanum, caulem emittit tenuem, gracilentum, sceniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq; flore luteo: radice nigra, crassa, gravi odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidem confestim evanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentia-

quisi-
mis qui-
busque
Marcello
teste.

DIOSCORIDIS

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac, quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mādāgora: verūm inefficacior succo lacrymā habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concretā inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruēs gustu. Ex oleo & rosaceo illitum peucedanū prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, cōmulsis: omnibus, in vniuersum, vitijis neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternosi renocātur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. canernus dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissime ex ovo assumitur, suspirijsq; & torminibus, et inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absorbit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potū, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerato, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pape calido, aut anetho resoluitur.

*Herba doctis omnibus pro melanthio recepta, foliis fœniculum potius quàm senecionem uidetur imitari, ut certè locum hunc esse aut depravatū, aut uerum ignorari melanthion, sit suspicandum.

Gith, seu Melanthium.

Cap. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos
dodrantes excedens: folijs: ut senecionis
minutis, sed multò tenuioribus: capitulo
in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblōgo, in-
tercursantibus intus membranis: quibus semen in-
cluditur nigrum, acre, odoratum, quod panibus in-
spargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subue-
nit. discutit recentes oculorum suffusiones, tritum
ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigi-
nes, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum:
circūscarificatos clauos excutit, cum vetere urina
impositum: dentium doloribus, decoctum cum ace-
to, & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit,
peruncto ex aqua umbilico: destillatione laboran-
tes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum: urinā
& menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac
extrahit, difficultatem spirandi cum vino potum
leuat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachmæ
pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fug-
gantur. Tradunt largius epotum enecare.

D I O S C O R I D I S
Laserpitium, & Laser. Cap. LXXVI.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem masspetum vocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix excalfacit: in cibis egrè concoquitur, vesicae noxia: sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. praefertur autem rufum, translucens, myrrhae emulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenai cum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeò ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabae lomento: quod maleficio deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia masspeton vocauerunt. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis densa

tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circunligatur, aut cum hyssopo, sicis coctis in posca, os colluitur: yjs prodest, quos bestia in rabiem efferrata momorderit, vulneribus immissum: valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ virus eiaculantur. potum, aut illitum: scorpionum plagis oleo dilutum circunlinitur: gangrænis præcoercitis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos callosq; prius circunrasos vellit: cerato aut aridorum sicuū carne præmolitum, recentes lichenas ex aceto sanat. Et ex crescentia in carne, polyposq; , si aliquot diebus cū atramento sutorio, aut æruginè illinatur: extuberantia cum forsice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoq; irruentem vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: vnam illitum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa vtilissimè gargarizatur. vescētes eo, letiore colore mangonizat: tussi commodè in sorbitione, & aqua inter cutem, cum aridis sicis: horrores discutit cum vino, pipere, & thure potū: nervorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum: hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha potū: cœliacos adiuvat, in acino vix sumptum: cum lixi

DIOSCORIDIS

uio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq;
prodest: ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut
ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem
proficitur, sed multo inefficacius: cum aceto mulso
manditur, ad expediendam arteriam, maximè cū
vox retunditur. eo cum lactucis vtuntur: exitq; in
vicem eruce. Fertur & altera in iugudaris in Li-
bya nasci, radix la serpitio similis, sed minus cras-
sa, acris & fungosa, ex qua non profuit succus:
eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. Cap. LXXVII.

Sagapenu ferulaceæ herbe succus est, quæ
in Media nascitur. Optimum est traslucēs,
fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio
quid inter laser & galbanū redolens, gustus acri.
Prodest lateri, et pectoris doloribus, tussibus vetu-
stis, conuulsis, et ruptis. Crassam pulmonis pituitā
expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lieno-
sis: itē contra neruorum resolutionē, perfrictōnes,
& febrium circuitus in potu: in vnguenta probè
admittitur: menses pellit, sed fœtum exanimat, cū
hydromelite potū: prodest ex vino haustū serpentiū
ictibus. olfactū ex aceto, vuluerrū stragulatū ex-
iccāt, oculorū cicatrices, offusā caliginē, hebetudi-
nes, suffusiōesq; detergit. Resoluitur vt laser, ruta,
aqua, et amaris nucibus. aut melle, aut calido pæ.

Euphorbium. Cap. LXXVIII.

Euphorbium Libycæ arbor est, ferulæ spee

ciem habens, quæ * in monte Atlante iuxta Mau * Ita
ritaniâ inuenitur. Ea acerrimo succo turget: cuius Plin. græ
eximium feruorem expanescens incolæ, ouillos cus in
ventres elutos, arbori circumlingât, & eminus cau tmo-
lem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde
atq; vase quodam, in ventriculos copiosus lactis
humor effluit, præter id quod humi sparsum, vul-
nus ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi ma-
gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ven-
triculis concrevit, atq; vitreum spectatur. Eligen-
dum est translucens, & acre. Euphorbium adulter-
ratur sarcocollæ, & glutini mistione, sed difficile
quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os
accēsum diu detineat, adeo vt quicquid ori obijcia-
tur, planè euphorbium resipiat. Eius inuentio tem-
pore Iudæ regis Iibie cognita extitit. Succus illius
suffusiones discutit: potus tota die exurit: quare
melli collyrijsq; pro acrimoniæ ratione admisceri
debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera po-
tione haustus. Squamas ossium eadem die eximit:
verum eo vtentes, necesse est linamentis aut cera-
tis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Ali-
qui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente ni-
hil molesti passuros, si icisa osse tenuis capitis cute
tritrus succus infundatur, vulnusq; postea cōsuatur.

Calbanum. Cap. LXXIX.

G Albanum succus est nascentis in Syria fe-
rule, quod nonnulli metopium vocant. N. 1.

DIOSCORIDIS

ximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effi-
giem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens
nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui odore,
neq; valde humidum, neq; nimis aridum. Adultera-
tur faba fresca, resina & ammoniaco. Galbanum
excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac par-
tus trahit appositum vel suffitum: lentigines aceto et
nitro perunctas tollit: deuoratur ad tussim vel erē,
difficultatem spirandi, suspiria, rupta, cōuulsa: ad-
uersatur toxicis, potum cum vino & myrrha. si-
mili modo sumptum mortuos partus extrahit: im-
ponitur lateris doloribus, & furunculis: comitia-
les, & vuluæ strangulatus, & vertiginosos olfa-
ctu suscitatur: si vratur, fugat nidore serpentes, &
perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo
& sphondylo circumpositum, necat: dentium dolo-
rem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat. vrinæ
difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potio-
nes amaræ nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pa-
ne, mulsæue, aliàs meconio, cre, vsto, aut felle liqui-
do. Si purgare Galbanū voles, in feruentem aquā
demittito: namq; cum liquefactum fuerit, eius sor-
des fluitabunt: quas hoc modo facile separabis:
mundo linteo raroq; alligatum in fictili aut ærea
pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: oper-
toq; vase in feruidam aquam demittito: sic enim
syncerum veluti per colum eliquescet, et lignosum
in linteo remanebit.

Ammoniacum.

Ammoniacum. Cap. LXXX.

Ammoniacum, ferule succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus trhausma, id est, friaturam appellant: quod vero terram, & calculos collegit, phyrama. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiesque discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmae potere haustum: articulorum coxendicumque doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur: cruentam urinam pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absument: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisque durities sedat: discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. Cap. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in Perside nascetis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-

S

DIOSCORIDIS

hibet: emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Glaucium. Cap. LXXXII.

Glaucium, succus est herbae, quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs fere cormiculati papaveris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semisrigidis clibanis calfaciunt indigene, usque dum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamentum, utpote cum inter initia refrigeret.

Glutinum. Cap. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vocant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est, & translucent. Nigrum vero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. vulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium. Cap. LXXXIII.

Ichthyocolia, gluten piscium, veter est piscis cetacei. Praestat candicans, natione Ponticum, subasperum, minime scabrum, et quod celerrime liquefit. Utile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanotris, quae cutem faciei erugant, et extendunt.

Viscum. Cap. LXXXV.

Viscum optimum est recens, intus porraceum,

LIBER TERTIVS. 138

extra fuluum, quod asperi nihil, aut surfuosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fruticis folio: contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plevisque alijs arboribus: quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturationem perducit: cum resina autē, & cera pari, epinyclidas in splenio sanat: vetera vlcerā abscessusq; quos cacocēhis vocant, ex thure molli: lienē cum calce, gagate, aut Asio lapide coctū, & impositum absomit: cum sandaracha, aut auri pigmento illitū, vngues extrahit: mistum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine. Cap. LXXXVI. Vūlgō

Aparine ramis multis, & paruis fruticat, asperguas peris, quadrangulis, per intervalla orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, albū, vmbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra viperarum phalāgiorumq; morsus auxiliatur: infusa aurium dolori medetur. Herba cū axungia trita strumas discutit.

Alyssum. Cap. LXXXVII.

Alysson exiguus frutex est, vnicaulis, su-

S ij

DIOSCORIDIS

asper, rotundis folijs fructu duplicium scutorū effigie, in quo est semen, quadāntenus latum. in motibus, et asperis locis emicat. Eius decoctū singultus sine febre, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. Cap. LXXXVIII.

Asclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris virus graue: semen securidacæ. nascitur in motibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ mamarumq; vlcera, quæ cacoethe vocāt, illinūtur.

Atractylis. Cap. LXXXIX.

Atractylis, spina est cuico similis, folia multò longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaq; qua fœminæ pro fusis vtuntur: capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, & vino teruntur vtilissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quandiu e. i. teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescente.

Polycnemonum. Cap. XC.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs origani caule, ut pulegi, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinadis recēs, aut aridū cum aqua, efficaciter illinitur: se l quinto die solui debet. Ad vrinae stillicidia ruptaq; cum vino bibitur.

Clinopodium. Cap. XCI.

Clinopodium frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duum dodrantū altitudine. nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti speciem lecti pedū præbent. Bibitur herba & succi eius decoctū, ad convulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eicit, aliquot diebus potū. alium sistit decoctū ad tertias, potūq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum. Cap. XCII.

Leontopetalon, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parva duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemone similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaveris diuisura. radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis et fegetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

D I O S C O R I D I S

Teucrium. Cap. XCIII.

* Chamædry =
os.

Teucrium, siue, vt alijs placet, teucrium, herba est virgæ referens effigiem, * trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; vbertini pro-
uenit. Recens cum posca, aut arida feruesfactæ ius, potu lienem potenter absomit: lienosis cum aceto, et ficis illinitur: item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. Cap. XCIII.

* Plini.
colore:
quod &
ipsum
herbæ
pulchrè
cõgruit.

Chamædry Cræcus, alijs chamædrops, Latinis trissago dicitur. sunt qui eam teucrium appella-
uere, propter eam quam cum teucrio, seruat simili-
tudinem. Nascitur in petrosis & asperis frutex do-
drantalıs, folia habens exigua, amara, * effigie et
diuisura quercus flore paruo, penè purpureo. Carpi-
tur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu
tusibus, indurato lieni, vrinæ difficultati, incipien-
tibus hydropicis, auxiliatur: cit menses: partus ex-
trahit, lienem ex aceto pota consumit: aduersus ser-
pentiū venena ex vino, potu, illitq; efficacissima.
Trita digeritur in pastillos ad supradicta: purgat
vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem
oculorum discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. Cap. XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana
folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato,
efficacior tamen quàm satina habetur.

Vtraque ex vino contra animalium venena, præcipue marinorum opitulatur.

Lychnis. Cap. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur.

Lychnis sylvestris, omnia urbanæ similis. Bilē per aluum detrahit, semine duobus drachmis potio: ictis à scorpione subuenit. Aiant huius herbæ appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium. Cap. XCVII.

Lilia coronamentis se dedunt, Lyria à quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, nervos & priuatim uulue duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta, ambustis proficiunt: aceto condita, uulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inasata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulnam emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis præcisis, luxatisq; medetur: uitiliginēs, fursures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami solijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen pitum

S iij

DIOSCORIDIS

morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris se
 * πορφυ men & folia cum vino illinuntur. Tradunt & *
 πα, idest rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Paphy-
 purpu= lie, efficacissima vnguentis nascuntur.
 rea.

Ballote. Cap. XCVIII.

Vulgo Praestum **B** Alloteu, nomine alio nigrum marrubium vo-
 cant: caules edit quadrangulos, nigros, subhir-
 foetidū. sutos, complures ex vna radice. folijs maioribus
 quam marrubij, hispidis, cingentibus per interval-
 * στροπ= la caule, * subrotundis, graueolentibus, apiastro pro
 γυλο πι= ximis. vnde aliqui apiastrū eam vocauerunt: candi-
 πα, idest, di flores vniuersi uerticillato ambitu caule coronāt.
 rotundio Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex
 ribus. sale illitis: feruēti cinere flaccescūt folia, vt cōdylo
 Plinius mata reprimāt: purgāt et sordida vlcera cū melle.

nigriori Apiastrum. Cap. XCIX.

bus: **M** Elisophyllon siue melithæna, id est, a-
 quod piastrum, id sibi nomen vsurpauit, quo
 magis niam apes ipsa herba delectantur, cau-
 arri det. liculi et folia ballote, de qua paulo antè diximus,
 Melissa similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsu-
 officinis. ta spectarentur: citreum malum olent. Folia cum
 vino pota aut illita prosunt contra ictu phalangio-
 rum, scorpionumq; item aduersus canis morsum.
 Decocto eorundem gratia, foueri prodest: desessio-
 nibus fœminarum ad ciundos menses conuenit, den-
 tes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infundi-
 tur. Fungorum strangulationibus folia, addito ni-

tro, potu auxiliantur: torminibus & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Marrubium.

Cap. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, cādicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem æquat: subrotundū, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interuallis: flores verticillato ambitu, asperi. Nas citur propter ædificia, ruinas, & rudera.

Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. Mulieribus à partu non purgatis datur, vt menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpētibus demorsi sunt: vesicam renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia nomasq; sistūt, laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat: nari bus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys.

Cap. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris incundi, & complures virgas

ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur
in mōtibz et asperis. Vim habet excalfactoriā et
acrē foliorū decoctū potu pellit mēstrua et secūdas
Phyllitis. Cap. CII.

Phalangium. Cap. CIII.

* οἱ δὲ
καὶ ταύ-
την λεύ-
καναν ἡ-
γιαλοῦσι
ἐκ τῆς
ninus.
Græcus
παχυ',
id est,
crasso.

Trifolium. Cap. CIIII.

T Rifolium, Græci triphyllon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocant.
Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas
habens tenues, iunceaſ & nigras, unde ranculares

evascuntur appendicule, in quibus terna singulis
 germinationibus exeunt folia, loto arbori similia:
 ijs recenter enatis rutæ odor inest: ubi autem adole
 verunt, bitumen olent. Florem edit purpureum, see
 men quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera
 extremitate exertum, antennæ modo corniculum
 gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & fo
 lia in aqua pota pleuriticis, urinae difficultati, comi
 tialibus, & ijs qui aqua inter cutem principia sen
 tiunt, foeminis quoque vulvæ vitio opportunis, au
 xiliantur: menses ciunt: terna drachmæ è semine
 dari debent, è folijs verò quaterna. Contra serpen
 tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præ
 sidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis,
 foliorumq; decoctū fotu dolores eorum sinire, quos
 serpentes percusserint: qua autē aqua sanatus quis
 fuerit, si ea quispiam alius foveatur, qui vlcus ha
 buerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus.
 Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum
 vino potui dedere: et i quartanis, quaterna, ut q̄ fe
 briū circuitus discuteret. Radix antidotis iſeritur.

Polium.

Cap. CV.

DVo genera polij: montanum, cui teuthris
 nomen est. & cuius est vsus. Tenuis frutex
 est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capi
 tulo in cacumine quandam corymborum speciem
 præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili,
 graviter olente, non sine quadam suavitate. Altes

DIOSCORIDIS

rum fruticosius non vsque adeò valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto: Stomachum malè habet: caput doloribus afficit, aluum & menses ciet: substratum suffitum ue serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

A N N O T A T I O.

Scordii hoc loco depicti uberrimus ubique est prouentus, ut non iniuria eorum sit explosus error, qui allium sylvestre, aut obuiam quamcunque herbam allium subolentem, hoc esse opinabantur. Est autè præter id, Plinio libr. 25. cap. 6. authore, aliud quoddam genus latioribus foliis ac mentha stri effigie, cuius nuper in monte quodam ad Viennam ingens se copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quam foliorum cum mentha stro similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauimus.

Scordium. Cap. CVI.

Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs trissaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus: quadrangulis caulibus, subrubro flore. Herba vim excelsæ etoriam habet: urinam cit. Cocta recens aridaue cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, et urine

LIBER TERTIVS. 143

difficultatē, binis drachmis cum hydromelite: cras-
samen purulentum pectore expellit. Facit arida fa-
rina ad veterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nas-
sturtio, melle & resina misceatur in eclegmate: in-
flammata modicè præcordia, cerato excepta, re-
creat: cum aceto acri aut aqua podagris conuenien-
ter illinitur: menses imposita mouet: vulnera cōglu-
tinat. vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatri-
cem perducit. Sicca excrescentias in carne cohibet.
Succus ad eadē vitia bibitur. Inter prima efficax
Ponticum natione, Creticumq;.

Tusfilago. Cap. CVII.

Tusfilagini folia sunt maiuscula quàm hede- Vulgò
ra, sex aut septem à radice, subalbida à ter- vngula
ra, supernè virentia, in plures angulos excutia, cau- caballi =
lis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo vnà na.
cum caule confestim exuitur: inde nonnulli his va-
care existimauerunt. Radix tenuis est & superna
cua: nascitur in amoenis & riguis. Folia ex melle
trita igni sacro & omnibus inflammationibus illi-
tu medentur. Aridæ fumus per insundibulum hian-
ti ore raptus, hos sanat, qui sicca tussi atque ortho-
pncea infestantur: pectoris vomicas rum, it. Eum-
dem effectum præbet suffita radix. Decocta in hy-
dromelite, & pota emortuos partus eijcit.

Artemisia. Cap. CVIII.

Artemisia magna ex parte in maritimis nas-
citur, absynthij modo fruticosa, maioribus

DIOSCORIDIS

& pinguioribus folijs, ramisq; : huius quidem genera duo . Vnum latius habitiusq; , folijs virgisq; latioribus . Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore: hæc incun diorem quàm præcedens efflat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruefactæ conuenienter in muliebres deseseus adiunguntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; : item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos comminuant: remoratam vrinam cient. menses pellunt publi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadẽ que in sebio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia.

Cap. CIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs rute, circa imum caulẽ exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquã florem pariunt, odore vinoso, suauis: ra. lice tenui: sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys.

Cap. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem

odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnceas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium.

Cap. CXI.

Geraniō folijs anemones, diuisuris longioribus: Gradice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cū suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

Pes colubinus
vulgo.

Gnaphalium.

Cap. CXII.

Gnaphaliū folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

Typha.

Cap. CXIII.

Typha folium edit & cyperidi simile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominans. Huius herbæ flos suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

* Intelligere quæ lib. 1. cyperū vocant.

Circæa.

Cap. CXIIII.

Circæa, quam & dircæim aliqui vocant, folijs est hortensis solant, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine miliū, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrātali radice, tri-

DIOSCORIDIS

plici fermè aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento
perflatis. Radicis tuse pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vulnus expurgant. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mamas nutricum explet.

Oenanthe. Cap. CXV.

Videtur
nostra
Filipen-
dula. **O**enanthe folia habet pastinacæ: florem candi-
dum. caulem crassum, palmi altitudine: semē
triplicis. radicem magnam, in multa rotunda ca-
pitula extuberantem: nascitur in petris. Caulis eius
& folia, cum mulso vino pota secundas eijciunt.
Radix è vino, vrine stillicidio conuenit.

Conyza. Cap. CXVI.

Vulgo
pulica-
ria.

Conyzæ duo genera. quæ parua vocatur, odore
præstatiore est: maior vero frutice altior & fo-
lijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oleæ simi-
lia, hirsuta, pingua. In maiore caulis binii cubitorii
altitudine attollitur, in minore pedè æquat. Flos fra-
gilis, lutei coloris, subamarus, qui in pappi abit: ra-
dices supernacue. Suffitu substratuq; frutex totus
serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Fo-
lia cõuenienter illinuntur serpentii plagis, & tus-
berculis, ac vulneribus. Flores & folia cum vino
ad menses partusq; eijciendos bibuntur: item contra
vrine stillicidia, arquatum morbum, & tormina. co-
mitiales pota ex aceto adiunant. Decoctum in desessio-
nibus medetur. vulnè malis. Impositus succus abor-
tum

tum facit. Ex oleo efficaciter horroribus & oblini-
tur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & ter-
tium conyza genus, caule crassiore, ac molliore: fo-
lijs medijs inter maiorem ac minorem amplitudi-
nis, minimè autè pinguibus: multò gravioris hæc
est odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prone-
nit locis non riguis.

Hemerocalis, siue lilium sylvestre.

Cap. CXVII.

Hemerocallis folium & caulè habet lilij, por-
raceo colore: flores in caule per singulis exor-
tus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuisura, quo-
ties dehiscere cœperunt, colore perquã pallido: radix
magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum melle
& lana de pessa apposita, aquã educit & sangui-
nem. Folia trita mamarum inflammationes à par-
tu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
Radix et folia igni ambustis vtilissimè illinuntur.

A N N O T A T I O.

Leucoion, si nominis etymò spectes,
albam significat violam: solet tamen &
pro lutea, cœrulea ac purpurea vsurpari.
Nunc officinis Arabum ferè sequacibus,
Cheiri nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

Cap. CXVIII.

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus
differentia quedam: namq; aut cœrulei, aut

T

DIOSCORIDIS

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in defensionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum. Cap. CXIX.

Videtur
genus
Persica =
ria, non
macula-
tum.

Cratæogonum, siue, vt alijs placet, cratæonon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorū: semine milij: nascitur magna ex parte in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & vir modo consimili, totidē diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. Cap. CXX.

Phyllum, quod & eleephyllon vocatur, diuum generum est: quod autem thelygonum appellāt, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed magis herbaceo: caule tenui, breui radice exili: florem album profert: semen papaueris maiusculum: Sed arrhenogonum cetera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorenti

bus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculini sexus facere partus, ut thelygonon feminei proditur. Horum Crateus author est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxisse visum est.

Testiculus. Cap. CXXI.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, folijs circa imam caulis partem in terra stratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, leuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbis: ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem femina, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam vero, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nas citur in petresis & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea auctore vocatur, quoniam radix ad multa utilis sit. folijs est porri, latioribus oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putredinesq; , & oris vlcera caecothæ: aluum sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur.

Officinis falso satyriô, de quo seq. cap.

DIOSCORIDIS

Satyrium. Cap. CXXII.

Satyrium aliqui trifoliū vocant, quoniā tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florem lilij effigie, candidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam intus ut ouū, candidam, gustanti dulcem, et ori non ingrati: quā in vino nigro austero libere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dū cōcumbendi inces sit cupiditas, si quidem ea proniores ad venerē fieri affirmant. Est et alterum satyrium erythronium siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si omnino in anu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Horminum. Cap. CXXIII.

Vulgò
Gallitri-
cum.

Horminū herba est, solijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentie siliquis similes prodeunt, quæ ad radicē. spectant, in quibus diuersum semen recluditur: si quidem in syluestri rotūdum, fuscūq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argamas albuginesq; , & illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahunt acu

lei ex corpore. Idem effectus est illi & herbæ. Sylvestre magis viribus pollet: quare vnguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. Cap. CXXIIII.

HEdysaron, quod vnguētarij pelecium, id est securidacam vocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasitur in segetibus & hordeis.

Onolma. Cap. CXXV.

ONosma, * oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor digitorum, * ὀσμὰ δὲ
& vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine ὀσμὰ δὲ φλο
caule, sine semine, sine flore: radice nititur longa, te
nui, infirma, rubescens: gignitur in asperis. Folia δὲ ὄνον ἢ
in vino pota partus extrahunt. Pregnans, si eam καλῶς
supergradiatur, abortum facere dicitur.

Nymphæa. Cap. CXXVI.

Nymphæa nascitur in paludibus & stagna Nunc Ne
tibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoris nuphar.
bus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs de
mersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore
lilio simili, albo, & in medio crocos habente: cum
defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris ca
put extuberat: nigro semine, denso & lato, lenti

DIOSCORIDIS

gustus:caulis est levis,niger,minimè crassus, Aegyptæ fabæ cognatus: radix nigra,scabra, clauæ similis,quæ autumnò secatur. Sicca cum vino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur & lienem absomit.Radix stomachi ac vesicæ doloribus illinitur,vitiliginè ex aqua emendat:imposita cum pice, alopecys medetur. Eadem cōtra veneris in somnia bibitur:siquidem ea prorsus adimit,pota assidue aliquot diebus,genitaleq; infirmat.Idem semē potum efficit.Nymphææ nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide,in Anygro amne, & in Bœotiæ Aliarto. Est & altera nymphæa, cuius flos blephara dicitur,folijs antè dictæ,radice alba, scabra flore luteo,nitente, rosæ simili. Huius semen & radix, contra fœminarum profluvia efficacitè ex vino bibuntur.Nascitur in Thessalia,amne Penco.

Androsaces. Cap. CXXVII.

Androsaces herba est amara,tenuè spargēs iuncos,sine folijs,folliculos in capitulis habens,in quibus semen continetur:gignitur in Syriæ maritimis.Ea drachmis duabus in vino pota,copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herbæ decocto:podagris utilitèr illinitur.

Cetes Asplenum. Cap. CXXVIII.

Asplenum,aliqui scolopendrium vocant, alijs splenion,alijs hemionium, folijs est multis,

scolopendræ animalī similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxiq; siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semē habet: folia & filiculæ modo diuiduntur, subter flauescētia hirsutaq; supernè viridia. Vim hāc habēt folia in aceto feruesfacto, vt per dies quadraginta pota, lienem absumant: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese aut cū muli liene appensa. Tradunt noctu, silente lina, huius rei gratia effodiendam.

*Polipodum.

A N N O T A T I O.

Ruellio & Fuchsio lingua ceruina nūc appellata: quam alij minus rectè fortassis, Phyllitida suspicantur, de qua suprà Capite C II.

Hemionitis. Cap. CXXIX.

Hemionitis, quā aliqui splenion vocāt, folium emittit dracunculi, lunæ modo incuruū radicibus coheret multis, tenuibus: nunquā flores, neq; semen, neq; caulem gignit: in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pot. i lienem absumit.

Anthyllis. Cap. CXXX.

Anthyllis duplex est: quedam enim lentissimilla, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine. radice parua, tenui. Nascitur in alsis terris, & à sole illustratis, non in sulso gurg

T iiij

DIOSCORIDIS

* Chazstu. Altera est folijs ramulisq; * aiugæ similis, hir
mæpityi. sutioribus tamen, breuioribus, & asperioribus. flo
re purpureo, odoris admodum grauis: radice cicho
rii. Pota drachmis quatuor vrine difficultati, reni
busq; plurimum prodest. Tritæ, vulus pituitas
emolliunt, cum rosaceo, & lacte imposta, vulneri
bus medentur. Quæ autem aiugæ similitudinem re
fert, præter alia, pota cum aceto mulso comitiales
sanat.

Anthemis. Cap. CXXXI.

Officinis
camomil
la. Cuius
nominũ
varietas
ab inter
prete o
missa est

ANthemidis genera tria, tantum flore distan
tia. rami dodrantes, fruticosi, alis multis
concaui: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: rotun
dis capitulis: floribus in medie aureis, forinsecus or
biculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis,
magnitudine foliorum rute: nascitur in asperis, et
iuxta semitas: colligitur vere. Vim habent radices,
flores & herba excalfaciendi, extenuandi q; potu,
& in sessione, pellunt menstrua, partus, vrinam,
calculosq; aduersus inflationes, et ilei tormenta bi
buntur: bilem suffusam expurgat: iocinerum vitia
sanant: decocto earum vesicæ fõrentur. Ex omni
bus his generibus ad calculos efficacissima est,
quæ florem purpureũ habet, cuius amplitudo ma
iuscula est. hanc propriè heranthemon vocat. Ea,
cui leucanthemo nomẽ est, itẽ quæ chrysanthemõ
dicitur, vehementius vrinã ciunt. Aegylopijs illitæ
medentur: cõmãducate vlcera eruptiones in ore

sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, te-
runturq; in farinam, ab abigendos febrium circui-
tus. Flores & folia recodi debent, & priuatim tu-
sa, in pastillos digeri: radix quoque siccari, dumq;
ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo
floris aut radicis pars vna, modo contra floris par-
tes duæ & herbæ vna, permutatim duplicato pon-
dere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino
mulso, diluto.

Parthenium. Cap. CXXXII.

PArthenium aliqui amacron vocant, folijs est Vulgò
coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, matrica
intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Sicca ria.
tum, cum aceto mulso, aut sale potum, non secus
atq; epithymum, & bilem & pituitam detrahit:
suspensiosis prodest & melancholicis. Herba sine flo-
re à calculosis, & anhelatoribus magna vtilitate
bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia
vulvarum, & inflammationibus. Illinitur sacro
igni, & collectionibus, cum flore.

A N N O T A T I O.

Non sunt sequendi, qui Cotulam fœti-
dam vulgò dictam pro hoc obtrudunt.
Nam præter quàm quòd folia illius nullā
aut saltem parua cum fœniculo habeāt
similitudinem, flos eius non totus luteus
(quod in illo tamen requiritur) sed per
ambitum albus, ac intus tantum luteus

D I O S C O R I D I S

conspicitur. quod haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa verum esset Buphthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Buphthalmum. Cap. CXXXIII.

Buphthalmum (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollèsq; folia foeniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, vnde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores duritiàsq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. Cap. CXXXIIII.

Pæonia siue glycyfide, Græcis aliquibus penthoron dicitur: sunt qui ideos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia iuglandis habet. infemina verò, smyrnii more diuiduntur. Summo caule alas in siliquis emittit, veluti & græcas nuces: in quibus, quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris & tenuis & digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: foemina radicibus cæcis glandes circiter septem aut octo inherant, vt in

LIBER TERTIVS. 150

*hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nucis græcæ magnitudi-
ne pota: si ventris doloribus cum vino auxiliatur.
Valet cōtra regium morbum, & renum, ac vesicæ
dolores. Decocta in vino aluū sistit. Rubra grana
rubenteis menses sistunt, decē vel duodecim pota in
vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus
ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum exi-
mūt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus no-
cturnis vulvæ strāgulationibus et matricis dolori-
bus, quindecim numero pota, ī aqua mulsa, aut vi-
no. Nasceitur in altissimis montibus & præruptis.*

Lithospermum. Cap. CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomē accepit: Vulgò
milium
solis.
folijs est oleæ longioribus, & latoribus, mollio-
ribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis
rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, li-
gnosiss, in quorū cacumine bifidi exortus, cauliculo-
rū speciem exhibent: folijs longis, inter q̄ parvū se-
mē, rotundū, erui magnitudine, duritia lapidea. Na-
sceitur in asperis & editis locis. Vim hāc habet, ut
semine cū vino albo potō calculos frangat, pellatq̄;
vrinam.

Phalaris. Cap. XXXVI.

Phalaris cauliculos emittit xæ culmis simi-
les, à minutis ac nullius vsus radicibus, mul-
tos duum palmorum, geniculis cinctos, gracilio-
res tamen ac dulces: semen candidum, oblongum,

DIOSCORIDIS

mily magnitudine. Turbiditur, & in aqua aut vi-
no succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur.
Semen cochlearis mensura potum, ad eadem effi-
cax est.

Rubia. Cap. CXXXVII.

Hodie
 Rubia
 tinctorii
 * ἡ ἔξεν
 θόδανον.
 ἄνιοι δὲ
 τέυθριον
 καλῆσι.
 * ὡς ἐν
 λαβάνῃ
 τῆς καλι
 λάϊας.

Erythrodanum * radix rubra est, qua tinguntur lane. Vna sponte prouenit, altera seritur, & ut in Thebana Gallie, & Rauenna Italia: in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. Hanc non sine questu ferunt: nanque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & quadranguli, longi, aparina non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: folijs per interualla certa circum articulos, stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum ematur, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsas: item ischidiacis, & resolutis. Crassam copiosamque vrinam pellit: nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum que redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs vino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, securasque: Albæ vitiliginis, illita ex aceto medetur.

Lonchitis. Cap. CXXXVIII.

L Onchitis folia habet parri, latiora, rubentia, plurima, ad radicē circumfracta, veluti in ter

LIBER TERTIVS. 151

ram procumbētia, pauca in caule, in quo flores, cetero
galericuli, hiātibus comicis personis similes, nigri,
& è rictu albam exerētes velut linguam, quæ ad
labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum
lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum
arrogauit: radix dauci. Nascitur in sitientibus, &
asperis, Radix ex vino pota vrinam ciet. Altera est
lonchitis, quam aliqui asperam lonchitum dicant:
folia scolopendrii emittit, sed asperiora maioraq;
ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in mo-
dum prodest, in eisq; inflammationes excitari non
patitur. Pota ex aceto lienem absument.

Althæa. Cap. CXXXIX.

Althæa, quam alij ibiscum vocant, in sylue-
strum maluarum genere est, cui folia vt cy-
clamino, rotūda, lanugine canescunt: flore rosacco:
bicornitali caule: radice lenta, intus alba. * Althæa
appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluri-
bus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut
aqua mulsa, & per se cū imponitur tusa, effi-
cax est cōtra vulnera: item ad strumas, parotidas,
abscessus, mammarum inflammationes, fracta se-
dis, inflationes, neruorum rigores: si quidē discutit,
& excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit.
Cocta, vt dictū est, adiecto suillo adipe aut anseri-
no, terebinthinæ, vt malagmatis lentor fiat, fa-
cit ad vuluæ inflammationes, præclusionesq; in pes-
sis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: one

Vulgò
Bismal-
ua, &
Maluani-
scus.
* Ab αλ-
θαιω,
quod me-
deri si-
gnificat.

DIOSCORIDIS

ra vulvae, reliquisq; à partu extrahit. Decocta &
 succus ex vino potus, succurrit vrinae difficultati,
 calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadiz
 cis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum
 aceto decocta, colluto in le ore. Viride semen siccūq;
 tritum, vitiliginēs in sale & perunctas emendat:
 * eodem cum oleo & aceto peruncti, a venenatis nō
 858. feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sangui-
 nis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca autem
 decoctum hibitur, contra omnes vesparum, apum,
 similiūq; aculeatos ictus. Folia cum olei momen-
 to, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat
 aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea. Cap. CXL.

Herba **A**lcea sylvestrium malvarum generi assigna-
 tur: folia habet diuisa, verbenacae proxima.
 Simeo- caules treis aut quatuor, cortice cannabino vesti-
 nis mul- tes: florem rose, paruum: radices albas, latas, quin-
 80. que aut sex, cum plurimū cubitales: quae cum vino
 aut aqua potae, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis. Cap. CXLI.

Cannabis sativa planta magni in vita vsus
 ad robustissimos funes factitandos: folijs fra-
 * Fortè xini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semis
 eupato = ne rotundo, quod largiore cibo geniturā extinguit.
 rium mul Succus ex ea recente, conuenienter aurium dolori-
 gatum. bus instillatur. * Sylvestris cannabis virgas fert

althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cu-
biti altitudinem æquantes: folio sativæ, nigriore
& asperiore flore lychnidis, subrubro: semine &
radice althææ. Decocta radix, illitu inflamma-
tiones mulcet, tumores discutit, tofos articularum
dissipat. Huius cortex torquendis funibus accom-
modatus.

Anagyris.

Cap. CXLII.

ANagyris * frutex est arboris instar, perz * δὲ δ'
quàm gravis odore: folijs * agni, virz ἀνὰ θυγόν
gisq; flore brassicæ: semen in siliquis non δὲ δὲ ἀκο
breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori πον κα
facie, simile renibus, quod durescit vna maturescen λήσι.
te. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt. si * Viticis
partus hæreat & secundæ mensesq; morentur,
drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspi-
riosus datur, & contra capitis dolores in vino. Dif-
ficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu
statim auferantur. Radicis cortex concoquendis di-
scutiendisq; adhibetur. Semen commaducatum vo-
mitiones vehementer ciet.

Cepæa.

Cap. CXLIII.

CEpæa portulacæ similis est, sed nigriora habet
folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota,
vrine stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus, opi-
tulantur: maxime id præstat, si cum decocto radi-
cum asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, cor-
rudam vocant, bibatur.

DIOSCORIDIS

Alisma. Cap. CXLIII.

*Vulgò **A**lisma, * alij damasonion appellant: folia
 plātago ei plantaginis, nisi angustiora essent, * laci-
 aquati = niosa, conuexa q; in terram: caule simplici, tenui, cu-
 ca. bito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido,
 *Vox ex pallescente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri,
 Plin. ad- acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat
 lecta. tractus. Radix, si drachma vna aut altera biba-
 tur, his conuenit, qui leporem marinum deuorariūt,
 aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium haufe-
 runt: torminibus atque dysenteriae, per se, aut cum
 pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, et
 contra vitia vulue prodest. Herba sistit aluū, men-
 strua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, lōgiora paulò:
 caulem dodrantalem: florem puniceum: radi-
 cē parua: nascitur in vliginosis & incultis. Her-
 ba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat:
 cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, si-
 dores mouet.

Hypericum. Cap. CXLVI.

Nostra **H**ypericum alij androsæmon, alij corion, alij
 perfora- chamæpityn appellant, quoniam semen odo-
 a. re resinam imitatur, surculaceo frutice, dodranta-
 li, subrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus
 sanguineum succum remittit, qua ex causa andro-
 sæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in ro-
 tunulo

tundo oblōga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locis cultis & asperis. Urinam ciet, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quædraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. Cap. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti serè cruentantur, quæ de causa androsæmum vocauere. Vsus seminis ad ischiadicos, potum in hydromclitis sextario: nā biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Allinitur & ambustis efficaciter.

ANNOTATIO.

* Vinoso succo. } Marcellus sanguineo vertit, qui non vt Ruellius ὀνῶδν, sed potius ἔμπαρῶδν, vti capite de hyperico, legisse videtur: quæ fortè lectio magis genuina. Nam & Plinius, lib. 27. cap. 4. Androsæmi comam tritam sanguineo succo manare, tradidit.

Androsæmum. Cap. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt, quòd fruticet ramulis surculosis, ac tenui-

DIOSCORIDIS

bus: rubentibus virgis, & folijs rubeis, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita & vinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasq;: circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaveris nigri, insignis lineis. Huius comæ trita resinosum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, vulneribus sanguinem cohibet.

Coris.

Cap. CXLIX.

COris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit, & urinas: contra phalāgiorū morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quàm optime cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex quare pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys.

Cap. CL.

Vulgo
Iua ar-
thritica.

Aiuga herba in terra repens: & incurva similis: folijs semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos

LIBER TERTIVS. 154

* densis, odore pinus flore tenui, luteo, vel candido. * ὁ πρὸ
radice cichorij. Folia septem diebus in vino pota, re xptos,
gio morbo medentur: & quadraginta diebus ex idest sub
hydromelite, ischiadicos sanant: dantur peculiari curua.
ter vrine difficultatibus, iocineris, & renum via nuxa
tjjs: torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponti id est, fre
cam, perinde atque antidoto cōtra aconitum vtun quentiz
tur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum bus.
polenta iure decocti subacta: trita in farinam &
cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta
melle, cum aris squama & resina deijcit: apposita
ex melle, vuluæ vitia extrahit: mammarum duris
tias discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpūt,
cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ,
cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis,
prætenuibus, coma supradictæ: flore candido: semine
nigro: hæc etiam pinum redolet. Tertia mas no
minatur, paruula, folijs exilibus albis, pilosis: cau
le aspero, cādido: luteis flosculis, semine iuxta alas.
Resipit & hæc pinum. Hæc due vim superioris ob
tinent, sed non usque adeo efficacem.

TERTII LIBRI
FINIS.

V ḡ

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER IIII.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



TRIBVS antè libris, amantissime Aree, tradidimus odora-
menta, olea, arbores, vnguen-
ta, animalia, frumenta, olera,
radices, succos, herbas, semi-
naq;. In hoc autem quarto dis-
seremus de radicibus, & eis,
que restant, herbis.

Betonica.

Cap. I.

Cestron psychotropho vocitatur, quoniam fri-
gidis locis inueniatur. Latini betonicam appel-
lant. Herba est, caulem ferens tenuem, cubiti altitu-
dine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mol-
lia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem
maiora: in summis caulibus, semē veluti satureie
spicatum inest. Decerpta huius folia siccantur, pluri-
mos ad vsus. Radicibus nititur, vt veratri, tenui-
bus. Que ex hydromelae in potu, pituitosam vo-
mitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuul-

sis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxã dos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydro melite. tres in vini sextario drachmæ, contra serpẽtium morsus ebibũtur. Herba magna vtilitate illatis à serpente uulneribus illinitur: aduersus etiã uenena drachma ex uino pota cõuenit: præsumpta ea, si uenenum hauriatur, nihil nocebit: urinã ciet: aluum subducit: medetur comitialibus & insanis, pota ex aqua: & iocineris lienisq; uitij, drachmæ pondere in aceto mulso: concoctionem adiunat, si quis eam fabæ magnitudine secundum coenam cum melle cocto deuorarit: modo consimili acida ructantibus propinatur. Stomachicis eam manucare et succum deuorare proderit, si postea dilutum uinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis, cum diluti uini egelidi cyatho: ischiadicis, renum & uesticæ doloribus, ex aqua: aque inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio morbo laborãtes recreat, menses pellit, orachmæ pōdere cum uino pota: alium purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam excreationem. Folia sicca tritaq; fictili uase reconduntur.

Britanica. Cap. II.

Britanica aut uetonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem: caulem

DIOSCORIDIS

paruum emittit. Folij exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia.

Cap. CIII.

LYsimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altioresue, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectione supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pessa sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur: uulnere cruorem cohibet: acerrimum uisum suffusa reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

Cap. IIII.

Nunc Ceterum **P**olygonum mas ramos habet teneros & extinodia. les, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt: folia rutila, se. l. molliora longioraq;: semine sub omnibus folijs turgescente: unde marem appellari uolunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholera, alui fluxionibus, & urinae stillicidio: nam urinam aperte ciet. Cum

uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur, daturq; in febribus per horā ante significationes: fœminarum profluvia impositu sistit: idem succus purulentis auribus & instillatur. Facit eximie ad genitallū vlcera, cū vino, adiecto melle, decoctus. Sto- * καὶ πρὸς ὠτὸς τὰ λυγρὰ machi seruire, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria fœmina fruticat vno caule, arundini tenere simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes. Radicis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoque spissandi refrigerandiq; natura, ad eadem valens, sed inefficacior.

Polygonatum.

Cap. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore: folijs lauri, latioribus, & lenioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam adstrictione: flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem habet albam, mollem, longā, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantē: quæ vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiā maculas in facie delet. Est quā Vulgo sigillū Salomonis.

Clematis.

Cap. VI.

Latini

Clematis humi serpit: leto, pinguiq; solo pro- Vincam
uenit, viticulas spargens crassitudine iunci exi peruinca
guas: folio lauri figura & colore, multò minora. vocant.

DIOSCORIDIS

Ea cū caulibus in uino pota, alui profluvia & dysenterias sedant: subdita in pessa cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulue medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita serpentum morsibus, iuramentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex acetopotae opitulari. Gignitur in terrenis. Est et altera clematis, que uiticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, ut smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Flāmula
uulgò.

Polemonia.

Cap. VII.

* Poly-
goni.
* Stru-
thio.

Polemoniam alij philateriā, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, utrinque pinnatis: folijs paulo quam rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut * sanguinariæ proximis, quibus in summis uelut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicanee, * radiculæ simili: nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua aduersus urine difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: cumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

*Flores lutei. ¶ Ne moneare sicubi for-
tè, vt nos plerisque locis, cādidis floribus
conspexeris: solent enim pro loci varieta-
te in vna eadēque herba flores non ra-
rò cōmutari: id quod Dioscorides etiā in
Atractylide, ac multis alijs plantis fatetur.

Symphytum, siue alus. Cap. VIII.

Symphyton petreon, id est alus, nascitur in pe-
stris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus:
capitulis thymi: * surculosum totum, odoratū, * Ita Plī
gustū dulce, saluam ciens. longa radice, subruſa, nius Græ
digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa et cusculō
potum pulmonis vitia purgat: sanguinem reuēciens, id est
ribus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysente- ligno-
riam, rubrāq; fœminarum profluvia, in uino deco- sum.
Etum: ad conuulsa uerò & rupta, ex aceto mulso
bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat,
faucibus asperis subuenit, uulnera recentia ente-
rocelasq; conglutinat, & illitu cohibet. Carnes au-
tem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & al-
terum symphyton, quod aliqui pecton uocant: id Nūc Cō
caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassū, solida
leuem, angulosum, ut sonchi inanem, circa quē bre maior.
ni internacante spatia, folia exeunt angusta, bu-
glosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum
angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū
sinu prodeuntibus, in quibus & flores lutei, & circ

DIOSCORIDIS

ca caulem velut verbasci semina emicant. Tā cau-
lis, quā folia, aspera lanugine horrēt, tactuq; pri-
ritum concitant radices demittuntur: foris nigrae,
intus candidae, viscosae quarum est vsus. Tritae &
potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt, re-
centia vulnera illitae conglutinant: carnes quoque,
si concoquātur, cogūt additae: inflammationibus, prae-
sertim sedis, cū senecionis folijs vtiliter illinuntur.

Holostium.

Cap. IX.

HOlostium herba est pusilla, tribus qua-
tuorue digitis supereminens extra terrā,
folijs viticulisq; coronopo aut graminis
proximis, gustu adstringentibus: radice alba, prae-
tenui vsque in capillamenti speciem, longitudine
quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis.
Vsus eius ad rupta, in vino potae: nam & carnes co-
gnantur, decoctionibus addita.

Stœbe.

Cap. X.

Stœbe vulgaris est notitia: cuius semen &
folia stringunt: quapropter decoctum dysen-
tericis infunditur: auribus quoque purulen-
tis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis pro-
sunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum.

Cap. XI.

Clymenum caule fert fabae, quadratum: folia
plantaginis, folliculis supra caulem in sese
inflexis, ut in iride, & polyporum cirrhis. Proba-
tissimum est è montibus. E frutice toto cum ra-

LIBER QVARTVS. 158

dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: cœliacos, rubraq; fœminarum profluvia, refrigerando infrænat sanguinem naribus erumpentem suprimat. Trita folia, aut si liquæ recētibus uulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymentum. Cap. XII.

Periclymenon simplex fruticat, ex interuallis Vulgò parua folia habens, ipsum amplectentia, sub. Capriso audida, hederacea: inter folia surculi exeūt, in qui lium, & bus bacca, hederæ similes. flos fabæ, candidus, ali= Matricum quantum rotundis, & quasi in folium procubens: sylua. semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuolvens se adminiculis, propter asidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pōdere detur in uino, quadragenis diebus, lienem absomit, lassitudinē discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentā. Orthopnœæ, & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatē facere produntur: perūtilis ex oleo, febrium algores abigunt.

Tribulus. Cap. XIII.

Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus, uiticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris: iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum

DIOSCORIDIS

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum
comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pedi-
culo longo: caule parte summa, quam ima crassio-
ri. Adsunt ei & capillamenta quaedam spicacea:
semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; re-
frigerantis & inspissantis est naturæ: ideo inflam-
mationes omnes cataplasmate adiuvat. Ulcera in
ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasq;
persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum me-
dicinas; Semen dum recens bibitur, calculosis iuva-
mentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, il-
litæque, iectos à vipera recreat: contra venena cum
vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum
pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem
habitant, virenti tribulo equos sagināt, et è dulci
semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Limonium.

Cap. XIII.

Limonion, folia habet betæ, tenuiora et longio-
ra, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectū,
lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gu-
stata adstringunt. Semen tritum, & ex vino ace-
tabuli mēsurā potum, dysentericis celiacisq; pro-
dest: rubra fœminarum profluvia sistit. Nascitur
in pratis & palustribus.

Lagopus.

Cap. XV.

Lagopus herba sistit alium in vino pota: aut
in febris, ex aqua Eadem inguini alligatur, in
inflammatione. Nascitur in segetibus.

MEdion in saxis & opacis nascitur. folia habet * iridis: caulem tricubitalem, & in eo * Alij se florem gradem, purpureum, rotundū: semine cnici, ridis. minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

Epimedium.

Cap. XVII.

EPimedium, caulis est non magnus, hederae folijs, dens atq; duodenis, neq; florem, neq; fructū ferēs: radice tenui, nigra. graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increescere non sinunt. Radix conceptū adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes, quinq; diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Gladiolus

Cap. XVIII.

XYphion, alij phasganon, alij macharonion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo nucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorū bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, su

DIOSCORIDIS

perna vberior: nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeo è corpore extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. Menses imposita trahit. Superiore radice ex uino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta sterilefcere tradūt. Superiorem quoque utiliter infantium enterocelis, cū aqua potui dare p̄cipiunt.

Sparganium. Cap. XI X.

Sparganion, aliqui xiphidion uocāt: folia habet gladioli, sed arctiora, et in terrā magis procumbentia: in summo caule ueluti pilulae prominent, in quibus semē. Contra serpentis uenena, radix cū uino datur. Xyris. Cap. XX.

XYris, folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorum medio caulis erūpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquae triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis: simile fabis, rotundū, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Cōtra capitis uulnera, fracta q; efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radice centaurij ac mellis quinta: tumoribus & collectionibus illita cū aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absomit.

Anchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia habet lactucæ in acumē fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquouersum humi sparsa spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ estate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: leto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est igni sacro cum polenta medetur: lepris & uiriliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, uulue indita. Eius decoctum renum vitæ leni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt alium folia in vino pota. Radice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est et altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum uergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ menses sanguineum succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsque inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxiliatur, siue cibo, siue potu siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est et alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latas uentris tineas excutit.

DIOSCORIDIS

Lycopsis. Cap. XXII.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactuce, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recedentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore in ijs paruo purpurascēte: radice rubra, & adstringēte: nascitur in cāpestribus. Cū oleo radix illita, vulneribus medetur: et cū farina hordeacea, ignibus sacris. sudores perūcta mouet, adiecto oleo.

Echium. Cap. XXIII.

Vulgo
lingua
hircina.

Echion, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamē, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minuta q; utroq; latere folia, expansa, pinnata q; nigra, in summo caule breuiora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti uiperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat, in uino aut sobritione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum. Cap. XXIIII.

✕ Melan
thij.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut ✕ gūh, nigro pregnantēs. Vinū habet semen in uino potum, quæ uiperarum caterarūque serpentium moribus

fibris medeatur. Datur ischia dicis cum melle, vino,
myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & su-
peruacua.

Erinus.

Cap. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, fo-
lijs ocymi, sed minoribus, parte superna di-
uisis, dodrantalibus surculis quinis senisue,
flore candido: semine nigro, paruo & acerbo: folia
& caules lacteo succo turgent. Semen drachmis
duabus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculo-
rum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & ni-
tro instillatus, aurium dolores sedat.

* Sic
Plin. In
Græco
simplici-
ter, Suc-
co.

Gramen.

Cap. XXVI.

Gramen geniculatis serpit ramulis, à quibus
radices spargit dulces, articulis præcinctas:
folia acuminata, dura, et, vt arundinis parua, lata,
in exilitatem fastigiantur, eaq; iumenta et boves
pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat.
Decoctum eius in potu, torminibus medetur, &
vrinae difficultatibus. calculosa etiã vesicæ excre-
menta cominuit. Est & arundinaceum gramen,
priore multo maius, quod iumenta necare traditur
præsertim in Babylone, id, quod iuxta vias nasci-
tur. Quod in Parnaso mote gignitur, densius frutis-
cat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine
paruo, non inuti: radicibus quinis aut senis, digita-
li cr. bitudine, calidis, mollibus, robustis, ac dulci-
bus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhe di-

X

D I O S C O R I D I S

midio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris
 tertiae portionis, probatissimum erit oculorum me-
 dicamentum: id in aërea pyxide reconditur. Deco-
 etum radice idem, quod herba, praestat. Semen ve-
 hementius urinam impellit, aluum vomitionesq;
 sistit. Natū in Cilicia gramē, quod incolae cinnā ap-
 pellant, boues inflāmat, si eo virēti saepe pascatur.

Sideritis. Cap. XXVII.

Nūc herba **S**ideritim aliqui heracleam vocant. folia habet
 ba Iudai marrubij, sed longiora, satis ad frondem quere-
 ta, et Te cus aut saluie accedentia, minora tamen, & aspe-
 trahil. ra: caules edit quadratos, dodrantē altos, ac quan-
 doq; etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquan-
 tumq; substringentis: in quibus per interstitia or-
 biculatae vertebrae, vt in marrubio, spectantur, &
 semen in eis nigrum: nascitur in petrosis. Illita fo-
 lia, suapte vi, vulnera sine inflammationis pericu-
 lo iungūt. Altera sideritis binum cubitorum, rami-
 lis exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinq; per oras
 diuiso: pediculo longo, prodeuntibus ē summo alae-
 rum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in ca-
 cumine orbiculato, aspero, in quo semē continetur,
 quā betae rotundius aliquantū, ac durius. Huius
 vis, foliorumq; ad vulnera, praecipua est. Sideritim
 aliam esse tradunt, quam Crataeas heracleam vo-
 cat, in macerijs, & vineis nascentē, folijs ab vna
 ra lice multis, coriandro similibus, circa cauliculos
 dodrantales, teneros, laues, subcādidos atq; subrubi

cundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lēto. Huius ea vis est, vt quauis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. Cap. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sidentis, dodrā tales aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, minutulis folijs circundatos, ex obliquo crebras habentibus incisuras, sectionibus coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, non insuauis, verum medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis & purpureis & aurum emulantibus: prouenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuerit: erumpentem sanguinē inhibet, et cruenta vuluæ profluvia, i' vellere. Decocto quoq; insidet scemine fluxioe vuluæ laborātes. Ad dysenteria bibitur.

Rubus. Cap. XXIX

Rubus, notitiæ vulgaris. Viri habet siccatidi, & adstringendi: capillum tangit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & sceminarum profluvia, præsteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmant, & oris vitijs folia commanducata medentur, cohibentq; illita, vlcera que serpunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt, & condylomatosis et hæmorrhoidibus folia illinantur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tumbuntur, exprimiturque

DIOSCORIDIS

succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascētis, quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in vino polo.

Rubus idæus. Cap. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. Cap. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunq; contigerit adminiculum. Nasctur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorū succus potu deijcit aluum.

Elatine. Cap. XXXII.

Elatine folia habet helxine, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis senisue, à radice foliosis, gustu adstringētibus. Nasctur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta soritionis usu dysenteriam sistit.

Eupatorium. Cap. XXXIII. EST OFFI

Eupatorium, fruticosa herba est, vnicum effe- cinarum
rens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, Agrimo-
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio-
rem: folijs per intervalla quinqufolij, aut canna- autẽ Eu-
bis potius similibus, quinq; partito aut amplius di-
uisis, nigricantibus, & ipsis per ambitũ serratis. se-
mẽ medio caule erũpit, pilosum, deorsum spectans, nabis syl-
quod siccatum vestibus inhaeret. Contrita huius fo-
lia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus, quæ æ-
gre cicatricem trahunt, medentur. Herba & semẽ præcedẽ
in uino potum, dysenteria, iocineris uitijs, & serpẽ-
tium ictibus, liberat. Nec desunt qui aberrantes * * Græ-
argemonem hanc appellarint, cũ tamen longẽ cus Arte
alia sit, uti exposuimus.

Quinquefolium. Cap. XXXIIII. hẽt: sed

Quinquefolium ramulos fert festucarum simi esse, vt
litudine, tenues, dodr. itales, in quibus semẽ. nunc vi-
folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, des, argẽ
in ambitu serrata: florem ex cãdido pallescentẽ, au-
monẽ le-
ri æmulũ. Nasctur in riguis, et aquarijs ductibus. gẽdũ, ex
Subrubram habet radicẽ, oblongam, ueratro nigro anemõe
crassiorẽ. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis deco- (de qua
etã ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolo-
li. ij.) nõ
res sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arte-
obscurẽ
ria scabritias, gargarizatu leuigat: contra alui cognõ
profluvia, & dysenterias auxiliatur: item articu-
scas.
lorum coxendicumq; cruciatibus pota. Cocta in

X ij

DIOSCORIDIS

aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, reduvias, condylomata, psorasq; sanat. Teneræ radicis succus, contra iocineris, pulmonumq; uitia prodest: item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto uino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana uero, ternum. in quotidiana, unius. Ea quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum melle et sale, tam uulneribus quam fistulis remedio sunt. enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

A N N O T A T I O .

*Spicam lolio similem } Non obscure hinc elicitur Lolium spica esse insignitum. ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam uulgò cognominatam, cuius in segetibus ubique tam uber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidē nō spicam, sed purpureum florem emittit.

Phœnix. Cap. XXXV.

Phœnix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, * spicam lolio similem: calamos digitorum seuum, radici aduolutos: septenas octos.

nasce spicas. In arvis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum virium compos, ut in uino austero posita, alui profluvium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infrenet. Sunt qui adaligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

Idæa radix. Cap. XXXVII.

IDæa radici folia sunt ea, quæ rusco: circum ea ueluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rodia radix. Cap. XXXVIII.

Ignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, leuior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Utilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momēto imponatur.

Equisetum. Cap. XXXIX.

Equisetum in rignis & scrobibus nascitur: cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se parcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herbe spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipsa sistit: prodest dysentericis in uino potus: urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tri-

Vulgò
Cauda
equina.

DIOSCORIDIS

ti folijs, & illitis. Radix cum sua herba tussim;
orthopnoeam, ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua po-
tis, dissectiones vesicae & intestini, enterocelaq;
in vnum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equi-
setum caulis est rectus, equalis, cubito maior, inas-
nus: comis per intervalla brevioribus, candidioribus,
& mollioribus. Ad cum aceto tritum vulneribus re-
medio est, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectorium. Cap. XXXIX.

Coccum, quo infectores vtuntur, frutex est sur-
culosus, parvus, cui grana ceu lentes adheret,
que electa congeruntur. Optimum gignitur in Ga-
latia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia: ultimum
ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulne-
ribus, nervusq; praecisis, convenienter ex aceto tritum
illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus;
cochlearum exilium similitudine, quod illius regio-
nis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium. Cap. XL.

Tragium nascitur in Creta tantum insula,
lentiseo semine, folio, & ramis simile, singu-
lis tamen minoribus, & succus ei lacteus, gummi
non dissimilis. Semen, folia, lacrymaq; illius spic-
cula è corpore eijciunt: omnia quoque corpori ime-
pacta, euocant: pota stranguriae medentur, calculus
vesicae frangunt, menses trahunt. Modus in sum-
ptione est, drachma vna. Fama est, sylvestres ca-
pras sagittis confossas, eius herbae pabulo spicula.

* Ita
Pli. Gra
cus co-
dex si m
pliciter,
succus.

excitare. Est & alterum tragium, quod tragoceros aliqui vocant, folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam: quâ crudam vel coctam esse dysentericus prodest. Folia Nominis autumno, hirci virus olent: exinde sibi tragij nomē causa, adoptauit. Prouenit in montibus, & precipitijs.

Tragum.

Cap. XLI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut traganon vocant: maximè in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, coeliacis, & seminis fluxione vulue laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à p'risque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus vtuntur cum opus est.

Iuncus.

Cap. XLII.

Iunci duo genera: vnum leuis nominati, altiorum acuti, qui in mucronem fastigiat. Cuius etiam duo assignantur genera: vnum sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iuncus, qui vocatur oloschænos, prioribus carnosior, asperi r'q; is similem supra dicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diuto vino potum, sistit aluum, & rubra seminarum profluvia: urinam cit, capitisque dolores facit.

DIOSCORIDIS

Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus illicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

Cap. XLIII.

Offici-
nis He-
patica.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adhæret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Lutat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & linguae defluxiones inhibet.

Paronychia. Cap. XLIIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplisimilis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome. Cap. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat. coma specie corymborum, hyssopo simili: radice hirsuta, ueratri nigri modo, tenuis, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosis opacisq; nascitur. Radix excalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammato male habet: contra purgationes uulue, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrylogonum. Cap. XLVI.

Chrylogonum dense fruticat, quernis folijs: flore coronarij uerbasci: radix ut rapum exuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ tri-

ta cū aceto, atque imposita, muris aranei morsibus auxiliatur.

Elichrysum. Cap. XLVII. Alij He-

ELichryson quidam chrysanthemon, nonnulli liochry-
 & id amaranton uocant, quo deorum simula- son. Offi-
 cra coronant: ramulum habet candidum, virentē, cinis
 rectū, firmū: folia intercedentibus spatijs angusta, Stæchas
 abrotono similia: comam aurea licis in orbem, um- citrina.
 bella rotunda ueluti siccis corymbis dependentibus,
 radice tenui: nascitur in asperis, & torrentium al-
 ueis. Contra serpentium iētus, coxendicum dolores,
 urinae stillicidia, ruptaq; coma ē uino pota opitu-
 latur: ciet menses. Sanguinem concretum uentris
 ac uesicæ absument, pota cum mulso. ieiunis, trium
 obolorum pondere, sistit destillationes, data in ui-
 no albo diluto: uestibus inseritur, ut eas ab eroden-
 tium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum. Cap. XLVIII.

CHrysanthemō aut caltha, nonnullis buphtal-
 mos: herba est tenera, fruticosa, laues proferēs
 caules, et multifida folia: flores supra modū splēde-
 tes, luteos, orbē oculi imitātes, unde buphtalmi no-
 mē traxit: propter oppida nascitur. Cuius caules o-
 leris uice mādūtur. Flores cū cerato triti, steatoma-
 ta discutere prodūtur: regio morbo correptis, colorē
 breni reddūt, si sequēte lōgo balnei usu, post exitū
 ebibātur. Ageratū. Cap. XLIX.

ACeraton fruticosa herba est, palmam longi-

DIOSCORIDIS

tudine aſurgens, ſimplex, humilis, origano maxi-
mè ſimilis: umbellā gerit, in qua flos bullis aureis
emicat, elichryſo minor. Nomen ei inditum eſt, quo-
niā diutiſſimè flos in ſua coloris ſpecie cōſeruetur.
Viſ decocti feruens: huius uſtæ nidor urinam cit, et
vulue duritias emollit.

Verbenaca.

Cap. L.

Periſterion, ſiue verbenaca naſcitur in aquoſis.
Nomen ex eo duxiſſe videtur, quòd columba
circa hanc perquā libenter verſari ſoleant. Do-
drantis altitudine, & inter dum amplius adoleſcit:
folia è caule prodeunt incifa, & ſubalbida: ea ſin-
gulari ramo, radiceq; ſola, conſtare ſepius inueni-
tur. Folia cum ſuillo adipe recenti, aut roſaceo impo-
ſita, vuluarum dolores finire putantur, ignem ſa-
crum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohi-
bent, vulneca glutinant: veteraq; ex melle, ad cicat-
ricem perducunt.

Sacra herba.

Cap. LI.

Sacra herba, quæ & periſtereō nominatur, rac-
mulos emittit cubitales, aut maiuſculos, angulo-
ſos, in quibus ex interuallis folia quercus, ſed mino-
ra anguſtioraq; eiſdem diuiſuris in ambitu, colore
aliquatenus caſſio: radix lōga, tenuis: flores purpu-
rei, graciles. Folia cū radice in vino pota, illitæ, ad-
uerſus ſerpēte: pollent: eadē drachmæ pondere cum
thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadra-
genis diebus, ieiuno ore, contra regiū morbū bibun-

LIBER QVARTVS. 167

tur: veteres tumores & inflamationes mitigant: sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tōssillarum crustas abrumpit: oris nomas gargariza tu colibet. Aiunt, si aqua spargatur tricliniū, quāmaduerit, latiores conuicius fieri. Datur potandū in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum solijs circundantibus, quartanis, quartum. Sacram vocant herbam, quoniā multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

Astragalus.

Cap. LII.

Astragalus, paruus à terra frutex, solijs & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringētes nascitur in vêtosis, opacis, et in nivalibus. eo Mēphis Arcadiæ scatet. Aluū sistit radix in vino pota: vrinā mouet: vetustis vlceribus, sicca efficaciter ispargitur: sanguinem suppressit: ægre propter duritiam tunditur.

Hyacinthus.

Cap. LIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: dodrācalē canlē, leuē, minimo digito tenuiorē, herbacei coloris: comā procūbentē, florum purpureorū plenā, incuruā: radicē quoq; bulbaceā. Quæ, ut creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatē coerces, et nō patitur erūpere: sistit aluum pota, et vrinā ipellit, phalangiorūq; morsibus auxiliatur. Semē adstrin-

DIO SCORIDIS

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat cum vino potum.

*Locu

Papauer erraticum. Cap. LIIII.

deprava
tum esse
manifeste
apparet.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in arvis cum hordeo nascitur flore protinus deciduo, unde et nomē apud Græcos accepit. * Folia erucæ, aut origano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur: sed longiora, diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum albus: oblongum caput, sed quā anemones minus: semen rufum. radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huic capita quinq; aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabali mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præstādum mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem sotu & persusione, somnus allicitur.

Sunt enim
herbæ
quas hic
cōmemo
rat Dio-
scorides,
diuersa
planē fa-
cie, vt uni
eīdēq; re-
ctē cōpa-
rari ne-
quaquā
possint:

Papauer satium. Cap. LV.

quo autē
instaurā-
tus, peris-
sioribus
cogitādū
relinqui-
mus.

E Satii papaueris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in usu sit: eo etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylacitum vocant. Capitulum habet longum, & semen can- didum. Sylvestre vero, caput insidens demissumq; & nigrum semen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius

LIBER QVARTVS. 168

scapulae eius succus emanat. Tertium magis syl-
uestre, & ad medicinas volentius, multò his lon-
gius, productior e capitulo. Omnium in commune
natura refrigeratrix: quare si capita ipsa & folia
decoquantur in aqua, seminum soti conciliabunt.
Bibitur deccelum contra vigilias. Calyces cum po-
lenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sac-
cris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur
quoq; virides, & digeruntur in pastillos, qui sicca-
ti ad vsum reconduntur. Capita quoq; per se in
aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto mel-
le, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Ad me-
dicamentum in tussi, arterie fluxionibus, & cœ-
liacorum affectis, doloris leuamentum præbet. Effic-
acius tamen redditur, addito hypocistidis succo et
acacia. Papaueris nigri semen tritum cum vino bi-
bitur, contra citam aluum, & scemmarum proflu-
uia: in pernigilijs fronti temporibusq; illinitur, ex
aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, sic-
catq;: sumptum erui magnitudine, dolorem finit,
concoquit, & somnum allicit: tussi, atq; cœliacori
valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauria-
tur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad
dolores capitis cum rosaceo persusum efficax est:
aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco
instillatur: inflammationibus oculorum cum torre-
facto oui luteo proficit: igni sacro & vulncribus,
cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

DIOSCORIDIS

Opium co: somnum accersit, subditū sedi pro balano. Opti-
 quod op= mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 timum. odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, le-
 ue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod
 inter colandum non vt cera coeat, et in sole diffun-
 datur: dein admotum lucernis, non atra luceat flā-
 ma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opio
 glaucio, gummi, aut sylvestris lactuce succo, adul-
 Eius a= terant. Verūm glaucio fucatum, in dilutione croci
 altera= colorem reddit: lactucaceo succo fictū, oxiliter spi-
 tio. rat, & asperis spectatur: gummi vitiatum, sple-
 nescit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò demen-
 tie deuenierint, vt adipem ei admiscerent. Fictili
 nouo torretur ad oculorum medicamēta, dum mol-
 lius, atq; rufius appareat. Diagoras, vt Erasistra-
 tus auctor est, vsum eius damnauit, oculorum lip-
 pitudinibus & aurium vitijs infundi vetās, quo-
 niam visus aciem hebetaret, & soporem gigne-
 ret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excecari, si
 non adulteraretur. Mnesidemus vsum duntaxat
 olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum
 somnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdi-
 cit. Quæ commentitia esse, experimento deprehen-
 duntur: siquidem effectus, viriū huiusce medica-
 menti, fidem faciunt, quare non alienum fuerit
 scriptis mandare, quoniam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, et præ-
 lo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt

LIBER QVARTVS. 169

in pastillos: id meconium vocatur, multū opio igna-
uius. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum ros in Opij col-
eo exaruerit, ciliro decussatim in stellas, ne penitus ligendi
adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem in ratio-
cidere oportet, lacrymam excurrentem, digito in con-
cham abstergere. nec multo post redire, vt cōcreta
inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam
offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos
cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne
vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer.

Cap. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatim, fo-
lia habet candida, hirsuta. verbasco simi- Vulgò
lia, in ambitu syluestris papaueris more papauer
serrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo cornutū.
sænigræci, in corniculorū modū inflexo, vnde nomē
mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq;: radice
per summa cespitum nigra, crassa: nascitur in ma-
ritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua
decocta ad diurias, coxendicum & iocineris asse-
ctus, potu sanet: prodest his, qui crassa quedā, aspe-
ra, aut araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter
purgat semen, acetabulo in aqua mulsā poto. Crus-
tas emarginat, illita ex oleo folia floresq;: & ar-
gema ac nubeculas iumentorum perunctas, abster-
gunt. Sunt qui glauciū, hoc papaueris genere facti
tari existimarūt, falsi quadā soliorū cognitione.

Y

DIOSCORIDIS

Spumeum papauer. Cap. LVIII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali: folijs admodum parvis, & radicle similibus: fructis inter ea candido. *Struthio.* Nam herbula alba est, & spumea tota: & radice & sic ex in summo cespite. Legitur estate semen, cum inter Theophrasto. gre adoleuit, deceditq; exiccatum. Datum ac etabli mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat pri Videtur uatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest. eni locus

Hypecoum. Cap. LVIII.

i Greco **H**ypecoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur in segetibus aruisq;, folijs rutæ, exilibus radicibus. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus. Cap. LIX.

Nunc ius **H**yoscyamus, frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores e latere caulis, ordine prodeunt, tanquam puni-*corum* cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaueris. Tres eius differentie: Vna semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini præduris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut irionis, flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores. Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in communi vsu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq;, in maritimis ruderibusq; nascens. Cuius occasio si non adsit, rufum vsurpari oportet: niger, ut deterimus, im-

LIBER QVARTVS. 170

probat. Recēti semine, caulibus folijsq; tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum usque prorogatur. nam facile corruptio- nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine sepa- ratim in aqua calida tuso, & expresso. Liquamen- tum autem succo lacteo prestantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trime- stri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum aufe- runt, commodissimè inseri solent: contra acutas ca- lidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vulvæ ma- la, prosunt: cum farina autem aut polenta, oculo- rum, pedum, cæterarumq; partium inflammatio- nes placant. Semen eadem præbet: tussi, distillatio- nibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax: contra mensium abundantiam, & rumpentem ali- unde sanguinem, oboli pendere cum papaveris semi- ne, & aqua mulsa, bibitur: podagris subuenit: te- stibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tri- tum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissimè imponuntur: re- centia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinun- tur: cum vino terna, quaternæve pota, sanant al- gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mes-

DIOSCORIDIS

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt,
si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in ace-
to decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium.

Cap. LX.

Psyllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsu-
tis, longioribus: sarmentosa sceni modo, in totū
herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule
exoritur, duobus tribusue convolutis in cacumine
capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili:
unde & nomen. in arvis & incultis nascitur. Vis
ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum
conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuber-
culis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponi-
tur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto:
enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illi-
tum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura,
& in aque sextario madefactum, ubi concreuit
aqua, illinitur: si quidem vehementer refrigerat, &
in feruentem aquam deiectum calorem reprimat.
Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virēs
domum importetur, non sinere in ea pulices gigni.
Cum adipe tusum, sordida ulcera, & que cacoe-
the vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auris
bus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

Cap. LXI.

Hortense solanum, frutex cibus idoneus, pusil-
latus, multis concavis alis: folio nigro, maiore
corrupte quam ocymi, & iatiore: fructu rotundo, viridi, qu

post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba in-
 nocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare fo-
 lia vlceribus que serpunt, & ignibus sacris, conue-
 nienter cum polline polente illinuntur: agylopiā, ca-
 pitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: &=
 stōanti stōmācho auxiliantur: parotidas, cum sale
 detrita, illitu discutunt. Valet succus eius aduersus
 ignem sacrum, atque vlcera, que serpunt, cum ce-
 russa, rosaceo & argenti spuma: ad agylopias cum
 pane. infantium adustioni, quam syriasin vocant,
 cum rosaceo persusus proficit: in collyrijs, aquæ vel
 oui vicem exhibet contra acutas fluxiones illitus:
 aurium dolori instillatus prodest. Mensium abun-
 dātiā sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gal-
 linarum curtalium fimo subactus, & linteo appo-
 situs, agylopijs præsenteo est remedio. Est & a-
 liud solanum, quod peculiari nomine halicacabon
 aut physalida, id est vesicariam vocant, solijs an-
 tediecto similibus, verum latioribus: cuius caules,
 posteaquam adoluerunt, prona terram spectant:
 folliculis orbiculatis vesiculis similibus: semine in-
 tus fulue, rotundo, leui, acinorum vix effigie: quo
 coronarij utuntur, corollis intorquentes. Vim usum-
 que hortensis solani habet: verum cibus nequa-
 quam expetitur. Regium morbum purgat, semine
 poto, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus
 extrahitur, qui siccatu in vmbra, reconditur, ad
 eadem valens.

Offici-
 nis Al-
 kekengi
 Arabū
 exēplo.

DIOSCORIDIS
Solanum somniferum. Cap. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicacabon appellunt, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæq; mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropticis dantur: si quid numero adiiciatur, alienatione mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicum solanum. Cap. LXIII.

Solanum manicum, aliqui persion, alij thryon appellant. Huic folium erucæ simile, maius aliquantò, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adulescentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed ut platani pilulæ hirsutius, verum maius, latiusq;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hedere corymbis, ut vine mollibus: radice firmatur candi-

LIBER QVARTVS. 172

didā, crassa, caua, cubitali: gignitur in montibus, vëto perflatus, et platanetis. Radix drachmæ vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres usque dies mentis alienationem asfert. quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsā copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium Cap. LXIIII.

Dorycniō Gratenas halicacabon, aut caleam vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modū scabris: flore candido: siliis quis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, lauibus, firmis, versicoloribus: radix ad digitum crassitudine et cubiti longitudinē adolescit. Ad somniferū esse cōstat. Copiosius haustū mortē adfert, Nec desuere, qui dicerent, semē in amatoria expeti.

Mandragoras. Cap. LXV.

Mandragoram, aliqui antimalum, alij circæam vocant. quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ foemina existimatur, thridacis appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactuæ, virosos ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inheret bene ma-

DIOSCORIDIS

gnis, binis, ternisue, inter se cōuolutis, nigris foris,
intus albis, crasso cortice vestitis, caule viduus est.

* Alij Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis & norion
morion. vocitatus: huius folia magna, alba, leta, leuia vt
betæ: mala quàm alterius duplo maiora, colore in
crocum inclinante, incūde cum grauitate quadam
olentia: quorum pomorum cibo, aliquantum opilio
nes soporantur. radix, alterius similis, maior &
candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è corti-
ce recentis radicis tuso, & prælis subiecto: qui in-
solatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis
quoq; succus depromitur, sed aliquantò ignauior.
Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad
vsum suspēditur. Aliqui radices in vino ad tertias
coquunt, & defecatum ius seruant: cyathosq; vno
vtuntur, in peruiligijs, & doloribus, et ante sectio-
nes vsteonesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis
ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilē
atram pituitamq; extrahit: verum potu largiore,
vita adimitur. medicamentis ocularibus, & his,
quæ dolores finiunt, pessis quoq; emollientibus, ad-
miscetur: semioboli pondere inditus, per se menses
& partus expellit: subditus sedi pro balano, som-
nificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis
horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quā
effingere optaueris, formā, ipsum facile præstat.
Folia recentia: conuenienter oculorum inflāmatio-
nibus, et collectionibus, quas vlcera citarunt, cum

LIBER QVARTVS. 173

polenta illinuntur. duritias omnes, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delēt, si quinis senisue diebus, sensim perfricentur. Folia servantur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpētium ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat. articulorū cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum ē cortice radice, ad hunc modum: Ternæ mizæ in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi ijs, qui secari aut amburi debēt, vt antē dictum est: si quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterno quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimia tamen odore percussi, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra scæminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamētum autem succo lacteo præstantius est: sed non ubiq; vt experientia docet, radices lacteum succū delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, ossa, obsoniões,

DIOSCORIDIS

drachmæ pondere deuorata, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternisue, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum. Cap. LXVI.

Aconitum aliqui pardalianches, alij camorõ, alij thelyphonon, alij myoctonon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caulis palmato altum: radix scorpij caudam emulans, & alabastrum modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones admoti radice, stupentq;: qui rursum hellebori contactu excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur. Enecat subaspe pantheras, sues, lupos & feras omnes in carnibus. utra obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cyantem le noctonon, alij lycoctonon appellant. Huius generis sunt tria. vnu, quo utuntur uenatores: alia duo interior, her usum suum uertere medici, è quibus tertium, quod bæ, si Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iuquado se stinis exilit: à priore distans, quonia folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo lerit a nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cui spectus bitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis ilicabit. oblongis recondit: radices in modum squille maris cirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem lura

LIBER QVARTVS. 174

porum utuntur: insertæ siquidem crudis carnibus,
& deuoratae, lupos enecant.

Cicuta.

Cap. LXVII.

Cicuta caulem edit geniculatum, ut fœni-
culi, grādē & folia ferule, angustiora, * Pli. li.
grau odoratu: rami, mox umbellæ i sum 25. c. 13
mo prodeunt: flores quoque albicantes: & semen Corian-
aniso candidius: radice non alta, concava. Cicuta le dro asie
thale uenenum inest, suaq; ui refrigeratoria necat. milauit,
Remedio est uini miraculi potus. Succus exprimitur cui pre-
tur contusis cacuminibus, triusquam semina & pius sa-
come siccescant: qui sole densatur in pastillos. ne, quā
Multus ad medendi rationem usus est aridi, commo ferule,
dē miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia quæ fœ-
temperantur: ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, niculi cō
illitu restinguunt. Herba cum coma trita, & testis stat fo-
bus circumlita, libidinum imaginationes in somno, lūs, Ci-
compefcit: sed genitale resoluit. lac puerperarum cuta om-
mammis apposita extinguit: in uirginitate mam- nibus ho-
mas coercet, & increfcere non patitur: pueris præ die com-
stat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, inta- perta, ui
bescant. Efficacissima uis Creticæ, Megarēsi, mox detur ac
Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti. cedere.

Taxum.

Cap. LXVIII.

SMilax à Grecis, taxus à Latinis appellatur,
arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-
dem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispa-
niæ contermina nascens. Anicula quæ Italicæ ta-

D I O S C O R I D I S

æi baccas denorât, denigrâtur: et qui ederint easdē
hoīes, alui proflumio corripit̃tur. Narbōe tā præsē
tis est. venēi, vt si qui dormiāt sub e.i, aut eius vm
bra su' sīdeāt, ledātur, et sēpenumero moriātur:
quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. Cap. LXIX.

Apocynum, siue cynocrambe, brassica canina,
frutex est longis viticulis constans, malē
olentibus, lentis, vitiliumq; modo obsequiosis, fra
ctu sere inuictis: folio hedere, molliore tamen, &
per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo
succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari spe
cie, diu igi longitudine protenduntur: semine intus
albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta,
canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo
data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

Cap. LXX.

Nerion aliqui rhododaphnen, alij rhododen
dron vocant. frutex est vulgaris notitiæ, lon
gioribus quā amygdala folijs, crassioribusq; flo
re in rosam conformato: fructu & nuci græcæ simi
li, corniculato, qui patefactus quandam lanosam
naturam ostendit, spinarum pappos representan
tem, radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa:
nas citur in amœnis, maritimis, & secus amnes.
Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadru
pedum plurimis venena sunt: hominibus verò cō

si Amygdale.

tra serpētium morsus praesidia, è vino pota: eo magis ruta addita: imbecillae etiam animantes, vt pecus & caprae, si aquam bibant, in qua folia ea maderint, moriuntur.

Fungi.

Cap. LXXI.

Fungorum differentias duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arborisue, quae priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent quidam tales sunt, nescio quod strigmentum concretamque pituitam, terraque eruti, quam celerrime computrescunt, atque marcore vitiuntur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & acrius concocti. Strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida muria, aut feruesfacta satireia, aut origani iusculum: debellantur etiam gallinacei fimi potus ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed aegre dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

Colchicum.

Cap. LXXII.

Cēsetur

Colchico, aliqui ephemerō, sunt qui agrestem Hermobulbū vocant, aut tūni exitu florem edit croci, dactylus candicans, ab eo tempore, folia bulbi, sed pinguiora: lilius ossifragulae palmi altum, ferentē rursus semen: radicē, cinarā.

DIOSCORIDIS

foris è nigra rufescentem, quæ deliberata, candida
& mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gu-
statu dulcis inuenitur: bulbus eius mediam habet
rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in
Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungo-
rum more, strangulando enecat. Hanc autem de-
pinximus, ne à quoquã imprudenter pro bulbo de-
uoretur: mirum enim in modum saporis volupta-
te imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quæ fun-
gis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaque
cum adsuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. Cap. LXXIII.

Fortè no- **E**phemerum, aliqui syluestrem irin appellant. fo-
stru Li- lia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: flo-
liu con- rem candidum, amarum. semen molle radicem vnã,
nalliu. digitali crassitudine, longam, adstringentem, odo-
ratam: nascitur in syluis & opacis. Huius radice
dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in
vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ
nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est muralis herba. Ca. LXXIII.

Offici- **H**elxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis
nis Paz & segetibus: folia ei mercurialis insunt, hir-
ietaria suta: cauliculi subrubentes; & circa eos veluti se-
mina aspera, adherentia vestibus. Folia refrigerã
di spissandi; naturam habet, quæ ex causa sanãt
illic sacros ignes, adusta, condylomata, panos in-
cipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius

LIBER QVARTVS. 176

cum cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ ser-
punt, commodè illinitur, imponiturq; podagris cum
hircino adipe aut cerato cyprino: veterem tussim
emēdat instar cyathi haustus: tōsillis inflāmatio-
nem sentientibus vtiliter & gargarizatur, et obli-
nitur: aurium dolorē cum rosaceo instillatus leuat.

Alfine.

Cap. LXXV.

Alsinen, aliqui anthyllion, nonnulli myosota Vulgò
vocant, quoniam masculorum aures folia morsus
imitantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alsine dicta galline.
est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humilior es-
set, & folijs minoribus, & nec hirsuta. cum teri- *Fx Pli
tur odorem cucumis reddit. Vini refrigerandi ad nio adie
stringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus Et a.
cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus in-
funditur: quin & emendat omnia quæ helxine, id
est, muralis herba.

Lens palustris.

Cap. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluente, Offici-
muscus lenticule similis, refrigeratorie natu- nis lenti
re. Propter quod conuenienter collectionibus, igni cula aq.
sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta:
glutinat & procidentia puerorum interanea.

Semperuium, seu sedum.

Cap. LXXVII.

Semperuium magnum idèò nominatur, quo-
niam perpetuò folia vireant: cuius caules cu-
biti altitudinem implent, interdum excedunt, fin-

DIOSCORIDIS

gues, crassitudine pollicari, virentes, characia titthy
 * Vox mali modo infecti folia pingua, & carnosae, & ma
 addita gnitudine pollicari, in cacumine linguae similia, alia
 ex Plinio in terram convexa, alia in capite stantia invicem,
 ita ut ambitu effigiem imitentur oculi: nascitur in
 montibus, & testaceis: supra domicilia etiam serit
 tur. Eius vis refrigerare, & adstringere: medentur
 igni sacro, nomis, ulceribus quae serpunt, oculorum
 inflammationibus, ambustis igni, podagris per se,
 & cum polenta illita folia. Succus capiti, in dolori
 bus, cum polenta aut rosaceo perfunditur: datur in
 potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, alui
 que profluvia: teretes lineas potus in vino excutit:
 subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit:
 succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio co
 ceptis, inungitur. Sempernium parvum in petris,
 Vulgo parictinis, & maceris, necnon scrobibus opacis na
 vermicu scitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, cre
 laris. bro foliatis. exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mu
 cronatis: caule a medio emicante, palmum alto: um
 bellam herbidosq; flores, & tenues gerente. Folia
 eisdem cum priore viribus praedita sunt. Tertium
 videtur sempernii genus, quam aliqui andrachne
 agriam, aut telephion vocauerunt, Romani illece
 bram, pusillis, crassioribusq; folijs, hirsutis, por
 tulacae proximus: nascitur in saxis. Vis ei excalsa
 ctoria, acris, exulcerans: illita cum axungia stru
 mas discutit.

Vmbilicus

LIBER QVARTVS. 177
Vmbilicus Veneris. Cap. LXXVIII.

COtyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formã tornato, ineuidenter cōcauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotūda. Succus cum vino circulitus, instillatū sue, contacta genitalia nudat: inflāmationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frāgunt, vrinam cient, hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Est & alterū genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis circa radicē, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadē, quæ semperuiuum.

Vrtica.

Cap. LXXIX.

DVo vrticæ genera: syluestris, asperio, latioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquē aspera, minuto semine. Folia vtriusq; illita, canis morsibus, addito sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cū cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita: precipiendū.

Z.

DIOSCORIDIS

tes vulvas, recentia contactu resilire cogunt. Semē
potum ex passo, venerem stimulat, vulvæ ora pate
facit: cum melle delinctum, orthopnoeæ, lateris &
pulmonum inflammationibus prodest: thoracem
expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur.
Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, vrinas
mouent, inflationes discutunt: decocta cum ptisaz
na, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euo
cant, cum myrrha modico pota. Inflammationem
turgentem vnam gargarizatus succus reprimit.

Galiopsis. Cap. LXXX.

Galiopsis frutex in totum caulem, & folia ha
bet vrticæ, leuiores, & quæ grauem odorem
trita reddant: flore purpurascete, tenui: nascitur
circa sepes, edificiorum areas, ac semitas ubique.
Folia, caules, semen, succusq; duritias, & carcino
mata dissipant: strumas, panos, & parotidas dis
cutiunt. Oportet bis die epidum ex aceto cataplas
ma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescētia,
gāgrenas, & nomas, cū sale efficaciter illinuntur.

Galion. Cap. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in contrahen
do lacte, coaguli vicem impleat: ramulum fo
liumq; habet aparinae simillimum, rectum: florent
in cacumine luteum, tenuem, de sum, copiosum, odo
raturum. Flos igni ambustus illinitur, sanguinis pro
fluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, in
solatum vsquedum albescat. lassitudines reficit. Ra

LIBER QVARTVS. 178
dix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

Senecio. Cap. LXXXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, folijs
continuis, eruce modo per extremitates diui
sis. sed minoribus multo: luteis floribus, qui
celeriter dissecti vaneſcunt in pappos. Nomen verò
sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu, ve
re canescant. radice superuacua: nascitur maximè
in macerijs, & circum oppida. Folia cum floribus
refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per se
se, testium & sedis inflammationes sanant: quin
& ex manna thuris medentur, cum reliquis vulne
ribus, tum ijs quæ nerui acceperunt. Illiti per se cū
aceto pappi idem munus præstant: verum recentes
epoli, strangulant. Totus caulis, si coctus in passo
potui detur, stomachi dolores à bili contractos, per
fanat.

Thalictrum Cap. LXXXIII.

Thalictum folia coriandri habet, pinguiora
paulo: cauliculum rutæ crassitudine, in quo fo
lia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem
perducunt. Nascitur maximè in campeſtribus.

Marinus muscus. Cap. LXXXIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, te
stacesq; haud procul à mari, gracilis,
capillaceis, caulis expers. Præcipua ei
spissandi vis, & collectiones cohibendi, & poda
gras, quas refrigerare opus sit.

Z ij

D I O S C O R I D I S

Phycus marinus. Cap. LXXXV.

Phyci marini generibus, quoddā latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terrā, floridū valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratoriā, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem verū ijs vti humidis conuenit, priusquā exarescant. Nicāder, puniceum aduersus serpētes dedit. Hoc fuco quidā putāt mulieres suū calorem mētiri, cū tamē sit radícula eiusdē noīs, qua sese fucant.

Potamogeton. Cap. LXXXVI.

Potamogeton, folium betæ simile, hirsutū paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra veterum vlcera nomas. Nomen ex eo inditū est, quod palustribus, et aquosis enascatur.

Stratiotes. Cap. LXXXVII.

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomen traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere nō sinunt. ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Vulgatū Stratiotes millesolium. Cap. LXXXVIII.

millefo = **S**tratiotes millesolium exiguus frutex, palmilium. Saltitudine, aut amplius assurgit: folijs auicu-

larum pennas imitantibus, breui admodum disse-
ctoq; foliorum exortu. Folia syluestre cuminum si-
mulant, præsertim breuitate atq; scabritia, bre-
uiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surcu-
los in cacumine gerit, exiguos, & capitula inter-
dum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in
asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus
ad vlcera vetera, recentiaq; , profluentem sangui-
nem, & fistulas.

Verbascum. Cap. LXXXIX.

Verbascum differentias summas habet duas Tapsus
hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœ barba=
mina intelligitur. Fœmine igitur folia sunt brase tus vul=
sice, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis go.
albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores al-
bi, aut subpallidi: semen nigrum: radix longa, gu-
stu acerbæ, crassitudine digiti: nascitur in campe-
stribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, * Sic
albis folijs, et angustioribus, tenuiori caule. Sed ni Plin. qui
grum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latio- Zulo des
re; constaret folio. Syluestre folia fert saluæ, al- videtur
tas virgas, & * lignosas, & circa eas ramulos, legisse.
quales marrubiū: flores luteos, auri æmulo. Sūt et Grecus
phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. codex
Tertia lychmitis appellatur: ab alijs aut thryallis δρυδαι =
folijs ternis, aut quaternis, vel paulò pluribus, hir δαι, id ē,
sutis, crassis, pinguibusq; apta ad lucernarū lumi- arbores
na. Radix priorū duarum adstringit: quare quod scentes.

Z iij

DIOSCORIDIS

magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiq; tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum, cui flos autem, capillos tingit, et quocunq; abijciatur, blatas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur: cū aceto quoq; vulneribus medentur: contra scorpionū ictus, sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam feminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

Aetiopis.

Cap.

X C.

A Ethiopis folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaq; in orbem circa radicē imā redacta: caulem quadrangulum, crassum ac scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concavum alis: semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem caespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicce nigrescunt duranturq;, vt cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Troadis, et in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischia dicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix, et pota: quin et cū melle, eclegmatis vicem præbet.

Arction.

Cap.

X C I.

A Rction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco folijs, nisi quæd hirsutiora,

LIBER QVARTVS. 180

& rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cu-
mini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Decocta
cum semine radix in vino, dentium dolorem mul-
cet, si contineatur ore decoctum: ambusta pernio-
nesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendici
dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. Cap. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora &
hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem al-
bicantem, quanquam & interdum vidua caule
reperiatur: radice grandi, intus candida, foris ni-
gra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pineis
nucibus, purulenta & cruenta extusisientibus au-
xiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum
contractos, illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlce-
ribus illinuntur.

Vulgò
lappa
maior, ei
bardana

Petalites. Cap. XCIII.

Petalites pediculus cubito maior, crassitudine
pollicis, à quo prægræde solum, galeri modo
amplū, ceu fungus depēdet. Contra phagedenas,
et vlcera, quæ cacoethe vocāt, efficaciter illinitur.

Epipactis. Cap. XCIIII.

Epipactis ab alijs belleborine, parua herba,
exiguīs folijs. locineris vitijs utilis, & contra
venena pota.

Capnos, seu fumaria. Cap. XCV. Officinis

Fumaria fruticosa herbula est, pratenera, co-
riandri similis: folijs candidioribus, vniuersique terræ.

Z ij

DIOSCORIDIS

numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemq; unde nomē traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam urinam trahit.

Lotus urbana. Cap. XCVI.

Lotū urbanam alij trifolium vocāt: nascitur i hortis. Extractus succus, addito melle, oculorū argema, nubeculas, cæterasq; caligines discutit.

Sylvestris lotus. Cap. XCVII.

Sylvestris lotus, quā trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis. semine fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter alstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cū mallue semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus. Cap. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargēs cubitales, sæpe maiores in quibus folia fœnigræci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita crucā olent, gustataq; cicer recens sapiūt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cū pane trita illinantur. Decoctū potus urinā ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope alvearia serūt.

LIBER QVARTVS. 181
Lotus Aegyptia. Cap. XCIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flumini-
ne inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo,
candido, * lilio simili, quem tradunt occidente sole * ^{ἁπλῶς} ^{ἁπλῶς},
comprimi occludiq; ad ortum autem aperiri: ad ^{ἁπλῶς} ^{ἁπλῶς} nō ^{ἁπλῶς} ^{ἁπλῶς}
duntq; caput ipsum vespere aquis cōdi, et ad exor-
tum Solis emergere. Caput quale papaueris, maxi-
mum: & intus grana cen milij, quæ Aegyptij exic-
cant, & in panes cogūt. Radicem lotos hæc habet,
mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; man-
ditur: decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.

ANNOTATIO.

Aliud est à nostro Millefolio, quod pau-
lò ante stratiotem millefoliū esse monui-
mus.

Millefolium. Cap. C.

MYriophyllum, siue millefoliū, caulis est tener,
singularis, vnica nixus radice: plurimis fo-
lijs, leuibus, foeniculo similibus: unde nomen acce-
pit. Caulis flauescit, varius, ac veluti ex industria
delimatus: nascitur in palustribus. Vulnere recen-
tia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel
siccum ex aceto oblinatur: præcipitatis in potu cū
aqua & sale datur.

Myrrhis. Cap. CI.

MYrrhis, simillima est cicute, caule folijsq; ra-
dix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, ci-
bo non insuavis. Quæ pota in vino, phalangiorum

DIOSCORIDIS

moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundus purgatque; à puerperio feminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis tertie die potam ex vino in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Myagrum.

Cap. CII.

MYagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea, folijs rubiae, pallidis, tripedanea: semen oleosum, & scenogreco simile. Quod coctusum igni torrent, perunctisque virgis ad lucernarum lumina vtuntur: hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

Onagra.

Cap. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, praegrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maderit, in potu data feras mitigat, et cicures facit: illitu quoque tetra ulcera mulcer.

Cirsium.

Cap. CIIII.

CIRSium, caulis est tener, duorum cubitorum, Buglossa triangulo similis. ab imo foliola, rosae specie officinae referentia, anguli spinosi, per intervalla molles: for-
rum. lia buglossa similia, & maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen
nora. caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in summo pubescentia, quae solvuntur in lanugines. Radicem

LIBER QVARTVS. 182
huius loco laboranti ad alligatam, dolores varie
cum sedare Andreas scripsit.

After Atticus, seu inguinalis.

Cap. CV.

Aster Atticus caudiculus lignosus, florem in
cacumine habens purpureum, luteumue, per
ambitum, anthemidis capituli modo diuisum, fo-
liolis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem cir-
cundant folia, oblōga sunt ac hirsuta. Feruenti sto-
macho, oculorum inflammationibus, procidua se-
di, ac inguinibus illitū auxiliatur. Tradunt purpu-
reum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pue-
ris comitiale malum sentientibus, epitulari. Angui-
num inflammationi recentem illinire conuenit. Si
aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, &
inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum.

Cap. CVI.

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinem vo-
cant, quoniam folium, quod est aniso simile, in
pampinos torquetur: capitula sunt in summo cau-
le tenuia, plena seminis, melanthii gustum imitan-
tis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia, semē
ex aqua malsa bibitur: hepaticis, & sanguinem
excreantibus vtile.

Viola purpurea.

Cap. CVII.

Viola purpurea folium habet hedera minus,
tenuis ac nigrius, nec multò dissimile: cauli-
culus à radice medius prodit, in quo flosculus,

DIOSCORIDIS

suauissimè olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sedi; proscidenti.

Cacalia. Cap. CVIII.

Cacalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, reatus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut māducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cera to illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium. Cap. CIX.

Bunion caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatēt: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus, Vri nam ciet, excalfacit, secundas euocat: licni, vesicæ, renibus utile. Tam humidi quā sicci, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; , vsus inualuit: ex aqua mulsa. Pseudobunion palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acri gustus. Tormina, atq; stranguriā, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua illiti quoq; cum sale & uino, tepentes, strumas discutiunt.

Chamæcissus. Cap. CX.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longior
 re, ramulis à radice quinis senisue, dodrantali Non est,
 bus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac te quavis
 nuore, gustu supra modum amaro: radice tenui, cædi id sonet
 da, inutili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimi Græciani
 mē ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tri ca dictio
 bus, tricenis quadragenisue diebus: eodē pota mor- hederæ
 do, senis aut septenis diebus, regiū morbum purgāt. terrestres

Chamæleuce. Cap. CXI. vulgò no

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est, minata:
 herba virens, incuruis folijs, surculisq;: flos quod eā
 re rosaceo. paulo

Buglossum, seu lingua bubula. studio eCap. CXII. sius cum

Buglossum nascitur in campestribus, & sabu- descri-
 losis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ ptione cō
 treis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, ferens, li
 potamiq;: contra tertianos horrores prodesse: quæ quidō co
 quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur, her- gnosces.
 bam abscessibus vtilem esse volunt. Verbasco simi Vulgaris
 le est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, Borago.
 bubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectū,
 animi voluptates auget.

ANNOTATIO.

Nostrum Cynoglossum caulem & pur-
 pureos flosculos edens, non esse verū ac
 legitimū, historia eius apertissimè indicat.

DIOSCORIDIS
Cynoglossum. Cap. CXIII.

Cynoglosson folia latifoliae plantaginis habet,
arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, et
humis sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cum suile
lo adipe veteri, medentur morsibus canum, alopecu-
rij, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herba
ex vino potum.

Phyteuma. Cap. CXIIII.

* Stru-
thy. **P**hyteuma folia habet * radicle, minora: co-
piofum semen, perforatum, radicem parua,
tenuem, per summa terre nitentem: quam ad ama-
torum conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium. Cap. CXV.

Leontopodium duum digitorum herbula est,
folia ferens angusta, longitudine ternum. qua-
ternumque digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem la-
miflore flocco canescunt: capitula in summo caute
quasi perforata: flores nigri semen usque ideo spif-
sa lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: ra-lice par-
ua cohaeret: quam tradunt appensam ad amato-
ria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. Cap. CXVI.

Hippoglosson, frutex est folia habens ru-
ticinis figura, & spinosam comam, &
in summo ceterum linguas ex folijs exeuntes.
Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit.
Malagmatis radix succus admiscetur.

LIBER QVARTVS. 184
Antirrhinum. Cap. CXVII.

ANtirrhinum, alij anarrhinon vocant, herbã
caule & folijs anagallidi similẽ: flore albæ
violæ purpureo, minore tamẽ, ideoq; syluestris lych-
nis nominata est: semine vituli narium simili. Tra-
dunt perunctos ea, cũ oleo lilino, venustiores fieri:
nec vlllo medicamento ledi posse, si quis appensum
gestet. Catanance. Cap. CXVIII.

EX eo genere vna, folia coronopi habet, lon-
ga, radicẽ iunci modo prætenuem: capitula
fena, septenãue, in quibus erui semen inest.
Arescens in terrã flectitur, & se contrahit ad spe-
ciem vnguium milui exanimati. Altera mali parui
magnitudinẽ explet, radice exigue oliuæ magnitu-
dine: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus,
diuisis, humi inclinatis. semen, vt cicer, minutum,
in virgulis dependet, puniceï coloris, multis forami-
nibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria
expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

Tripolion. Cap. CXIX.

TRipolion i marinis nascitur locis, q̃ allidit vi-
da, recedẽs q̃ dimittit, neq; in mari, neq; in sic-
co: folio glasti crassiore palmeo caule, in mucrone
diuiso. Eius, vt tradũt, flores colorã ter die mutãt,
mane cãdidi, meridie purpurei, sero puniceï cõspiciũ-
tur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drach-
mis duabus in vino pota, aquã, vrinamq; per aliuẽ
extrahit. In medicamẽta digeritur, q̃ venena arcet

DIOSCORIDIS
ANNOTATIO.

Officinarū Capillus Veneris . Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxi. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscus obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiantum, cōparatum, album potius, quàm nigrum, appareat.

Adiantum. Cap. CXX.

A Dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriantur, nigro colore nitent, præternes, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neq; fructū, neq; florem profert. Decoctū herbe potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrine difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet, et menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit, furfures, et manātia capitis vlcera, ex lixiuio emēdat: defluentes capillos continet, cū ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vineq;. Decoctum eius cū lixiuio & vino infusum, idem præstat. coturnices, & gallinacos pugnaciores facit, in cibos eorum additū. Seritur gratia vtilitatis pecorū circa ouilia. Vmbrosus,

LIBER QVARTVS. 185

brofis, & palustribus, circa parietum aspergines,
& frontium specus enascitur.

Trihemanes. Cap. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus
Adianton filici simile, sed exilius: folijs lenti- Offici-
culæ, tenuibus, in ordinem vtrique digestis, aduer- nis poly-
sis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore trichon
splendentibus. Eadem quæ & Adianton præstare quod idē
posse constat. tamē cū

Xanthium, siue Lappa. Cap. CXXII. Adianto

Xanthium nascitur læto & pingui solo, &
lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, Vulgò
pingui, proleuntibus ex eo crebris alis: folia atripli lappa mi-
cis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: frii nor.
Etū grandis oliuæ modo, rotundum, & vt platani
pilula, spinosum, qui cōtactu uestibus adherescit.
Is antè collectus quā perfectè siccescat, tūditur,
& fictili vase recōditur. Flauos aut facit capillos,
si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox ca-
put, nitro antè perfriktum, illinatur. Alij in vino
tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumo-
ribus imponitur.

Aegilops, siue festuca. Cap. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed mol-
liora, in summo capite semina bina ternæue,
rubra, quibus ariste quasi capillaceæ exeunt. Illita Marcel-
cū farina herba ægylōpis medetur, duritias discus- lo suppo-
tit. Succus farine admistus, siccatur, & eorundē sitilia.

DIOSCORIDIS

gratia reponitur. Bromus herba agilopi similis, exiccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Interea eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Alii qui tritam aloen addunt, et eo modo utuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, graue oris halitum emendat.

Glaux. Cap. CXXIII.

Glaux cytiso aut lenticulae folijs similis, quae superne virent, auersaque candidiora spectantur: ramuli a terra exiliunt quini seniae, tenues ab radice, dodrantem alti: flores violae albae, purpurei exeunt, minores tamen nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

Polygala. Cap. CXXV.

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulae, gaulthi adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. Cap. CXXVI.

Osyris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuque contumaces: & in his folia, quaternaria, quina, senaria, seu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Cessetur
Linaria
nigra ap-
pellata.

Aspera similax. Cap. CXXVII.

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmen

ta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata: arbores scanlit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordet. Nasceitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia et acini, & ante & post epoti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritū propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiā ad alexi pharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcētur.

Læuis smilax. Cap. CXXVIII.

Læuis smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora huius sarmenta nullis horrent spinis: conuoluitur aboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circumquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam factitantur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis observari traduntur.

Rulcus. Cap. CXXIX.

Sylvestris myrtus, aliquibus oxymyrsine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: so= Officium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronis Brunatum: bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ scus. de, à medio folio dependentes: osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo

A a ij

DIOSCORIDIS

lenti, fractu cōtumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia et bacca in vino pota vrinā cient, mēses pellunt, vesicæ calculus frāgunt, stillicidio vrinae medentur, dolores capitis sanāt, & regiū morbū. In asperis et præcipitibus locis enascitur. Decoctū radicis in vino potū, eosdem præbet effectus. Cauliculi recētes, asparagorū vice, in cibo sumūtur. Amari aut sunt, sed vrinā mouēt.

Laurus Alexandrina. Cap. CXXX.

Laurus Alexādrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodrātales, interdum longiores: radice * sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio vrinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. Cap. CXXXI.

Vulgo
I. aureo = **D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modū viscosus ramos vestit: folia lauri graciliora, et molliora, fractu cōtumacia, quorū gustatu os & fauces incendūtur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitus extrahit folium recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus. caput inanit commanducatū, sternut amēta mouet. Bacca quindecim pota aluum resoluunt.

Chamædaphne. Cap. CXXXII.

Chamædaphne virgas emittit cubitales, singu-
lari ramulo constantes, rectas, tenues, læues fo-
lia lauri similitudine, leuiora multò, ac viridiora :
semen rotundum, rubens, annexum folijs. Allinūtur
capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores
mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur.
Potus cum vino succus, menses & vrinam ciet: idē
facit pesso appositus.

Veratrum album. Cap. CXXXIII.

Helleborum album, Latini veratrum albū vo-
cant, fert folia plantaginis aut betæ sylue-
stris similia, sed breuiora, & nigriora, * rubescen * Plin.
tia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolu canaliū
tum, quas abdicat cū arescere incipit: radicibus ni dorso ru
titur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capi- bescētia.
te ceparū modo exeuntibus: nascitur in montibus
& asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum
habetur candidū, friabile, carnosum, modicè exten-
tum, nec tamen iunci modo mucronatū, quod fran-
genlo puluerē emittit, & tenuem habet medullā,
gustu non admodū feruens, neq; saliuam subinde
ciens, (huiuscemodi aut strangulat.) Primatū Cy-
renaicum tenet. Galaticum aut & Cappadociū,
candidiora, et puluere quodam obsita, celerius strā-
gulatus mouēt. Vomitione aut varios extrahit hu-
mores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculo-
rum discutunt. Partus impositum necat, menses

DIOSCORIDIS

pellit, sternutamenta excitat, mures interficit cum melle & polenta subactum, absumit carnes si coquatur vna. Datur per se ieiunus, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cū aqua mulsa, aut pulte, aut quavis alia sorbitio ne. Cogitur cū pane, & ita inassatur. Preparatio corporū, ac victus ratio, diligēter tradita est, cum ab his qui de medica eius porione scriptitarūt, tum maximè à Philonide Siculo Errensi, cui nunc assētimur, quippe longū nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curādi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitio ne, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strāgulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestivè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones cōcitant subdita ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. Cap. CXXXIIII.

Helleborum nigrū, appellatur melampodion, quoniā caprarum pastor, nomine Melāpus, furētes in se. Prætidus, primus purgasse, & sanasse, fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen cnici, quod

in Anticyra sesamoides vocant: quo deiectiones mo-
liuntur: radicibus cohaeret nigris, tenuibus, à capi-
tulo cepæ simili confibratis. quarū est vsus: in colli-
bus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū
est, quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticy-
ra. Nigrū inibi probatissimū gignitur. Eligi debet
corpulentum et plenum, in quo tenuis sit medulla,
acre gustu, feruēs q̄: cuiusmodi est in Helicone, Par-
naso, & Aetolia natū: attamen Heliconium prae-
cellit. Veratrū nigrum purgat vētrem, detrahit bi-
lem pituitas q̄: datum per se, aut cum scammonia,
et tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel
cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sum-
ptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholi-
cis, insipientibus, articularijs doloribus, & resolu-
tis. Menses inditum trahit, partus necat, purgat si-
stulas impositum, & tertia die detractum. Itē con-
tra gravitatem auditus in aurem demittitur, ibiq̄
in alterum aut esiam tertium diem esse finitur.
Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pi-
ce, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetigini-
bus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione
mitigat erodentibus medicamentis cōmiscetur: hy-
dropicorum vētri vtilissimè imponitur factum ex
eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: consi-
tum proximè radices vitium, vinum purgandi fa-
cultate donat. Huius resparsu domos expiari arbi-
trantur: quare inter fodiendū stantes, Apollinem,

DIOSCORIDIS

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquile volatus: aduolare enim non sine periculo tradunt: namq; si avis effosionem helleborei conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitus caput aggrauat: quapropter, ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. Cap. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquibolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum acumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, solum, amarum. radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq;, semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Vulgò Sylvestris cucumer. Cap. XXXVI.
Cucu = Cucumis sylvestris fructu solo distat à satino
mer asi = Cucumere, quem longè minorem parit, oblongus
ninus. glandibus non dissimilem: folia atq; sarmenta

satiui refert: radice candida, magna: nascitur in sa-
 buletis, & ruderibus frutice in totum amaro. In-
 stillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit.
 Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem
 discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercu-
 la rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discus-
 tit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes
 in dolore colluuntur. Arida farinae impetiginem, le-
 pras & vitilignes absterget: nigris cicatricibus
 colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Ra-
 dicis succus sequioboli pondere, & item cortex, ace-
 tabuli quarta parte, bilem pituitamque deiciunt, pre-
 sertim in hydropicis: (deiectiones autem citra stomas-
 chi iniuriam mouet) radice selibra, in vini pre-
 sertim Libyci hemina conteritur, danturque ex eo ter-
 ni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cer-
 natur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamen-
 tum, quod elaterium vocatur, ad hunc modum: De-
 cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem
 rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim
 supino cultro, sursum versus aciem habente, findun-
 tur, atque per cribrum humor in subiectum vas ex-
 primitur: simulque carnosum quod haesit cribro, quod
 facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, resi-
 dere sinitur, atque in vicinam peluim demittitur.
 Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua
 persunduntur, & denuo pressa abijciuntur. Hu-

Elaterium

DIOSCORIDIS

mor in pelui agitur, & linteo, opertus Soli expo-
nitur: dumq; steterit, tota supernatans aqua cū hu-
more concreto, effunditur. Hoc vero identidē fieri so-
let, donec existēs aqua lique scat: qua stillatim ex-
hausta, sedimentum mortario suscipitur, & conte-
rendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad lauriendam
protinus succi abundantia, cribratos cineres humi
inspargant, & medium cauantes, triplicatum lin-
teum obtendant, per quod elateriū cum sua humi-
ditate diffundunt, siccaturūq; in pila, ut dictū est,
conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfur-
dentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionē, mul-
sam aquam respergunt. Elaterium optimū esse cō-
stat, leue, non ponderosum, cum candore leniter hu-
mectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum
luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum ta-
men scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui
cinerisq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet.
Nec desunt qui cucumis succo amyliū immisceant,
ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bi-
matu ad decennium deiectionibus utiue est. Integer
modus, obolus est. minimus, semiobolus: pueris, chal-
ci duo: si quidem copiosius, periculum adfert. Bilem
ac pituitam utrauis parte extrahit. Optima suspi-
riosus est purgatio. Quod si in animo sit deiectionē
moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare
sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia da-
to, postea cyathus unus aque tepide sorbeatur: ad

citandas tamen vomitiones aqua diluens elateriū,
subiectas linguae partes penitissimè penna oblini-
to: quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut
unguento irino resoluito, somnū inhibeto. Porro his
qui eximie vacuantur, continue vinum, & oleum
dari conuenit: etenim vomendo restituntur. Quòd
si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta,
posca, poma, & quæ stomachum desando corrobo-
rant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, et par-
tus enecat, in pessa subditū: morbo regio medetur,
cum lacte naribus infusum, et diuturnus capitis do-
loribus liberat: efficacissimè anginis illinitur, cum
vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. Cap. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia ha-
bet lahrusca, diuisa: & cauliculos rectos, mol-
les, nigrosq;: fert florem glasti, et folliculos virides,
similes ciceri, & in his nucleum triangulum, sca-
brum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gu-
stu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mul-
sa dentur, crassum humorem per vomitum pur-
gant: sed qui hauserunt, ambulare debent: pruden-
ter tamen attendere oportet, & aquam mulsam
continuo potui dare: quoniā pericula strangulatio-
nis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo
illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris.
Cit plurimam pituitam commanducata. decocta
in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheu-

DIOSCORIDIS

matissimum gingiuarum sistit: vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Tapfia.

Cap. CXXXVIII.

Thapfia nomen ideo accepit, quòd in Thapso eiusdem nominis Insula primum inuenta sit. Tota vero natura ferulae similis est: graciliore caule: folijs foeniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulae, latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: factò in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excavata, cooperitur, quòd merus succus confluat: oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallu expressus fictili crasso insolatur. Aliqui foliu vnà terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc aut interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs aut extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet nō obuersus vento: aut potius, cū dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulae: ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniri accedunt. Tam cortex radice,

LIBER QVARTVS. 191

quàm succus, purgandi vim habet, & lacteus succus in aqua mulsa potus: nam utrinq; bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus unus: quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiciosiss, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tã radix, quàm succus omnium maximè, quæ pares cum eis vires adepta sunt, vim habent extractoriã ex alto, ubi ex imo aliquid euocandũ est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affricu, alopecias explèt. Radix succusq; cum æquis ceræ thurisq; portionibus, sugillata linoresq; tollunt: sed nõ plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cũ melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discutit, perunctus cũ sulphure. In diuturnis pulmonũ, laterũ, pedũ, articulorũq; ualetudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendã colic glandem, ijs qui natura, non circuncisione, curti sunt: tumore enim excitat, qui pinguiũ fotu emollitus, præputij iacturã resarsit.

ANNOTATIO.

* Sine folijs, Spartiũ, vt in agro Montepessulano eius feracissimo sæpe obseruaui (à G. Rondelletio eius loci clarissimo Medico primũ admonitus) cùm primum

D I O S C O R I D I S

erumpit, plurimis foliolis turgēt, quibus omnibus cū ad consistentiam peruenit (quo solo fortassis tpe visum Dioscoridi) exuitur, adeo vt ramuli eius iūcei deinde appareāt. Est tamen hoc diuersum planē ab eo, cuius Plinius lib. xix. cap. 11. meminit. Cæterū an spartium hoc loco depictum, sit idem cum genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quā eorum iudicio subscribere, qui diuersi generis plantas esse contendunt: & pro genista fruticem quendam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis, cū lentam appellet, satis innuit) parum idoneum ostendant.

Spartium. Cap. CXXXIX.

Spartium frutex est: longas ferens virgas, & sine solis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticule, in folliculis phasiolorū modo nascens florem, vt albæ violæ, luteum. Purgant per superna uehementer, hellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinque obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidā marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clyster: strigmenta autem elicit cruenta.

LIBER QVARTVS. 192

Silybum. Cap. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recēs cum sale oleq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pōdere potus, vomitiones ciet.

Glans vnguentaria. Cap. CXL I.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellane nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa unguenta pro oleo vtantur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæā. Praefertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere posita, lienem absomit: cum lolij farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varos & papulas in facie, et cutis vitia tollit. Vomitione mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verum tussæ & expressæ succus abstergentibus medicamētis adiungitur, quæ aduersus prurigines & scabritias idonea sunt.

Narcissus. Cap. CXLII.

Narcissum sunt qui ut lilium, lirium appellantur, folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis uacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

DIOSCORIDIS

crocus, in quibusdā purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrum, longum: probatissimus nascitur in montibus, suauis odore: ceteri porrum imitatur, atque herbaceum uirus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, uomitoria est: ambustus igni prodest, cum exiguo melle trita: praecisos nervos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: uitia cutis in facie, uitiliginisque: cum semine urticae, & aceto emaculat: cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit coctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaes. Cap. CXLIII.

Hippophaes, quo fullones uestes interpolant, in sabulosis, maritimisque nascitur, surculaceo frutice, undique denso & largo, folijs oleae, longioribus, mollioribusque: inter quae candicantes spinae emicant, siccae, angulosae, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsiae, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Synerus, pituitas, bilem, aquasque detrahit, oboli pondere: erui uero farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicibus siccatur conditur,

LIBER QVARTVS. 193

tur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus
datur. Radice & herba liquamentū depromitur,
vti in thapsia: huius in purgationibus modus est
drachma.

Hippophæstum. Cap. CXLIIII.

Hippophæston, id, quod aliqui hippophæses
appellant, nascitur eisdem locis, quibus
hippophæses, estq; spinæ fullōiæ genus, hu-
milis herba, sine cauliculo, sine flore: in anibus tan-
tū capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas ha-
bens molles, crassas. Succus radice, folijs & capi-
tulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tri-
bus obolis, in aqua mulsæ, aquā pituitasq; detra-
hit: priuatim comitialibus morbis, neruorū vitijs,
& orthopnœæ conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus.

Cap. CXLV.

Cici, aut croton, nomen accepit à ricini anima-
lis similitudine: arbor prouenit parua ficus al-
titudine, folio platani, maiore, leuiore, & nigrio-
re: ramis, caudicibusq; canis, in arundinis morem:
semine in vuis asperis, quod corticibus exutum, rici-
num animal representat: ex quo oleū, nomine cici-
num, exprimitur, cibus fœdū, lucernis emplastrisq;
vtile. Grana triginta numero purgata, trita potio
pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt: vo-
mitionesq; mouent, sed iniucunda admodū est, &
molesta purgatio: siquidē stomachum vehementer
subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie,

Vulgò
Catapu-
tia ma-
ior.

D I O S C O R I D I S

varosq; expurgat. Folia cū polenta trita, inflāma-
tiones oculorū, tumoresq; leniūt: rigētes māmas co-
hibēt. eadē ex aceto illita, ignes sacros restringūt.

Tithymali. Cap. CXLVI.

Tithymali genera septem, quorum masculus,
characias appellatur, ab aliquibus amygdal-
loides: alter, myrtites, qui foemina existimatur,
eumq; myrsinitem aut caryiten vocant: tertius, pa-
ralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helio-
scopi: quintus, cyparissias: sextus, dendroides:
septimus, platyphyllos dicitur. Characiae caules su-
pra cibiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo suc-
co atq; acri madentes: folijs oleæ circum ramos, an-
gustioribus, et longioribus: radice crassa, lignosa:
pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub
qua caueole foliolis balnearum similes, in quibus
semen continetur: nascitur in asperis, & montibus.
Succus aluum purgat: trahit pituitam bilemq; bi-
nis obolis in posca sumptis: & cum aqua mulsa,
vomitiones mouet. Appetente vindemiarum tem-
pore, succus congestis ramulis, mox dissectis, &
uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinā
erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudi-
nem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quater-
nae sue guttas instillant, vt cum his inarescat: quas
ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, et in
pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur
lac neq; quò ventus aspiret, stare quenquam, neq;

ntanus oculis admonere cōuenit: sed antequam col-
ligas, corpus, præsertim faciem, collum, scrotumq;
genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fau-
ces autem exasperat: quapropter catapotia, cera
aut decocto melle oblini par est, & hoc modo da-
ri: binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia,
sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in
sole capillos euellit, renascentesq; flauos, & exiles
efficit: deniq; omnes perimit. Dentium cauernis in-
clusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne
suo delapsu, fauces & linguam vitiet. Tollit illitis
impetigines, formicantes verrucas, pensiles, et quæ
thymi florem representant. Valet aduersus ptery-
gia, carbunculos, phagedænas vlcerum, gangræ-
nas, fistulâsque. Legitur semen autumnino, & sic-
catum sole leuiter tunditur, feruefactumque loco
mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen
& folia lactei succi effectum præbent, dimililio
acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum
lacte lepilio, & caseo contuso. Radix drachmæ
pondere in hydromelite pota, per inferna trahit.
Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, col-
luto ore. Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten
vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: folijs
myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis,
& purgentibus: ramulos ab radice mittit dodran-
tales: fructum fert alternis annis, nuci similem,
mordaci gustu: nascitur & hæc in asperis. Suc-

DIOSCORIDIS

eus, radix, semen, folia, consimilem antedicto for-
tiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones
inualidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur
paralios, quem tithymalida, aut mecona aliqui ap-
pellauere. Nascitur in maritimis, ramis subrubētis
bus, palmum altis, quinis senisue à radice exeūtis
bus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus
quosdā digestis: capite in cacumine orbiculato, in
quo semen, vt eruum, vario colore emicat: flos al-
bus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget.
Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur,
folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribus q̃: ra-
mulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinq̃,
rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis
copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitu-
lis incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniā comas
cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissi-
mum in ruderibus. Colligitur succus semenq̃, vt
aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamē
vsque adeo valide. Ciparissias in caulem exit do-
drantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia
piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, &
tenuiora: & in totum nascentem piceam emula-
tur, vnde nomen traxit. Candido succo madet, cui
eadem vis quæ superioribus. In petris nascens, den-
droides cognominatur, ampliter opacat, in cacumi-
ne frōdosam spargens comā, succo lacteo pregnās
cauliculis rubētibus: folijs myrti tenuioris: fructu

LIBER QVARTVS. 195

characie. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo recoditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aquæ inspersus. Reliqua tithymalorum genera, quæ suprà scribuntur, idem efficiunt.

Pityusa. Cap. CXLVII.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, etsi tithymalorum generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassâ, cādida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur: modus foliorum drachmæ tres.

Lathyris. Cap. CXLVIII.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo græ

Offici-
nis Cæ-
taputia
minor.

Bb iij

DIOSCORIDIS

na intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: que dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in cata potio, aut cum ficis, aut palmulis denorata, alium purgant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquuntur ad eosdem effectus.

Peplus.

Cap. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs parvis, ut rutæ, paulo latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. unicam radicem habet. superuacuum, ex qua fruticat: nascitur inter vires, & in hortis. Colligitur messibus: siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus tussus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio: obsonijs inspersa conturbat aluum. muria conditur.

Peplis.

Cap. CL.

Peplis, quam aliqui sylvestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maxime nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs sativæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo, feruens

te gustu: radice singulari, supernacua, tenui. Colligenda, & reponi ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Chamæsyce.

Cap. CLI.

Chamæsyce aliqui sycē nomināt. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, peplum, planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur. semine sub folijs rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, supernacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedāt, in pecto appositi, tollūt tumores ac verrucas omniū generū illiti: decoctorū cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest: illitus contra scorpionis ictū auxiliatur: aduersus caligines oculorū utilis, et hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices cū melle inunctus. In squallidis petrosisq; nascitur.

Scammonia.

Cap. CLII.

Scāmonia, ramos ab vna radice emittit trium cubitorū, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: folijs helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangularis, flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto radix in testudinis speciem cultro excanatur, quo fit vt in cauum confluat succus, qui conchis demum ex-

B b . iiij

DIOSCORIDIS

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-
 diunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profun-
 dunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autē
 scāmonium leue, nitidum, rarum, & colore quā
 simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fi-
 stulis, quale ex Mysia regione Asiae deportatur.
 Nec attendere solum par est, si linguae tactu albe-
 scat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit
 tithymali lacte) sed longē magis antea narratis.
 Item si non vehementer linguam exurat, id quod
 misti tithymali argumentum est. Natione autem
 Syriacum & Iudaicum deterriima habentur, gra-
 uia, densa, erui farina & tithymalo vitata. Suc-
 cus drachmæ vnius aut quaternum obolorum pon-
 dere haustus, ex aqua pura vel mulsæ, per inferna-
 bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendā alui
 binos obolos cum sesama, alioque semine, sumpsisse
 satis est. Dantur efficacioris purgationis causa,
 succi tres oboli, cum duobus veratri nigri & aloes
 drachma vna. Fiunt purgatorij sales, drachmis vi-
 ginti succi scāmonie, i senos salis cyathos adiectis.
 Horum modus proportionē virium: integer quidem,
 tria cochlearia: medius, duo: minimus, vnu. Radicis
 drachma vna aut altera purgat, cū ijs quæ retuli-
 mus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in
 aceto, & cū hordeacea farina teritur, cataplasma-
 te ischiadicis vtili. Partus enecat succus, vuluæ i la-
 na subditus: tubercula discutit cū melle aut oleo illi

tus: decocto ī aceto perūctæ lepræ abigūtur: diuturni capitis dolores ex aceto et rosaceo perfundūtur.

Chamælea. Cap. CLIII.

Chamælea surculosa fruticat, ramis do- Offici-
dratalibus: folia oleæ similitudinē habēt, nis Me-
tenuiora & amara, quæ gustata linguā xereon,
mordent: & arteriā deradunt. Detrahit pituitam Arabū
bilemq; , folijs præsertim in catapotio deuoratis: mors.
nanque duæ absynthij partes, adiecta chamæleæ
vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia co-
guntur: ea autē in ventre non liquefcunt: siquidē
quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cū mel-
le tritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa. Cap. CLIIII.

Thymelæa est, qua granum gnidium, quod est Granū
semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apolinum Gnidiū.
vocant, quoniam satui lini frutex suapte natu-
ra similitudinem referat. Virgas edit perpulchras,
multas, tenues, binum cubitorum altitudine: folijs
chamæleæ, angustioribus, & pinguioribus, vi-
scosis, gummosisq; , si mordeantur: flore candi-
do: fructu myrti in modum rotundo, qui inter ini-
tia virescit, & tandem rubescit: inuolucrum fru-
ctus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per
inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si vi-
ginti granorum pars interna bibatur: verū in sau-
ces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in
uue acino dari debet, aut melle cocto obductū deno-

DIOSCORIDIS

rari. Qui egrè desudant, trito semine cum nitro et aceto, inunguntur. Folia que peculiariter cneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tunde re, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo, cum diluta vini portione, aquam extrahit: in diocrius purgat, addita lente cocta, aut cōtritīs oleribus. Thymelæe farina vix acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho iſta, partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur, qui coccon gnidium, fructum esse chamelæe existimant, decepti quadā foliorum similitudine.

Sambucus.

Cap. CLV.

S Ambuci duo genera: vnum in arborem assurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, canos, candicantes, proceros: folia in glādis: terna, quaternæue, ex intervallis circa ramos exeunt, grauiā odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculisq; circinate umbellæ, que florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterum genus, chamæactē vocatur, Romanis ebullū, longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu serratis.

LIBER QVARTVS. 198

tis: mustario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque vis, & vsus exiccans, alno detrahens aqua, Stomacho inutilis. Folia, olerum more coquuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat: prodest viperarum moribus, eodem pota modo: vuluas emolli insidentium decocto, patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti, Folia, si pretennera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis & canis moribus illitu prosunt: vlcera quae dehiscunt in fistulam, agglutinant: ijs, qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt illita folia.

Pygnoكوم. Cap. CLVI.

PYgnoكومon constat eruce folijs, acrioribus, scabris & crassis, caule quadrangulo: flore ocymi: semine marrubij: radices nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terra redolente: inuenitur in saxosis locis. Semen grania somnia, & tumultuosa facit, drachmae instar potum: tumores discutit, illicum cum polenta, & spiracula, adactosque corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula, panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsa duum drachmarum pondere, alnum soluit, & bilem extrahit.

DIOSCORIDIS

Apios.

Cap. CLVII.

*Aspho
deli.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rute, oblongioribus tamē & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastule regie, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda: intus habet corpus candidum, extrà cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix i fictili mergitur, et agitata aqua, quod supernatat pēna selectū, exiccatur. Purgat vtraq; parte is succus, sesquiobolo potus.

Colocynthis. Cap. CLVIII.

Coloqui
tida offi
cinis,

Colocynthis sarmenta foliaq; satini cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pile conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Melulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactae pile teruntur, & infusae clysteribus prosunt nervorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitijs, ut quae bilem, pituitam & strigmēta, interdum etiam cruorem eliciant: foetus admotae enecant: dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cum aceto et nitro inferuescat,

LIBER QVARTVS. 199

hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua mul-
sa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo
refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta
alui detrahet: stomacho supra modū aduersatur.
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.
Virentis succo vtilissimè schiadicī perfricantur.

Epithymum. Cap. CLIX.

Epithymon, flos est è thymo duriore, satureiæ
similis: capitula habet tenuia, & leuia, & in Aliud à
eis caudiculas, quasi capillamēta. Potum cum mē nostro
le detrahit pituitam bilemq; atram, per inferna. Epithy-
Privatim prodest melancholicis, & inflatis, aceta mo.
buli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle,
sale, et aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia et
Pamphylia gignitur.

Alypum. Cap. CLX.

Alypon, surculosa herba est, subrubra: graci-
libus ramulis: tenuibus foijs, flore molli, le-
ui, & copioso. radice betæ, tenui: referta acris suc-
co. semine epithymi.

DIOSCORIDIS

Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in
iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris. Cap. CLXII.

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo prelon-
ga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, fo-
lijs hortensis solant, longioribus ac latioribus: mus-
coso flore, & capillaceo. fructu exiguis uvis similis
post maturitatem rubente: rotunda est acinorum
facies. Feruescens radix in aqua, & in cyathis
duobus vini aqua marina diluti, pota, humorem
alui ciet: ideo hydropicis datur. Vire eius, vitia cu-
tis in facie, & maculas omnes expurgant. Enas-
centes viticule, cibi gratia, sale condiuntur.

Vitis alba. Cap. CLXIII.

Officinis
Bryonia. **V**itis albā aliqui bryoniam vocant. Folijs,
viticulis, pāpinisq; satiuam vitem imitatur,
sed hirsutiora sunt oīa: ea, quos prope se nacta sit
frutices, suis clauiculis complectitur fructus rubens
in vna dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea
asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti
in cibo, aluum et urinā ciet. Folia, fructus, radix,
acrem vim sortiuntur: itaq; ulcerum phagedenis,
gāgrenis, chironijs, putrentium tibiārum tadio, ef-
ficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit,
& cutem erugat. vitia cutis in facie, varosq; lēti-
gines, & cicatrices nigras emēdat, cum eruo, creta
Chia, et fœnogræco. Eadē effectū prodest decocta
in oleo, vsq; dum liquecat: sugillata tollit, & res

diuicias cōmittit: inflāmationes discutit illita ex vi-
no: suppurationes rumpit: medicamēto aptē immi-
scetur, quod carnem exest: infracta ossa extrahit,
trita & imposita. Datur comitialibus in potu dra-
chmæ pondere, quotidie, anno toto. Prodest attoni-
tis, & vertigine laborātibus, consimiliter assu-
pta. Contra viperarum ictus pota drachmis dua-
bus, auxiliatur: partus necat, mentē interdū sub-
turbat: fœminarum locis apposita, partus secun-
dasq; morātes trahit: cit vrinā pota. Eclegma ex
ea fit cū melle, difficile spirātibus, strāgulatu op-
pressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterū dolo-
ribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta
diebus, cōsumit: illinitur ad eadē cū fico. Ad mulie-
bres īfessus decoquitur: si quidē vuluas purgat, sed
abortū facit. Succus ē radice vere exprimitur qui
trahit pituitā, cū aqua mulsa potus. Ad psoras et
lepras, semē efficaciter illinitur. Lactis abundantiā
facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra Cap. CLXIII.

Nigra vitis, quam aliqui nigram bryoniam
vocant, folia fert hederae, smilaceis proxima,
sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis
suis arbores, quasi adminicula, comprehendit:
fructus racematim coherent, qui inter principia
virent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo-
ris nigra, intus buxæo colore. Viticulae, quæ pri-
mo germinum partu erumpunt, in olera recipiunt.

DIOSCORIDIS

tur: menses pellunt, vrinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tē tatis, profunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis tumentorum ceruicibus commodissime illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

Cap. CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pennata, subgravi odore: radice per summa cæspitum nigra, oblonga, filices multas fundēte, subadstringēte gustu: nascitur in montibus, & saxosis. Radix laticineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammonie aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debet. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & portu & illitu cū axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quā per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contrā, euanescebat abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Filix fœmina folijs est filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, vt illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt: aliquæ etiamnū rubræ inueniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cū melle. eclegmate sumpto: potæ cū vino, drachmis tribus, terretes

teretes lineas eijciunt : datae foeminis, sterilitatem faciunt, & pregnantibus abortum, si supergrediatur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur vt ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

Cap. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, praesertim quercuum, palami altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirri, seu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austeri aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aquae mulsae insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatus efficaciter illinitur, & aduersus rimas, quae inter digitos fiunt.

Dryopteris. Cap. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

cc

DIOSCORIDIS

Cnicus. Cap. CLXVIII.

Offici-
nis, Car
tamus.

CNicus folijs constat oblongis. per ambitum di-
uersis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capi-
tulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine
candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore
in obsonijs vtuntur. Seminis tusi & expressi suc-
cus cum aqua mulsa, vel iure gallinacei aliu pur-
gat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt
offula, quas placentulas vocant, adiectis succo a-
mygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aliu
emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nu-
cis inglandis magnitudinem impleant: è quibus an-
te coenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio
temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amy-
gdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres,
anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cū
carnibus triginta caricarū. Seminis succus lac cor-
git, et magis ipsum resoluēde alui facultate donat.

Mercurialis. Cap. CLXIX.

LYnoxostis, alij qui parthenion, alij hermubo-
tanion appellant: folijs constat ocymi, hel-
xine cognatis, sed minoribus: ramulis du-
plici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis mul-
tis: fructu scemine, copioso, quandam racemorum
speciem præbente: mari, è foliorum sinu depēdente,
paruo, rotundo, ceu binis testiculis vnà coherentibus:
frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in e'e-
ribus manditur, ad aluum ciendā: cocta in aqua,

LIBER QVARTVS. 202

epoto iure, bilē aquamq; detrahit. Cōstat vt mares
gignātur, hūc facere: vt ſcēmine, illā, ſi à purgatio
ne bibītur, et trita folia genitalibus admoueātur.

Cynocrambe. Cap. CLXX.

CYnia aut cynocrambe, cauliculum binū
dodrantum altitudine emittit, mollem,
subalbidum: folia mercuriali aut hederæ
ſimilia, certis interſitijs ſubalbida: ſemē ſolijs ad-
hæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus po-
ta, aluum cient: oleribus commendantur. Ius deco-
cti & pituitam & bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium. Cap. CLXXI.

HELIOTROPIO magno flos eſt effigie ſcorpionis
caudæ, vnde ſcorpipro ei nomen: & quoniā
folia cum ſole circumagat, heliotropion dicitur. Fo-
lia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, et maiora:
ramuli à radice terni, quaterni, aut ſæpe quini exi-
liunt, multis alis concaui: flos in cacumine candi-
dus, aut ſubfuluus incuruatur vt ſcorpionis cau-
da: radix tenuis eſt, & inutilis: naſcitur in aſperis.
Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ,
potu pituitam bilemq; per aluum extrahit: contra
ſcorpionum iſtus ex vino potum, & illitum pro-
deſt: adalligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per
horam vnā ante acceſſiones, ſeminis grana
quatuor cum vine quartanas finire: tria verò,
tertianas. Illitum ſemen formicantes verru-
cas penſilesq;, & thymos, & epinyctidas exic-

C c ij

DIOSCORIDIS

cat. Folia infantium deſtillationibus, quas ſyriaſe
ſeis vocant, podagris, luxatisq; vtiliſſimè illinun-
tur: menſes cient: partus trita & impoſita pellūt.
Heliotropion paruum naſcitur in paluſtribus, iux-
ta lacus, folijs, antedicto proximis, rotundioribus:
ſemine, acrochordonum verrucarum modo, penſi-
li, rotundo. Herba cum ſuo ſemine pota, adieſto, ni-
tro, hyſſopo, naſturtio, & aqua, latas tineas tere-
tesq; excutit. Penſiles verrucas, quæ acrochordones
vocantur, cum ſale illita tollit. Scorpioides herbula
eſt, folijs paucis, ſemine caudæ ſcorpionis effigie.
Illita ſcorpionum icibus præſentaneo eſt auxilio.

QVARTI LIBRI FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER V.

Ioanne RVELLIO Sueffionenfi
interprete.



Vperioribus quatuor libris, amiceſſime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguētis & earundē lacrymis ac fructibus, item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus, necnō de omni radicū, herbarum, succorum, ſeminūq; ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de vinis & metallicis, à vitæ noſtram commentationem auſpicati.

Vitis Vinifera.

Cap. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflātionem ſtomachi ardoremq; cum polēta: folia etiā per ſe, vt quæ refrigerent & adstringāt, imponi ſolent. Potus eorum ſuccus dyſentericis, ſanguinē excreantibus, ſtomachicis, & gravidarū malaciæ medetur. Eadē efficiūt madefacti in aqua capreoli et poti. Lacryma vitii, quæ veluti gūmi in caudicibus cōcreſcit, ex

Cc ij

DIOSCORIDIS

vinò pota calculos pellit : illita lichenas & psoras
leprasq; nitro prius perfrictas sanat : eadem cum
oleo sæpius pilis illitis , psilothri effectum habet :
maximeq; sanies, quam accensu sarmenta vitium
viridia exudarunt : qua & perunctæ verrucarum
infectiones extrahuntur. Cinis sarmentorum
& vinaceorum, detractis in sede condylomatis , et
thymys , illitus ex aceto medetur : prodest luxatis
& viperarum morsibus : contra lienis inflamma-
tionem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto. La-
brusca duorum generum est : alterius vva non ma-
turescit, sed flore tenui cenanthen nominatum per-
ducit. Altera ad frugem peruenit, parvis acinis, ni-
gra, & adstringens. Folia, caules, et clauiculae, qui-
bus repunt, vim habent cultæ viti similem.

Vua. Cap. 11.

Vva recentes aluum turbant, & stomac-
chum inflant. innocentiores, quæ decer-
ptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia
humoris exiccatur) vtilesq; sunt stomacho, ægrise-
que, atque cibi auiditatem excitant. In vinaceis et
ollis seruata, ori & stomacho gratæ sunt : aluum
sistunt (sed vesicam & caput lentant) & sangui-
nem excreantibus conueniunt. Similesq;, quæ in mu-
sto fuere. Sapa aut passo conditæ, stomachum ma-
gis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua ce-
lesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosi, ara-
dentibus & longis febribus salubres. Reconditi

vinacci inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, celiacos, & foeminas fluxione vulvæ laborantes iuvat infusa: ad defeciones, ac fœtus assuamitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinēt stomacho vtilis sunt: inspargitur farina tostorū, polentæ modo, dysentericis, & celiacis, & solutis stomacho. Vva passa alba adstringentior est: prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ovo, valet ad purgandū caput: eiusdemq; gratia cum pipere commanducatur. Testiū inflammationes sedat, illita cum lomento fabarū, aut cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrenas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe.

Cap. III.

Oenanthe vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectaque substrato lenteo, in vmbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac ciunda vrine vtilis: aluum sistit, ac sanguinis excretaiores: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita efficax est: capitis doloribus tam viris

Cc iiij

DIOSCORIDIS

dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo persunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes agylopos, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat, pestis miscetur, ad sistendū sanguinem: contra oculorum delacrymationē, & stomachi ardores, cum polline polentæ & vino illinitur. Cinis crematæ in testâ, candētibz prunis, facit ad oculorū medicamētâ: redunias & pierygia, abscedentes gingivas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium Cap. IIII.

Omphacion, succus est acerbe vire, nondum maturescentis, è Thasia vite aut Amineæ. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro are, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur semperq; quod cervici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctuq; à subdialibus locis in lectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum concreescere non sinunt. Eligendum est flavum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest cōtra tonsillas, vuā, ulcera oris, humida gingivarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vulvæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritie, & erosionibus angulorum convenit. Bibitur ad recentem san-

guinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & aquatiore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura.

Cap. V.

Vino vetere nerui leduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est. quare cauendum ijs, qui intestinae alicuius partis imbecillitate sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, egrè coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate medium, vtraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum & grorumq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod medium est, medias inter vtrunque vire: habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distant: siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt mustum, turbat: sed minus inebriat, renibus & vesicae aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusq; urinam expellit. nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur: sitim stimulat,

D I O S C O R I D I S

neruos infestat, aluo aptum, à valetudine se recol-
ligentibus inutile. Passum, quod vuis sole siccatis
in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur,
Creticū cognomine, aut praninion, aut protropō:
& sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion
aut hepsema appellant: nigra quidem, & quæ di-
cuntur melāpsylbia, crassa sunt, & corpora mul-
tū alunt: cādidum, tenuius: & heluola inter hæc
media, medias sortiuntur vires. Omnia tamē ad-
stringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus
venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, &
vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium,
pharicon, toxica & concretum in grumos lac: itē
contra renum, ac vesicæ pruritus, rosion, exulcera-
tionesq; Inflant tamen, et stomacho aduersantur.
Priuatim, prodest melampsythium, si venter rheu-
matismum sentiat. Album, magis ceteris emollit
aluum. Gypso conditum nervis officit, caput ag-
grauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra
venena ceteris aptius. Picata, aut resinata, ex cal-
faciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus ini-
mica. Quæ vero aparachyta vocant, vt quæ admi-
stam saram recipiunt, caput implent: tumulentiā
gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum
male habent. Inter Italica vina Falernum princi-
pem locum obtinet, quod inueteratum per quā
facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstrin-
git, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ijs, qui

visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros
 minime idoneum. Albana crassioribus constāt par
 tibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emole
 liunt (sed concoctionem non æquē adiuuant,) &
 nervosa minus infestāt: vetustate, eadem austerū
 saporem concipiunt. Cecubum, cū sit dulce, est
 & Albano crassius: corpus & colorem alit: ægrē
 tamen coquitur. Surrentinum, valde austerum est:
 quare intestinorum & stomachi fluxiones cohi
 bet, & cū tenue sit, caput minus tentat: inuete
 ratum suavius redditur, & stomacho vtile. Adria
 num & Mamertinum in Sicilia æquē crassis par
 tibus gignuntur: modicē adstringunt, & ocysis
 inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem,
 nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico
 sinu defertur, odoratum ac tenuius est. quare libe
 raliter epotum fallit. diu seruat ebrietatem, & so
 porem adfert. Istricum, Paratypiano simile est, sed
 vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedi
 ctis mollius, & aptum potui est: bene alit, & mi
 nus inebriat, fluxiones colibet, oculorum medica
 mentis vtile. Lesbium facile membra subit, Chio
 lenius, & aluo idoneum. Ephesium eandem vim
 habet, quod Phygelites nominatur: verū Asian
 um ē Tmolo monte, Mesogites appellatum, capi
 tis dolores ciēt, & nervos lēdit. Coum vero &
 Clazomenium, quoniā multam sibi maris aquā
 vendicant, facile corrumpuntur: flatus movent,

DIOSCORIDIS

alium turbant, nervis efficiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac syncerū, & sua natura austerum, excalfacit, facile in mēbra distribuitur, Stomachum adiuuat, appetentiā ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget: somnū conciliat, & commendat colorem. Potū liberalius auxilio est contra assumptam cicutā, coriandrum, pharicum, ixiā, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosue: contra serpētium morsus, & omnium iētus, quæ refrigerando necāt, aut Stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rofionesq; præcordiorum, ac distentiones, Stomachi resolutionem, & si venter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè alba, vetera, & odorata. Quæ tamē vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagedenica, & fluxionibus obnoxia, commode perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & per multa Campaniæ, & Paratypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò & nigra, Stomacho negotium exhibent, inflationem

pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentant. In media etate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire, & medicè cibos proluere, optimū est præceptū. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: si quidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborū adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ potus, utilis: nanque modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per ceca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: si quidem valetudinis alicuius gratia factæ temulentiae remediū adfert frigida. Omphacites nomine, peculiariter sit in Lesbo, siccata sole acri vva, paulo ante maturitatē decerpta, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malacie, & crudis: in pestilentia quoq; sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellāt, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, i vinacea, quibus triginta vini

DIOSCORIDIS

metretæ extractæ fuerint calcatis vinaceis, expressæq; decocto ad tertias partes, & addito in singulos congios modi eius, qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolefcit. Cõuenit ægris, quibus timemus noxam vini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare: item à longa ualitudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo: Pares aquæ, & musti mensuræ coquantur molli igne, donec absumatur aqua. quod ubi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marinæ, & celestis aquæ, mellis et musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant: quoad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syriuestri vva nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites. Cap. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: nanque aluum leuiter emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vino uetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò ma-

gis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; efferuere desierit, in alia nasa transfunditur.

Mulsum.

Cap. VII.

Mulsum è uetere uino austeroq; & bono melle factum, praefertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum uenit. Vetus corpus alit: media etate, aluo prodest, urinã pellit: à summo cibo sumptum nocet: & inter initia potum, implet dein appetendi auiditatẽ reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, admiſta una mellis. Aliqui, quò celerius praebere possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruētis, unũ mellis adiiciunt et ubi ferbuerit, uase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa.

Cap. VIII.

Aqua mulsa easdem quas mulsum uires possidet. Cruda utimur, cum moliri deiectionẽ, aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs, qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentes pulsus, quos illi dicere mycrosphyctos, tussientibus, peripneumoniacis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiuumque, quod aliqui hydromeli propriè uocant, media etate adynamo uino, aut lora in recreandis uiribus, respondet, & similem uim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen

DIOSCORIDIS

usus damnatur, inflammatis, aut cōstrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit, duobus pluuie aquae veteris ad vnā mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adiiciunt, ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt, qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

Cap. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, caelum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, synœra: nullius omnino qualitatis particeps, & quae re minimo quidem tempore in praecordiis commoratur: ad haec, quae & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aliū enim conturbat) pituitam expellit. Si vero calida ad fœtus adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitijs, & pernionibus, antè vlcera prodest. Miscetur cataplasmati ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmati. Ad mouendas deiectiones tepēfacta infunditur, & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lēdes, & mammas rigentes

tes

tes, fœueri vtile est: liuores fotu discutit: ad venenatos ietus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidâ descendat, auxiliatur. Et malo habitu confestis iâ diu corporibus, nervisq; balneæ ex ea vtilis: hydro picos, capitis dolores, aurium gravitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mixtione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinæ aut pîscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniâ.

Thalassomeli. Cap. X.

Quod thalassomeli vocatur, vehementer purgare cõstat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiiciunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

Acetum. Cap. XI.

Acetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, & appetentiam excitat: erumpentem vndecunq; sanguinem, potu in se sive sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulneribus inditur & inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum: reprimit

D d

DIOSCORIDIS

procidentia sedis, vuluæq; item abscedentes gingi-
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phas-
gedenas vlcerum, nomasq; fotu continuo cohibet:
podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur.
fugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capi-
tis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut
spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, graui-
tatem aurium, & sonitus, sibilosq; feruentis va-
por proficit. instillatum quoq; aurium vermes ne-
cat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto
spongia admouetur, & pruritus permulcet. Con-
tra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando
nocent, calidum commodè fouetur: & frigidū ijs,
quæ exurens virus ei aculatur. Calidum potū, atq;
vomitibus redditum, aduersus oīa venena effi-
cax est, præsertim contra meconium, & haustani-
cicutā, conglobatum in ventre sanguinem, lac coa-
gulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale. Hau-
stu voratas hirudines, si sorbeatur, eicit: tussim
veterem mitigat, & recentem laceffit. In ortho-
pnœa calidum cōmodè sorbetur, gutturis fluxiōes
gargarizatum inhibet, anginis & vuæ procidēti
conuenit: contra dentium dolorē, calidū colluitur.

Acetum mulsum. Cap. XII.

A Cetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,

LIBER QUINTVS. 210

salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atq; vbi refrixerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiâmue, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. Cap. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus inijciatur, & prociduum sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat: furfures & manantia capitis vlcera exterget.

Thymoxalme. Cap. XIII.

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articulis morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo factitatur: Thymitriti acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguae portiones in vas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo subdio madescunt.

D d q̄

DIOSCORIDIS

Scillinum acetum. Cap. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ can-
dida fuerit, expurgata conciditur, traiectaq; li-
no segmenta modicis interuallis, ne se contingant,
siccantur in vmbra quadraginta diebus: mina eo-
rum in aceti boni sextarios duodecim immergitur,
et vase diligenter operto septenis diebus in sole ma-
descit: post eum numerum dierum scilla eximitur,
& expressa abijcitur: defecatum acetum trāsfun-
ditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinque
aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem re-
purgantes, parem mensuram adiiciunt, & senis
mensibus macerari patiuntur. Id multo magis hu-
morum lentitias digerit: gingiuas humore prægnā-
tes collutione stringit firmatq; , & motos dentes
stabilit: putredines oris, & graues halitus tollit:
durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem
expedit, & limpidam canoramq; reddit. Datur
stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melēcho-
licis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item
vuluarum strangulationibus, lienis incremento la-
borantibus, ischiadicisq;. Ambecillos admodum re-
creat: corpus sanum reddit, & bonum colorē præ-
stat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque
aurium infusione purgat. In summa, ad omnia ef-
ficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationi-
bus, in capitis dolore, aut nervorum vitijs. Datur
quotidie ieiunis sorbendum, inter initia exiguum,

paulatim adaugendo, ad cyathum vsq;. Nonnulli
binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. Cap. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, uti
dictum est, scillam, & sole siccata[m] contundi
to, minam eius tenui cribro incernito, & linteo ra
ro illigatam, in videnos sextarios musti recentis ac
boni demergito: vbi trimestri spatio maduerit, elu
triatum vinum, obstructo diligenter vase, recondi
to. Licet quoq; sic humida scilla uti: In orbiculos,
rapi modo, dissecta duplicato pondere, quadragin
ta diebus in solari oportet, & valde inueterascere.
Alia parandi ratio: Scille dissectæ & repurgatæ
tres minas, in Italicam metretam musti demittito
& senos menses in vase obstructo macerari sinis
to: post id tempus defecatum & excolatum vini
recondito. Utile est contra cruditates, & ciborum
corruptiones: item ijs, qui renouunt cibum, & si
pituita in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lie
nosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem,
regio morbo, difficili vrinæ, torminosis, inflationi
bus, resolutioni neruorum, horroribus longis, verti
ginosis, & vulsis. Menses pellit, minimeq; neruos
infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus
in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. Cap. XVII.

Marina variè factitantur: Aliqui enim stat
tim quum deceptæ sunt vine, aquam maris
D d ij

DIOSCORIDIS

admiscent. Alij in area vuas sole seccant: quibus calcatis, marinam adiiciunt. Alij passas prius vuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quae tamen austiore gustu temperantur, contra februm aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint. aluum subducunt: prosunt purulentis extusis, aut si dura aluus exerceat. Quae ex Amineis vuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatus creant. Verum quo plenior habeatur historia, is, qui, huius studio tenentur, non inutile existimamus variis vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quaedam ex his factitia, minoris curae ac impendij, quae cadunt in vsus: uti quae ex cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. Cap. XVIII.

CYdonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo sciuntur, et duodecim minarum pondo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumque adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteriae, hepaticis

renum vitij, et vrinæ difficultati. Melomeli, quod
 & cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mala fe-
 minibus suis castrata, in quàm plurimum mellis,
 quo penitus demersa contegantur, coniunguntur: id
 post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat
 eadem, quæ superior compositio.

Hydromelum. Cap. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ,
 et sub Caniculæ sydius insolatæ, additis ad unā
 melomelitis factis ex cotoneis. Vis huius eadē est.

Omphacomelites. Cap. XX.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acer-
 bæ uuæ adhuc immature, & tribus diebus
 insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes
 mellis optimi despumati singule partes adijciun-
 tur, & insolatur in uasa transfusum. Vim repri-
 mēdi ac refrigerādi habet: stomachicis cœliacisq;
 conuenit. Vsus post annum est.

Apijtes. Cap. XXI.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, uinum,
 Apijtes nomine sed ita ut pyra non magnopere
 maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, si-
 mili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba
 sunt, & adstringunt: stomacho utilia sunt, atque
 intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. Cap. XXII.

Fit è seraci uite syluestri, quod uocatur cenan-
 thinum: Sicci flores minis duabus musti ca-

D d iij

DIOSCORIDIS

do macerati: post triginta dies mutatur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatē, cibi fastidia, cœliacos, & dysentericos.

Rhœtes. Cap. XXIII.

FIt ē punicis malis maturis quod rhœten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocāt, ac decocti ad tertius, & ita reposito: Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuio exortam: Stomacho utile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites. Cap. XXIIII.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tussarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defacatum uinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli uocant, quod arteria scabritijs conuenit.

Myrtites. Cap. XXV.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem exceßerint, tussis, & organo expressis. Alii qui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aque heminas adiiciunt, & uini ueteris parendo modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

re adstringit stomacho vtile, fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas vlcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites.

Cap. XXVI.

MYrsinites sic temperatur: Rami nigre myrti cum suis baccis & folijs tusi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs seruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra fursures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

Cap. CXXVII.

Lentiscinum similiter vt myrsinites temperatur: nec secus terebinthinum. Nanq; bacciferi eorum rami sumi debent: Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicæ, & stomachi, & sanguinis profluvio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ ac sedis in seissione cohibent.

Palmeum vinum. Cap. XXVIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydeas, in vrceolum imo pertusum, & obstructū picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatū, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq;

DIOSCORIDIS

cōgios infudisse satis est: post decē dies detractō ab arundine linteo assumito vinū crassū et dulce, et reposito. Suave illud quidē, sed capiti noxiū: contra fluxiones, propter adstrictoriā vim, efficax: stomachicis, coeliacis, sanguinē expuentibus cōuenit. Aliqui idē addita aqua iterū capūt, et tertio, quarto, quinto, sextoque, faciūt: quod tandē acore viuiatur.

Catorchites. Cap. XXIX.

CAtorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum. sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem humoris adiungunt, in quo recēter pressa vinacea maduerint. Caricæ, quæ chelidonie aut phœniceæ appellantur, præsertim nigra, macerantur, uti diximus, & post decē dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aquæ, in qua vinacea maduerint, infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorē contrahit, & aciei vsum præbet. Id tenue est: flatu gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit: aluo tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactis vbertatē facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio, quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris, decē salis sextarios adiungunt. Alij murie amphoram: quod nō facile vitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymū & foeniculū imo subiungunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è sy

comoris eodem modo vinum, sed in acetū acre degenerat: quoniam non ita præualet vis eorū, vt flentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. Cap. XXX.

Resinatum vinū populatim factitari solet: copiosum in Galatia: quoniam vinū illic coalescat, vva non maturescente, ob cœli algore, nisi picea resina temperetur. Resina aut cum cortice turditur, et amphoræ dimidiata hemina permiscetur. Aliqui, vbi efferbuit, excolant, separantes resinā: alij relinquunt. Hæc vina vetustate dulcescunt. Omnia capitis dolore, & vertigines faciunt: concoctionem tamen adiuvant, & urinā cient: tussientibus, ac destillatione vexatis conueniunt: itē cœliacis, dysentericis, et hydropicis, et fœminis fluxione vulvæ laborantibus: altis exulcerationibus infunditur. In hoc aut genere nigricans magis albo constringit.

Strobilites. Cap. XXXI.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisq; præbetq; resinati effectus. Si quis madesactas nucas pini musto decoquat: potū affatim cōuenit ijs, qui tabitudine cōficiuntur.

Cedrinum vinum. Cap. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt, aut Soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet, vti consudent, congioq; vini minam vnā permisc

DIOSCORIDIS

scere, & post duos menses transfundere, & antea
quàm recondantur, in solare. Factitiorum vinorum
vasa impleri debent: nanque non plenis vasis, vina
in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina,
rectè valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt,
urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen
vehementius excalfacit. Fit quoque è fructu cedri
maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum bac-
carum selibra: diebus quadraginta in solari debet,
& defecatum in vasa transferri.

Fit etià vinum è baccis iuniperi, non aliter quàm
cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo
fit: Cedrià dulci aqua lavant, & singulas ampho-
ras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent.
Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussi antiquæ
utile sine febre, pectoris laterumq; doloribus, tormi-
nibus ventris, & interaneorum ulceribus, purulentis
excreationibus, mulieribus vulvæ causarijs, hydro-
picijsq; facit adversus ventris tineas & horrores:
contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat:
aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. Cap. XXXIII.

Picatum ex liquida pice et musto temperatur.
Picem aut primum marina aut muria tantis-
sper eluere oportet, dum in albuerit, & syncera ma-
ris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: cōgijs
octo musti, uncia picis una aut altera adiicitur:
ubi efferbuerit, & constiterit, in vasa diffunditur.

Hoc genus vini excalfacit, cōcoquit, purgat, abster-
git: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis et
iulue, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exul-
cerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs,
cōcoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præ-
sertim in succida lana impositum.

Absynthites. Cap. XXXIIII.

Absynthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enī
duodequingenta sextarijs Italicarū am-
phorarum, admistā absynthij Pontici libram deco-
quunt ad tertias: et vbi infuderint sex aceti sexta-
rios, & absynthij sēlibrā, ac diligenter permiscue-
rint, diffundunt in vas: dumq; conqueuerit, defæ-
cant. Alij absynthij minā in amphorā demittunt,
tusamq; & raro linteo deligatā, in cado musti ma-
cerant, binis mensibus. Alij absynthij quadrantē,
alij trientē, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ,
floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singu-
los sextantes inijciunt in metretrā musti, & tun-
dentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis,
ternisue mensibus dimittunt: postea defæcatum vi-
num transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti
cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, et
absynthij drachmas quadraginta, linteo inuolu-
tas: & post quadragesimum diem elutriāt. Alij in
senos sextaros musti, absynthij librā, & siccæ pi-
ni resinæ sextantem immittunt, & post decē dies
excolant, & recōdunt. Vtile est stomacho: vrinam

DIOSCORIDIS

cit: tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitij auxiliatur: fastidia discutit: ijs prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam precordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; ventris tineas, & remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quæ plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites. Cap. XXXV.

HYssopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur, fitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti cõiecta, linteolo raro cū quibusdam lapillis, folia involuuntur, vt degravatus pondusculo fasciculus sidat: vinū post quadraginta dies defecatū elutriatur. Contra pectoris, laterū, & pulmonis vitia, veterē tussim, & suspiria prodest: urinam cit, torminibus, & horroribus febrīū circuitu repetētibus auxiliatur: menses movet.

Ex diuersis plantis factis.

Cap. XXXVI.

Simili modo chamaedrytes fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vulue inflationibus, tarde cõcoctioni incipienti aque inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stœchadites nō secus temperatur. Congijs sex, stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes laterum, nervorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè datur, cum pyrethro

& sagapeno. Fit ad eadem acetū ē stœchade her-
 ba, vt paulò antè diximus, aceto macerata, quod
 eosdem implet effectus. Fit vinum ē betonica, quā
 cestron psychotrophon appellant. Herbam semine
 maturo pregnantem, cum suis ramulis minae pon-
 do, congys duabus vini macerant, & post septi-
 mum mensem transfundunt. Ad multa intera-
 neorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vni-
 uersum dicatur, factitia vina, sibi misturam vires
 adsciscunt: quare non difficile fuerit ijs, qui illa-
 rum naturas norint, vinorum vires cōiectura qua-
 dam consequi: veruntamen vinorum vsus febrici-
 tantibus abdicandus. Fit etiamnum ē betonica ace-
 tum, ad eadem vitia vtile. Tragoriganites fit
 quaternis tragorigani drachmis linteolo colliga-
 tis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post
 tertium mensem transfusis. Prodest torminibus,
 vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursu-
 sationi, egris concoctionibus. E napi fit vinum, no-
 mine bunites, drachmis duabus tusi napi in sexta-
 rios duos musti additis, & cæteris eodem modo fa-
 ctis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut lon-
 go equitatu fatigatis. Dictamni drachmas qua-
 tuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit ad-
 uersus stomachi fastidia: menses, & purgamen-
 tum à partu subducit. Marrubij adulti folia tun-
 dito, & sextarios octo in musti metretam demit-
 tito, & reliqua consimiliter facito. Couuenit hoc

DIOSCORIDIS

vinum pectoris vitis, & omnibus, quibus maribus
bium. Thymi tusi & cribrati uncias centū linteis
colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet con-
tra aegras coctiones, fastidia, dysenteriam, nervorum
& precordiorum dolores, hybernos algores, & ve-
nenata animalia, quorum morsum frigus insequi-
tur, aut putrescit locus. Simili modo est satureia vi-
nū fit, quod eadem quae thymites praestat. Sic quoque
origanites ex heracleotico origano conficitur cum
supradicto. Facit eadem quae thymites. E calamin-
tha, pulegio, & abrotono vina sunt eodem quo thy-
mites modo prosunt stomachicis, cibū fastidientibus,
et regio morbo: quod urinā moveant. Fit itē est
conyza vinū, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites. Cap. XXXVII.

Aromaticis ita fit: Palmae, aspalathi, calami,
nardi gallici, singulorum quatuor sextarios su-
mito: postquam contriueris, passo subigito, coactis
ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri
musti deiectis, operculato vase, quadraginta die-
bus quiescere sinito: deinde ubi saepe expurgatum
fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, plu-
drachmae septem, costi drachmae duae, nardi Syriae
drachmae sex, cassiae uncia, croci drachmae qua-
tuor, amomi drachmae quinque, asari drachmae qua-
tuor: omnia simul trita & linteis colligata in ca-
dum musti demerguntur, & postquam vinū defer-
buerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & late-
rum,

rum, & pulmonis dolores: difficile vrinae, horribus, retardatis mēſibus, atq; ū, qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita craſſitiem extenuat: colorem alit, ſomnum cōciliat, dolorem finit, renum & veſicæ vitijs auxiliatur.

Ex diuerſis odoramentis facta.

Cap. XXXVIII.

FIt & vinum ad deſtillationes, cruditates, tuſſim, inflationes, et ſi humor in ſtomacho cōiſt: Myrrhæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ ſex, aniſi drachmæ tres: omnia plenius tuſa & linteolo inuoluta in ſex vini ſextarios cōiūciuntur: vinum poſt tridū colatur, & in lagenā reconditur. Datur poſt deambulationem, meraculum, cyathi vnius meſura. Fit quoq; nectarites ex helenio herba: Radice ſicca pondo quinq; drachmarum linteolo colligata, & in congios ſex muſti addita, & poſt tres meſes effuſa. Facit ad ſtomachi et pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; vinū factitatur, hac ratione: Singulorum ſelibra in binos muſti congios mittito, poſt meſes duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinū efficax eſt contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinae difficultatem: prodeſt ſtomachicis, atque ūs quos pallor decolorat. Alij vnciā, aut ſextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem, in muſti amphoram adiūciunt. Aſari quadran

E c

DIOSCORIDIS

tem in senos musti sextarios itidem demittito. Id uini genus urinam ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radicis syluestris nardi recentis & tritæ cribrateq; bessẽm, in congiũ musti coniũcito, duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urina, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis factis.

Cap. XXXIX.

Radicis dauci cõtuse drachmas sex in musti amphoram imposito, et similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ menses pellit, rucl us ciet, et urinam: prodest tussi, ruptis, vulsiq; Saluie vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti coniugium mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsi, cõtufis, ortopnoæ: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mēsi bus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vri-

nam mouent. Seminis apij recentis, maturi & cribrati vncie nouem in linteo colligatæ in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat stomachicis, et difficili urine auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex fœniculo, anetho, & petroselino, uina eodẽ modo sunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore salis uinum, multo ad purgandum efficacius, quàm uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicæ, renes, & stomachum infestat: quare neq; in secunda, neque aduersa ualetudine prodest. Fit etiam uinum quod phthorion uocant, quoniam partus necat, et abortus facit: veratro, aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitiũ sato: siquidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Ad uinũ partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè uouerunt, cyathorum octo mensura, dilutũ. Ramorum thymelææ cum suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congius tres musti, & leui igne coquito, donec cõgiũ duo supersint, defecatũq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absunit. Chamælea dum floret, cum folijs tusa et cribrata decem drachmarum pondere, in musti cõgiũ additur. Post duos menses uinũ in uas transfertur. Aquæ inter cutẽ, hepaticis, et lassitudine cõfractis, efficax est: itẽ mulieribus, q̃ à partu ægrè purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadẽ conueniens: urinam quoque ciet. Librum radice mandragoræ concidito, segmenta lino traicito,

E e ij

DIOSCORIDIS

quod selibram æquat in musti cadum demittito, ibiq; esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Media potio, hemine dimidium, bibitur, passo in duplū addito. Aiunt heminam vini congio mistā, potu soporem adferre: cyathus vnus cum sextario vini potus, enecat: mediocris usus eius, doloris sensum aufert: fluxiones inerasat: olfactu, potuq; & cum inditur, idem præstat. In cōgium musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri triti in linteo mundo, mittito: dumq; efferbuerit, in marine aque congios quatuordecim aut quindecim, ubi pleniuscule fregeris, inijcito: post aliquot dies colato, & utitor. Dato cyathū unum ex aqua balnei in potu, ad aluū soluendam, ijs qui euomuerunt à cœna. Alia ratio: Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, spice Syriacæ uncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in septem uini Coi sextarios diebus quadraginta macerandas indito, postmodū colato: dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decocte marine aque ex alto petite sextarios duodecim, veratri cālidī libras sex, in musti amphora quadragesimo die, quāmadefeceris, colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas, in senis musti sextarijs diebus quinisdenis macerato, mox colato & semestri exacto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uinas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet

autem metreta cōgios duodecim) & gypsum in uinum mittito ponilo drachmarum uiginti, et biduo residere finito, conūcito ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorū drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos et trientem, myrrhae & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas tres aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu foeminas: foetus extrahit, contra strangulatus uuluae efficax. Scammonites sic fit: Radicis scammoniae per messes effosse, trite, & linteo colligatae drachmas quinque in musti congium mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primūm

Cadmia. Cap. XL.

EX cadmiae generibus optima est Cypria, bostryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatē magis declinans, racemosa facie, colore spodiū, quae fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, iuentatis uenarū discursibus, onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt, quae è ueteribus metallis effodiuntur. Quaedam etiam placodes, id est, crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi xonis cincta, ob quod eam xonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quae testaceam faciem habet, terram amplexa

E e iij

DIOSCORIDIS

est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis
botryitis nomine, & onychitis, vtilis: reliquæ ad
emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis
insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Mace-
donia uero, Thracia, & Hispania delatæ impro-
bantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua exple-
re, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus in-
farcire, excrementa in carne coercere, crustas crea-
re, & ulcera, quæ cacoethe uocantur, ad cicatricem
perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus
cādente, fuligine egesta flatu, & lateribus came-
risq; fornacum inherente. Prægrandes autē ac fer-
reæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per
summa fastigia conuexæ & cōcameratæ, ut quæ
ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, et
inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in cor-
pus concrescunt, & modo genus unum eius, modo
duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia
in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato la-
pide, cui pyritæ cognomen est. in quo etiam monte
quædam quasi uenæ chalcitis, misyos, foreos, melæ-
terie, cœrulei, chrysocollæ, atramēti sutorij, diphry-
gisq; inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in la-
pidum fodinis inueniri tradant, falsi quædam lapi-
di cognatione. qualis inuenitur & apud Cumas
lapis, nullam sui uim ostendens. Si eo deprehendun-
tur, quod sunt cadmia leuiore, nullumq; alienum
mandentibus saporem exhibent. commanducatus.

item lapis dentes offendit: cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, proflit, & fumum igni similem eiaculatur: cadmia vero quieta manet, fuliginemque luteo colore aut aereo splendentem expuit, uario sonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda aeraria. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguatur uino Amineo, quae ad emplastra preparatur: sed quae ad psoriarum medicamenta preparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumque fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur: iterumque tritam ex uino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiae retinens: hac spodij vice utuntur. Lauatur aut in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

Cap. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & ple-

E e iij

DIOSCORIDIS

runque ponderosior est, palearum pilorumq; plena,
quasi purgamentum quoddam, quod ab arariorū
officinarum pavimentis & fornacibus euerritur:
pōpholyx uero pinguis est, & candida, usque adeo
levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerūt
genera: unum ad aeris colorem uergens, subpingue:
alterum magnopere candidum, summamq; leuita-
tem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in
perficiundo ære fabri præstantiorem facere uolen-
tes, detritam cadmiam cumulatiuis insparserint.
Nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pom-
pholygen coit. Ceterum pompholyx nō ex æris mo-
do materia, et fabrili industria factitatur, sed ex
cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximiè folli-
bus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In do-
mo gemina cōtignatiōe operta, fornax extruitur,
iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à
supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci
proximus, tenui foramine ad fornacem usque per-
foretur, ad excipiendam folliis narem: ostium me-
diocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabri-
catum: domuncula altera huic cōiuncta sit, in qua
& folles, & flator suo munere fungatur: deinde
carbonibus in camino succensis, assidens artifex
cadmiam particulatim fractā inspargit, à locis su-
pra infurnibulū extructis: idem negotium obit in-
fernè artificis minister, simulq; carbones adiicit,
usque dum indita cadmie copia prorsus absumat

tur. Itaq; egesta suffitu tenuis pars, & levis mate-
 riæ in summā domum euolat, et parietibus, tectis,
 fornicisq; adhærescit. cōflatum aut inde corpus, in-
 ter initia erūpentibus, aquarum bullis simile pro-
 dit, postea maius incrementum capeffens, glomuscu-
 lis uellerum simile redditur. Ponderosius autem in
 ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur,
 illud domus pauimento cohæret. Quod tenuiore
 deterius existimandū est, ideo quòd multū terre
 collegerit, & spurcitia in acervatione refertur.
 Sunt qui hoc modo tantū fieri spodium arbitran-
 tur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cys-
 pria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colo-
 re aliquantū piceo, sapore cœni horrido: & si fra-
 dem non experta, flagranti carbone inferuescit,
 aereum colorem contrahit. Antedictis aut notis di-
 ligenter attēdendum est. Siquidē à nonnullis adul-
 teratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut mari-
 no, aut crematis grossis, et quibusdā consimilibus.
 quod facilè cognitu fuerit, quippe nihil in ijs pro-
 bādis inuenietur eorum quæ antè dicta sunt. Pom-
 pholygem in commune ita lauari oportet: Ligatā
 linteo mundo modicēq; raro, aut siccam, aut aqua
 respersam, in labellū demittito, quod imbrem conti-
 neat, & huc atq; illud fasciculū deferens, immer-
 gito: ita enim limosa pars eius ac utilis, effluet, &
 omne sedimentū in linteolo remanebit. Postea resi-
 dere sinens, aquā cum cinere colis incernito, & no-

DIOSCORIDIS

nam infundens, agitato, & effundito: mutata tan-
 tisper aqua, et colata, dum arenosi nihil fidat. De-
 mum aquam exprimito, & siccatum cinerem re-
 condito. Alij quantũ maximè fieri potest, siccant,
 & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassa
 mentum imitetur: deinde luteo faucibus excepturi
 uasis obteto, aut laxius illigato, colant, & quò fa-
 cilius transeat, infusa per linteum largiore aqua,
 cinerem conturbant: mox spumofum, quod traie-
 ctum est, & supernatat uasi, concha excipiunt, et
 fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit,
 sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, reli-
 ctò arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa si-
 dere patiuntur, & in uas aliud excolant: hoc idem
 iidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers
 inueniatur. Alij paulatim integram in aqua re-
 spargunt, arbitrati arenas lapillosq; suo ponduscu-
 lo degrauates, pessum ire: pilos aut & paleas leui-
 tate sua in sublime attolli. Ceterum cinerem me-
 dium separant, & in pilam coniectũ, ut cadmiã,
 eluunt. Quineliã lauatur uino Chio marina aqua
 diluto, modis, quos suprã diximus: & ita redditur
 adstringetior, quàm aquis elota. Vis pompholygis
 adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstrue-
 re, & aliquantum exiccare. Inter medicamẽta nu-
 meratur, quæ leniter crustas obducunt. Quod si spo-
 dion torrere libet, diligentior tritam, & irrigatam
 aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis le-

LIBER QVINTVS: 222

uibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum as-
 siccati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argē-
 to, plumboq; fieri spodion: uerum post Cyprium,
 plumbeum maxime commendatur. Quoniam spo-
 dios saepenumero desideratur, necesse est ostendere,
 quae simili uirtute polleant, ut in spodij locum suf-
 fici possint, antispodia uocāt, quoq; modo sumi de-
 beant. Folia itaque myrti, cum floribus, & baccis
 immaturis, in fictile crudum coniecta, indito oper-
 culo continua foramina habente, uruntur fornaci-
 bus, donec siglinum percoquatur: iterum in fictile
 aliud crudum transferuntur, quod ubi perassatum
 fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoque fit
 ē termite syluestris oliuae, si habeatur: sin secus, sa-
 tiuae cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis,
 & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis lin-
 teolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in
 sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco,
 ænanthe, aut mollibus rubi folijs, uel ē buxi coma,
 uel pseudocypereo cum flore. Alij ficulnea frondes in
 sole antea siccatas, eodem modo parant: alij tauri-
 nū gluten: alij succi, las lanas asperas, pice aut mel-
 le irrigatas, quae omnia in spodij uicē usurpātur.

Aes ustum.

Cap. XLII.

AEs ustum probatur rubrum, & quod con-
 tritu colore cinnabarim imitetur: nigrum
 uero plusquam deceat exustum est. Fit autem ē
 clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis &

DIOSCORIDIS

subperso sulphure cū sale pari, omnibus uicissim
insparsis, fictile circumlito figulari creta spiramen-
to, fornacibus inditur, donec figlinū percoquatur.
Quidam pro sulphure & sale alumen inspargūt.
Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt.
Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excu-
tiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphu-
re & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla
aceto respersos urunt, & iterum ac tertio idem ef-
ficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet,
in Memphide combustum: proximum in Cypro. Ad-
stringit, exiccat, reprimit, extenuat, attrahit: ulce-
ra purgat, & ad cicatricem perducit: uitia oculo-
rum emendat, excrementa in carne consumit, no-
mas cohibet, uomitus ciet, cum hydromelite potū,
aut cū melle delinctum, illitūmue. Lauatur ut cad-
mia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus
sordes emergat. Aeris recrementum, stercūsue quā
scoriam uocant, eodem modo lauatur: & eandem
uim, sed imbecillio rem, habet.

Flos æris.

Cap. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum ueterū p sege-
ma, quasi resegmentum aut segmentum, nomina-
runt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, mi-
lū effigie, & numero, breuis, ponderosus, modicè
splendens, atq; constringens, qui delinatam æris
scobem nō recepit, qua sepe adulteratur. Sed id fa-
cile deprehenditur, cū dentium illisu dilatantur ra-

menta. Fit autem, cum æs fornacibus fusum, in receptacula delabatur, per cola fistularum ad ea pertinentium: tum huic negotio addicti ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt. refrigerandi proposito: itaq; repentino concretu, ac addensatione, uelut expuitur, & erumpit antedictus flos. Adstringit & excrescentia coerct: offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit: carnosæ narium & sedis uitia absomit. eruptiones papularum cum uino cohibet. Candidus contra diurnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulā flatu impellitur: uiam, tonsillasq; reprimit, farina eius cū melle admota.

Squamma æris. Cap. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cyprijs officinarū clauis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est clauaris, nominatur, sed ex uili promiscuoq; ære, aut candido, uitiosa intelligitur: quam utpote tenuem, et inuolidam damnamus, maximè approbantes crassam, rufam præsertim si aceti respersu æruginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coerct, ulcera ad cicatricem perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorū medicamenta, quòd genarum scabritiam absomit, et fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: Sicce æris

DIOSCORIDIS

squamma expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pessū ierit: abijcitur quod subsidit et effusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi destringenda sit, vehementer confricatur: dumq; lēto rem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo valide: squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur: quo factō, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamēta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernant, & linteo apertum biduo cōquiescere sinitur, effusaq; extante aqua, ubi siccatum erit, recōditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, & reponūt. Squammæ ex acie aut mucronibus decussæ, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad molendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis. Cap. XLV.

Aerugo rafa sit his modis: In cadū, aut aliud consimile uas acetum quàm acerrimum infunditur. superponitur inde inuersum æneum uas, præsertim concameratum: sin minus, planū: sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum: exempto, quo doliolū obturaueris, operculo, decimū post diem insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in

LIBER QUINTVS. 224

cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidē post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una plurē sue, uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiam ex delimata æris scobe æruginē facere licet, necnon è laminis, quibus bractee auri conclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidē, & boni coloris, sed uitiosam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterāt. aliqui pumice admisto, alij marmore, alij tramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistræ manus madefacto, æruginis pontunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin & dentiū appressu, si quidem sincera cedit, leuis, & sine asperitate. Atramentum uero sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atramentum sutorium

DIOSCORIDIS

acceperit: quod id uſtum ſuapte natura talem ſortitur colorem. Aeruginis, quam uocant ſcoleciam, duo ſunt genera: quedam foſſilis eſt, altera factitia ad hunc modum. In mortario Cyprj æris dimidiam heminā aceti albi acrisq; piſtillo cupreo conterito, donec ſtrigmenti craſſitudinē imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum ſalis foſſitij, tranſlucētis, aut marini quā albiſſimi, ſolidiq; , aut certē cum nitri pari pondere terito in ſole, æſtuoſiſſimis diebus, ſub ſyduſ Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat, et concretu ſtrigmentuſum fiat: ubi autem ſe in uermiculorū Rhodiæ ſimilium ſpeciem coegerit, recondito. Efficax & ualde boni coloris redditur, ſi duas partes urinae ueteris cum una aceti adicceris, & alia, quæ dicta ſunt, perageris. Sunt qui æruginem raſilē, quæ in apparatu non reſpondit, gummi miſto digerant in formas, & ita uendant: quod genus, ut uitiuſum, improbaturi. Fit & quedam ærugo ab aurificibus, mortario & piſtillo Cyprj æris, cū urina pueris impubis, qua aurum ferrumināt. Antedicta æruginem genera, uſto æri omnino reſpondent, ſed magis effectu ualēt. Sciendum foſſilem ſcoleciam præſtantiſſimam eſſe: deraſam ſequi: poſtremo loco factitiam. Mordaciſſima tamen eſt hæc, & magis adſtringens. Aurificum autem ærugo raſe reſpondet. Aerugines omnes adſtringunt, extenuāt, excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lacrymas

erymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cum melle coctæ. callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ. Ad gingivarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illite: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ, cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quancunque velis, minutissimè fracta comminutaq; in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturque donec se mutet, & colorem cinereum cōcipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eā vrant, vti dictū est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. Cap. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit foeminarum profluvia, admota, potūque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquā utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterigia: condylomatis prodest, gengivas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquæue, in qua cadens ferrum sit restinctum, potu cœliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadem post quæ rubigo, sed ineffica-

Ff

DIOSCORIDIS

cins. Aconito, ex aceto mulso potum, capitulatur.

Plumbum elotum. Cap. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aqua superfundens, quò facilius quicquid est resolutum incerni possit. Hoc iter facito, usquedum satis tibi habuisse videatur. Vbi confederit, priore aqua effusa, novam adiciens, ut cadmiā lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quaesita, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam tritum vehementer, cerussa, simile redditur. Alij elimatae scobi modicā, plumbaginem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbū præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire explere cana, sistere oculorum fluxiones, et vlcera excrementia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vlcera, condylomata, & hemorrhoidas, ex rosaceo: itē ad ea, quæ agrè cicatricem ducunt: et in totū spodij effectus præbet, nisi quòd nō obducit crustas. Syncerum plumbum affrictu, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

V Plumbum vstū. Cap. XLVIII.
Ritur plumbum sic: Super quam tenuissimā

mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interie-
 cto semper sulphure, vsquedũ vas expleueris, suc-
 cendit o flagrante autẽ plumbo, ferrea rude versa-
 to, donec perfectẽ redigatur in cinerem, nihilq; è
 plumbo non vstũ hæserit: tum demum, obstructis
 naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius
 sentitur: Aut elimatam plumbi scobem in olla sul-
 phure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictũ
 est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes
 operculũ, dato exili spiramento, vrunt. Alij pro sul-
 phure cerussam aut hordeum inspargunt. Alij inte-
 gras laminas imponentes, acri igne vtuntur, et ru-
 dicula ferrea continuẽ mouent, dum in cinerem sol-
 uantur. Sed difficilis huiusmodi vstio: & si vehe-
 mentius vratur, contrahit spumæ argenti colorẽ.
 Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plũ-
 bum vstum lauatur vt cadmia, & reconditur.
 Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed
 multo acriores. Recrementum plumbi, quod scoriã
 vocant, optimum est, densum, fractu contumax, ce-
 russam planè representans, nihil plumbosi habẽs,
 quod a luteum calorem accedit, & vitri splendo-
 rem imitatur. Eadem, quæ plumbum exustum, pos-
 test sed magis adstringit. Lauatur in mortariis in-
 fusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lu-
 teum colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-
 tum absumatur. Dein vbi confederit crassamen-

E f q̃

DIOSCORIDIS

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentē recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

Cap. XLIX.

Stimmi optimum, quod splendidissimū est, modoq; nitidularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellarūt, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricē perducere, sordes & vlcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & ut in vniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erūpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, non cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exēptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulo magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, vt cadmia & æs. Sunt qui vt plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. Cap. L.

Molybdæna optima est flaua, argentea spuma emula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Vis

tiosa est, quæ aerem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur lauatque eodem modo. Miscetur convenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. Cap. LI.

Recrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæna vim habet: quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatque.

Spuma argenti. Cap. LII.

Spuma argenti quædam gignitur ex arena, quam molybdeum vocant, in fornacibus conflata, donec perfectè igni incandescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: hæc sequitur quæ fit Dicearchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argen-

Ff ij

DIOSCORIDIS

to, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, exple-
re caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatri-
cem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argen-
ti spuma, confractis partibus ad magnitudinem in-
glandium, prunae superpositis: ita accensa foliis,
ut conflagret: aliter tergitur insidens spurcitia, & re-
conditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguentes,
rursus vrunt, & eadem prosequuti reponunt. La-
uatur ut cadmia. Ut argyritidi nominatae, aut, si
desideretur, alteri calor detur, ea in parteis magni-
tudine fabarum confracta, chœnicis Atticæ mensu-
ra, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi triti-
ci pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo
puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, donec
hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum
craterem oris ampli transfunduntur: triticum ob-
uicitur, spuma argenti vehementer manibus affri-
cando infusa aqua lauatur, assiccataq; in Thebai-
co mortario teritur, affusa feruente aqua, donec so-
luta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teri-
tur, & vesperi infusa calida aqua sinitur: manè
colis excernitur, alia infunditur, atque ter die exco-
latur. Id septem diebus fieri solet: postea additis
ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis
fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die te-
ritur, & addita aqua excolatur, cumq; inalbuerit,
calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus sal-
sedinem resipiat. Demum ardētissimio sole siccata,

eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina
 spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale
 fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum cō-
 iicitur, aqua infunditur, ita vt superemineat: moue-
 tur quotidie mane & vespere, aquaq; superinfun-
 ditur, priore nequaquam effusa. Hoc fit triginta
 diebus: nanque nisi moueatur, crassescit, vsque in
 duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in
 Thebaico mortario spuma argenti teritur, conies-
 Etq; in fictile aquam continens, manibus diligen-
 ter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum
 salisuginis indicium præbeat. Deinde quod ex argē-
 ti spuma candidum apparet, in vas aliud transfer-
 tur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide con-
 datur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudi-
 nes cōfractam, in ventre suillo crudo ex aqua co-
 quunt, dum viscus eliquescent contabescat, exem-
 ptamq; cū sale pari terunt, & vt suprā dictū est,
 lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spumæ ar-
 genti tantundē, in sole terant, aqua continuè muta-
 ta, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantā
 vis argenti spumam: vbi lana candidula inuolueris,
 fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum rez-
 centium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ
 disruptæ dehiscant, lanaq; non denigretur, exēptā
 argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterū
 coquito, cyathū aquæ & parem fabarum modum
 adiiciens: eadē tertio, quæ suprā, facio. i. summa,

DIOSCORIDIS

rantissper, dum lana iam non inficiatur. Insuper
transfundens in mortarium, ad singulas salis fos-
sitij libras, adijcito octogenas spumæ argenti dra-
chmas Atticas, et terito: intermittēsq; nitri quā
albissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta
septem indito: iterum terito, donec satis candoris cō-
traxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto
in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi con-
sidere desierit, colato: tum novam superadijciens a-
quam, manibus probè versatā finito vt considat,
ac rursus per colum traicito. Alternis eadem prose-
quere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam
salsedinem præ se ferat. Postremò in fictile novū
translatam, colato sensim omni humore, Soli quaz-
draginta diebus sub Canicula sydus exponito, &
ficcata vtitur. Elotam autem constat ad oculorum
collyria prodesse, & ad cicatricem fœditates tollen-
das, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq;,
& macularum plenas.

Cerussa.

Cap. LIII.

Cerussa fit hoc modo. Infuso in vrceū oris
lati, aut fictile labellum quā acerrimo
aceto, laminam plumbeam supra fictilis
spiraculum, subiecta prius arūdinea tegete, firma-
to: superiectisq; velaminibus, ne halitum expiret
acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, hu-
more purū ad summa delatū colato, crassamētūq;
transfundito: debet quoque siccare in sole, mox tru-

satili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea
 quod superest duri, in tenues partes redigendum,
 cribrandumq; : vicissim eadem tertio quartoq; fa-
 cienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medica-
 mentis oculorū assumenda. Secundum locū tenet se-
 quēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt, qui ligneas
 rudes, in medio vase appendant, & derafo ceu situ
 imposito, ita vt acetum nō contingat, inditoq; oper-
 culo circumliuentes dimittunt. Post dies decem, la-
 xato obturamento visunt: cumq; resoluta materia
 fuerit, reliqua, vt supra diximus, exequuntur. Si
 autē quis in pastillos velit digerere, aceto acri sub-
 acta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur.
 Aestate tamen supra dictum opus obeundum est:
 ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiā
 hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut
 fornaces impositis ascendens enim calor, idē quod
 sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, et
 Corinthi, aut Lacedæmone, proximā Puteolis. Tor-
 retur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fi-
 stili nouo, maximè Attico, tritam cerussam impo-
 nito, & assidue uersato: cumq; cinereum colorem
 traxit, eximens refrigerato, & vtitor. Est & illud
 vrendi genus: Trita patinis nouis supra prunas
 imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec co-
 lore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus
 ministratur. Quæ vero ita parata est, sandyx à
 quibusdā dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo.

DIOSCORIDIS

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; insuper excrescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris, quæ liparæ vocantur, pastillisq; : est autē lethalis eius potus.

Chrysocola. Cap. LIIII.

Chrysocola laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm simillimè reddens. Secundum locum sibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricato, & statim quàm cōsederit, colato. Alteram infundens aquam, rursum terito: hæc vicissim prosequere, donec pura synce-raq; spectetur. Dem siccato in sole, & ad vsus rescondito. Quòd si vrere volueris, ex ea terēs quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones apponito, & alia facito, quæ suprà diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrescentē carnem coer- cet: adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones cōcitāt, et necē iſerre possunt.

Lapis Armenius. Cap. LV.

Armenius lapis præfertur leuis, colore cæruleo, perquā æquabilis, calculo carēs, & friabilis. Eadem quæ chrysocola præstat, sed inefficacius. Quinetiam vsus habet ad pilos in palpebris

alendos.

Cœruleus. Cap. LVI.

Cœrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro : copiosior ex arena litorali : secundum quosdā sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis, lavatur vt cadmia. Vim habet reprimentem, & modicē erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. Cap. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectorie dant officinae: & est spuma purpurea, innatans certinis, quam detrahit am artifices siccant. Optimū existimatur quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est, quæ leuiter adstringūt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, et reprimat vlcera.

Ochra. Cap. LVIII.

Ochra leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lavatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat, caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris. Cap. LIX.

Hallucinantur qui cinnabarim minio can-

DIOSCORIDIS

dem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantes halitus eructat: itaque facies incolæ vesicis obvelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aerem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris verò ex Aphrica deferatur, & magno constat: hætenus inuenitur, ut vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem: conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet, Ambustis igni, & pupularum eruptionibus, cerato excepta, medetur.

Argentum viuum. Cap. LX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt: si quidem deteresa fuligo, quæ calici insidet, refrigeratæ in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: si quidem aliam materiam

LIBER QUINTVS. 231

omnem excedit, & defluere facit. Potum uim perniciousalem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cum absynthio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origanum, uel hyssopum cum vino, auri limata scobs, id est, rametum quam tenuissimum epotum mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica. Cap. LXI.

Rubrica Sinopica maximè probatur grauis, densa, ad iocineris imaginem vergens, calculorum expers, cōcolor, cum diluitur, impendio fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataque: deferitur in Sinopem urbem, in qua venditur, unde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriā: quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs cōmisceri solet. Aluum sistit, in quo sumpta aut clystere infusa: datur iocineris uitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. Cap. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginiensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Lemnia terra. Cap. LXIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata è Lemno insula, palustri loco deferitur, inibi

DIOSCORIDIS

electa, et caprino sanguini permista: quam incolae cogunt in pastillos, et imagine caprae signant: unde & sphragida ego; hoc est sigillum caprae, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciosam venena singularem, pota cum vino, & praesumpta euomi venena cogit. Contra ictus morsusque animalium, quae exitiale virus ei aculantur, prodest. Antidotus familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur: est & dysenteriae utilis.

Atramentum sutorium. Cap. LXIII.

Atramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum: sed in specie differentias tres habet. Vnum namque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs, qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: atque stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione sit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capessit, quod pection, id est concretitium, proprie nominatur. Tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inutilissimum esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua madesactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, & complures formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quae racematim inter se cohaerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum, graue, concretum, translucent: cuiusmodi stillatitium.

est, ab alijs lonchoton nominatum. Proximum, cō-
cretitium. Coctile vero ad infectus & denigratio-
nes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad medi-
cina vsum inualidius esse, experimenta docent. Va-
let adstringere, calfacere, & crustas inducere: las-
tas ventris tineas necat, drachmæ pondere deuoras-
tum, aut cum melle linctum: vomitus ciet: aduersus
hausta fungorum venena, ex aqua potum aux-
iliatur: purgat caput, aqua dilutum, & in velle-
re naribus instillatum. Vritur, vt paulo post in mē-
tione chalcitis ostendemus.

Chalcitis.

Cap. LXV.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec la-
pidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblon-
gis venis, splendētibusq;. Huic abstersoria vis inest
excalfaciens, et crustas vlceribus obducēs: purgat
quæ oculis & eorundem anguis hærent. In genere
leuiter exedentium est. Ad ignem sacrum, & vlce-
ra quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, et
naribus erumpentem, cum succo porri sistit: gingi-
narum vitia, depascentia vlcera, tonsillasq;, eius
farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculo-
rum medicamentis longè utilior redditur. Callum
genarum, & scabritiam absomit, abstergetq;. Fi-
stulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chal-
cite medicamentum quod psoricon vocant, duabus
eius partibus, cum vna Cadmiæ additis, et ex ace-
to tritū. Oportet aut in fictili obruere fimo, diebus

DIOSCORIDIS

quadraginta, per Caniculæ ardores. sic enim fit acrius. Idem, quod chalcitis, potest. Alij pares utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desiderit, & perfecte inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum & miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiam per flatis carbonibus, vsquedum luteo colore palleascit: aut fictili subditis cadentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

Cap. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multo suprascripto inferius.

Melanteria.

Cap. LXVII.

Melanteria gemine est originis: quedam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concrevit. Alia vero in summa facie suprascriptorum

facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdã regionibus, fossilis quedam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticã eam obtinet, quàm & misy.

Sory.

Cap. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melanteriam esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, ei non absimile: verum sorci virus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdã regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptum, quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum virus olens, ita vt stomachus in uomitione effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inuolidum censendum est. Vim & uestionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex uino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hec autem ferè omnia, & alia, quæ uestionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur: præter salem, & uini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Coma

G g

DIOSCORIDIS

buſta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges. Cap. LXIX.

Diphrygis tria genera eſſe creduntur. Quo ddā enim metallicum eſt, quod in Cyprio ſola gignitur: lutoſum nanque extrahitur ex luto cuiusdā inibi ſpecus: extractū, ſole ſiccatur, mox circumpoſitis ſarmentis vritur. Diphryges ideo vocatū eſt, quod & à ſole, & à ſarmentis vritur, areſcat, et ferme torreatur. Alterum perfecti aeris, quaſi ſubſiſdens fax eſt: ſiquidem poſt frigida aque offuſionem, vt ſuprà retulimus, cū de flore aeris diſſerereamus, ſublato are, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adſtrictionem & guſtum aeris habens. Tertium ſic fit: Lapidem pyriten, vt calcem multos dies cremant in camino. cumq; colorē rubricæ contraxerit, eximentes recondant. Quidā tradunt hoc ex ſola materia, quæ lapidem aeris gignit, fieri: quando in liſtis aeris aſſata, & in ſcrobis translata peruritur. Tunc enim ambiētē ſcrobis locum comprehendit, & exēptis lapidibus nihiſo minus inuenitur. Praefertur quod ſaporem aeris reddit, æruginisq; adſtringens, & vehemēter exiccans lingua. quod ſibi exuſta ochra non vendicat: quæ cremata, diphrygis vice venit. Viſ eius adſtringere, perpurgare, extergere, ſiccare, excreſcentia conſumere, vlcera ſerpentia, & quæ cacoethæ vocāt, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina aut cera o exceptum diſcutit.

Auripigmentum. Cap. LXX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimū existimatur cruciosum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vniū supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidū, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua viuis carbonibus subiectis, assiduūq; versatur, donec igne flagret & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. crustas cum vehementi vredine, & violēto morsu excitat: reprimat quæ excrescunt, et capillos euellit.

Sandaracha. Cap. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturator, & aliena materia vacans, friabilis, cinna-
baris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & ustio, quæ auripigmento: explet alopecias, resina excepta, & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad nariū orisq; vlcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusientibus. Suffitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, rapto per fistulam nido re vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis

G g ij

DIOSCORIDIS
cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen. Cap. LXXII.

OMne aluminis genus ferè in Aegypto, et in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli, Phrygia, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recēs, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulose aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Dānatur in rotundi genere, quod manu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundū, bullis turgens, albo propius, atq; validius adstringens, præterea nonnihil palloris cū quadā pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptiū, aut ex insula Melo. Liquidī probatio, ut sit limpidū, lacteū, æquale, & semper succo madēs, sine lapidibus, atq; quendā coloris igniculū expirās. Vim habent excalfaciēdi, stringēdi, & expurgādi, quæ caliginem pupillis

lorum offundunt: genarum carnem, ceterasq; ex-
 crescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius
 intelligitur. Vri & torreris chalcitidis modo debet.
 Putrescentia ulcera cōpescunt: sanguinis fluxiones
 inhibet, gingiuas humore pręgnantes cōprimunt:
 motus dentium cū aceto & melle firmat. Profunt
 cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum,
 & fluxionibus aurium, cum sanguinalis herbe
 succo: lepris cōueniunt cum brassicę folijs aut mel-
 le cocta: item pruritui, & unguium scabritijs, pre-
 rigijs, & pernionibus, aspersa cum aqua. Valēt cū
 aceto fece, & galla, pari pondere cremata, ad pha-
 gedenas ulcerum, & cum salis duabus partibus,
 ad vitia quę pascunt: fursures cum eruo & pice il-
 lita abstergunt: ad lendes, pediculos, ambusta, cum
 aqua illita auxilio sunt. Cōtra tumores, & graue
 alarū inguinumq; uirus, illinuntur. Ex Melo autē
 aduectum, mulieribus pręstat ne concipiant, ante
 coitum ori uulue inditū: partus quoque extrahit:
 gingiuas, si caro excreuit, uua ac tonsillis accōmo-
 datur: ori, auribus & uerendis cū melle illinuntur.

Sulphur. Cap. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod
 apyrō uocat, nitedule modo splendidū, perlu-
 cens, minimē lapidosum. Probat in gene-
 re sulphuris ignē experti, quod uirct, ac prępingue
 spectatur. Plurimū in Melo & Lipara gignitur.
 Supradictum sulphur calfacit, disciit, & cele-

G g ij

DIOSCORIDIS

riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, puru-
lenta extusis et tibus in uno sumptum, aut suffitum:
praeterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, liche-
nas, scabros ungues, cum resina terebinthina mis-
tum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras ef-
ficax est: vitiliginis tollit: scorpionis ictibus, addita
resina, medetur: cum aceto vero, draconis marini
scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore
erumpentes, cum nitro detersum, sedat: regium mor-
bum emendat, insparsum fronti cochlearis mensu-
ra, aut in sorbili uno sumptum. Facit ad grauedinem,
& destillationes: sudores quoque conspersum inhi-
bet: podagricis, cum aqua & nitro illitum, conducit
grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fu-
stulam hausto, sanat: lethargicos suffitu excitat:
erumpentem undecunque sanguinem sistit: contu-
sis auribus, cum vino & melle illitum medetur.

Pumex. Cap. LXXIIII.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongio-
sus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, &
candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus ob-
rutus, & ubi canduerit, extractus, vino restingui-
tur odorato: iterumque incensus extinguatur: & ter-
tia vstione exemptus, & per se refrigeratus, ad
usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abster-
gere: purgat cum calfactione, quae caliginem pu-
pillis offendunt: explet ulcera, & ad cicatricem
perducit: excrescentia cohibet. Fit ex farina eius den-

tificium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quisquam in bullientem uiceum vini pumicem iniecerit, foetorem statim sedari.

Sal.

Cap. LXXV.

SAL fossilis efficacior est, communiter, si est candidus, calculus vacans, & perspicuus, densus, & equali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, & equalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, et Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Africa. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phrygius nomine tapæus, aut triteus, aut gantæus. Salis natura in commune per quã utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quod alius alio sit præstator. Quin & à putredine uindicat. Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus. Excrescētia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit, ceterasq; carnis extuberationes tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur, doloresq; in sacis fotu mitigat, & pruritus sedat, ex oleo et aceto infriktus ad ignē, donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasq;. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: tonsillis uuxq;, cum melle tostus. Vlceribus in ore

Gg iiij

DIOSCORIDIS

manantibus, gingiuis, quas humor uexat, & phagedenis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origane, melle, hyssopo: aduersus cerosten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendrea morsus, cum melle & aceto: aduersus uestparum ictus, et teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo uitulino: furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in lineoleo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, et melle: anibustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, et ulcera quae serpunt, cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter operatus ne exiliat, conditusq; prunis, usquedum effervescat. Aliqui fossile subacto polline oblinunt, et carbonibus subijciunt, usquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, et siccatus in ollâ coopertâ mittitur, subdito igne, moueturq; , donec iam non exiliat. Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramē

tum est in exilibus petris inuentum, cui vis eadem
quæ sali.

Muria.

Cap. LXXVI.

Muria effectus salis præbet, abstergitq;:
dysentericis infunditur, etiamsi nomē
intestina corripit: & ischiadicis ueteri
bus. Ad fotus, aquæ marina usum præstat.

Flos salis.

Cap. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus ta-
men quibusdam innatat. Assumendus qui
crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. In-
terdum longè magis uirus olet, gustuq; mordacior,
& pinguitur lentus. Fucatus autem rubrica, aut
scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non ni-
si oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte,
etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad ulce-
ra, quæ cacoethe uocantur, & phagedenas, geniz-
talium nomas, & purulentas aureis, efficax est:
oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit.
Emplastris unguentisq; coloris causa, ut rosaceo,
miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in uino aut
aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur
acopis, & smegmatis, quæ albandi capilli gratia
componitur: & in uniuersum acris est, & feruenc-
tis nature, ut sal.

Nitrum.

Cap. LXXVIII.

Prefertur nitrum leue, roseo colore, aut can-
dido, in foramina dehiscens, perinde quasi

DIOSCORIDIS

spongiosum quiddam, quale ex Bumis affertur. Huc
 mores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri
 optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, co-
 lore pene purpureo, aut spumosa, & mordens: qua-
 lis ex Philadelphia Lydie defertur. Secunda est
 Aegyptia. Quin & in Magnesia Carie gignitur.
 Vim & vitionem salis habet, tam nitrum, quam
 spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tri-
 tum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sa-
 pa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt,
 ut ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus
 illinitur, ante suspectam accessionem. Misi etur em-
 plastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuât,
 & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida aut
 vino infusum, inflationes, purulentas aurcis, &
 sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum aceto
 instillatum. Canum morsibus ex asinino adipe aut
 suillo medetur: resine terebinthine admistum fur-
 runculos aperit: aque inter cutem cum fico illinitur:
 oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: &
 venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis
 momorderit, ex aqua: is vero, qui taurinum san-
 guinem biberint, ex la serpitio, usque: qui cibum non
 sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisque iam re-
 missionibus, & luxatis, cum cerato: in resolutione
 lingue, panis commode permiscetur. Aliqui supradi-
 cta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua,
 donec incandescant.

Eligenda fæx maxime à vino vetere, Italico :
 sin minus, ah alio consimili. Fæx aceti viribus
 longè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè dili-
 genter siccata. Sūt qui noua testā igni largo vrāt,
 vsque dum penitus incendatur. Alij viuis carboni-
 bus facis glebam obruunt, & idem opus proseguū-
 tur. Experimentum est legitime vstionis, vt aerio
 nitore inalbescat, linguamq; tactu vrere videatur.
 Eadem vrendæ facis aceti ratio. Vis ei supra modū
 vrens, & abstergens : vlcera ad cicatricem perdu-
 cit, adstringit, vehementer exest, siccataq; . Sed re-
 ti vtendum est, quoniam celeriter exanimatur: pro-
 inde non nisi in reconditorio, & vase aliquo repo-
 ni debet. Lauatur, vt pompholyx . Quæ vstionem
 experta non est, tumores & per sese, & cum myr-
 to cohibet: ventris stomachiq; fluxiones illita sistit:
 muliebri profluuium, imo ventri aut genitalibus
 imposita, mitigat: panos discutit, nondum exulcera-
 tos, & tubercula : rigentes mammas, suiq; lactis
 impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Crema-
 ta verò, vngues scabros cum resina aufert : addito
 lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elo-
 ta oculorum medicamentis, vt spodos, adijcitur: ci-
 catrices eorum & caligines eadem abstergit.

Calx uiua.

Cap. LXXX.

CAlx uiua hoc modo fit: Marinarum bucci-
 norum testas igni condito, aut feruenti cli-

DIOSCORIDIS

banc, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dū uehementer in albuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouum conq̃cito, & exactè pannis operiens, noctem unam conquiescere sinito: manè eam extrahens, ubi perfectò om̃ni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è uili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, mollit & dissipat: ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. LXXXI.

Gypsum uim habet astringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresq̃; cohibet: sed postum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis. Cap. LXXXII.

Sarmentorum cinis urendi uim habet: cum axungia autem uel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimat: serpentium canumq̃; moribus illitus ex aceto medetur: crustas obducētibz medicamētis admiscetur. Fit ex eo lixiuum contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

LIBER QVINTVS. 239
Alcyonium. Cap. LXXXIII.

Alcyoniū quinque esse genera compertum
est: vnum enim spissum, acerbi saporis,
spongiosa facie, item tetri odoris, pondero-
sum, et piscem olens, quod plurimum in litoribus
inuenitur. Alterum pinnula oculorum aut spōgie
simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens.
Tertium vermiculi forma, & colore magis purpu-
reum, quod Milesium quidam vocant. Quartum
succidis velleribus non dissimile, multis inanitati-
bus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore,
asperum, parte interna quodāmodo pumicosum, fo-
ris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta
insulam Beshicon appellatam gignitur, patrio no-
mine halos achnen vocant. Duo priora in scemina-
rum smegmata assumuntur, contra lentigines, li-
chenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in
facie reliquoq; corpore. Tertium ijs, qui difficili vrin-
a vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, ido-
neum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem,
lieni. Vñtum autem, & ex vino illitum, alopecias
replet. Postremum dealbandis dentibus aptū est:
in alia smegmata, psilothraq; assumitur, cum sale
mixtum. Si quisquam alcyonium cremare velit,
cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens vas-
sis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum fi-
glinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recon-
dat. Lauatur vt cadmia.

DIOSCORIDIS

Adarces. Cap. LXXXIII.

FIt in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta falsilago, humidis et palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asi similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lenigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiæ. Cap. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ cōtrarias dotes habent. Vritur ea ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæue conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustæ autem inuiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosq; laxant: siccæ recentes et vacuæ senilia ulcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, impoſitu ſiccant: sanguinis profluum sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum profluentem sanguinem sistit.

Candidæ cura fiunt, è molliſſimis recentes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris coheret: inſolantur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectante, & qua abſciſſæ fuerunt, deorſum. Si uerò æſtiua ſerenitate ad lunam ſternantur, perſuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Corallium. Cap. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinum eſſe fruticem conſtat, qui alto extractus, duratur ſtatim atque emergit, tanquam offuſo aere protinus concreſcat. Plurimum inuenitur ad Syracuſas, in promontorio cui Pachyno nomen eſt. Laudatiſſimum, rubens, colore antherici aut ſandycis ſaturatæ, nec ſecus terenti facile cedens, æquabili uſque quaque concremento, ruruſ alga aut ſuci marini odore, quàm ramiſſiſſimum, forma fruticis, cinnamomi emulum. Quod autem in lapidis duritiâ coit, ſcrupuloſum, inane, & lacunoſum, vitioſum exiſtimatur. Adſtringit, & refrigerat mediocriter: excreſcentia coerçet: oculorum cicatrices abſtergit: vlcerum caua, & cicatrices explet: contra ſanguinis reiectiones magnopere efficaciſſima eſt, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & polum ex aqua lienem abſumit. Quod antipathes uocât, coralliũ eſſe arbitrat, ſpecie tãtũ diſtans. Eſt autẽ colore nigro, arboris figura, ramiſſũ magis. Vires ſupradicti habet.

DIOSCORIDIS

Phrygius lapis. Cap. LXXXVII.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmētis, ut in cadmia. Vritur autem vino optimo persusus, viuisq; carbonibus obrutus, perflatur aßilue follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamen, ne minutim confringatur, et in foliginē evanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadāntenus inducit, ambuſtis cū cerato medetur. Lavatur ut cadmia.

Aßius lapis. Cap. LXXXVIII.

Aßius lapis aßumi debet punice colore, levis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad imum ætæ habens. Eius flos, salsugo subflava est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs punici simili, ad luteum vergente: ad motus lingue aliquantum mordet. Vim habet uterque adstrictoriam, & modicè erodentem, admiſtus liquide pici, aut terebinthine, tubercula discutit. Longè validior flos existimatur. De cætero siccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnantia sanat: excrescentia cohibet, tetraque vlcera & fungis similia, cum melle expurgat: vlcerum cana explet,

&

LIBER QUINTVS. 241

& expurgat cum melle, depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto faba lomēto: & lienosis, ex aceto & uina calce. Prodest flos ex melle phthisicis linētu. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excavato inditis. Fiūt quoq; pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absument. cum vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmia modo lauatur.

Pyrites. Cap. LXXXIX.

PYrites lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas edens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continue flatur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, et ubi ad fuluum colorem vergere cœperit, extrahūt: efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: si quidem sæpe facies summa solum vritur. Ita crematus, siccatusq;, reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet cadmia. Tā crudi quā vstis vis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescētia in carne cohibet, sed calorem quendā et adstrictionē parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellant.

Hæmatites. Cap. XC.
Hæmatites optimus habetur friabilis, satur.

H h

DIOSCORIDIS

rato colore niger, durus & suapte ingenio æqualis, nulla sorde admista, nulloq; zonarū discursu. Vim habet adstringentem, & excafactoriam ali quantum extenuantemq;: oculorum cicatrices & scabritiā cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit: bibitur cōtra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab ijs qui sanguinē reiecerunt, cum succo punici mali. Fit ex eo coti- cula & collyria oculorum vitis apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicē leuis fiat, & bullis quibusdam intumes- scat. Sūt qui hæmatiten ita adulterāt: Dē sam gle- bā rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vrcum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; in- teriecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad- cotem hæmatitæ colorem reddat: quod si ita res se- habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & sub- inde conspicientes, periculum faciunt: si quidem in cinere diu demissus, colore mutato diffunditur. Co- arguitur malè cōfectus, primū scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hæmatites lōgē secus se in colore habet: nanq; hic floridum reddit: hæmatites vero saturatiorem, atq; cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit et è magnete lapide, vehemēter ambu- sto. In Aegypto sponte naturæ cū metallis enascitur.

Schiltus lapis. Cap. XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probatur maxime qui croci colorem emulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium venarum discursu, pectinū modo, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatizæ, sed ad oīa infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte persusus: ad proci dentia, rupta, itē genarum crassitiem, & vnas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates. Cap. XCII.

In gagatarum lapidū genere præferendus, qui celeriter accenditur, et odorem bituminis reddit: niger est plerunq; & squallidus, crustosus, per quē leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprehendit fonticum morbū suffitus, recreatq; vuluæ strangulationes: fugat serpentes ridore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influēs amnis ī mare effunditur, proximē oppidū quod Plagiopolis dicitur. Vocatur aut et locus et amnis gagas, ī cuius faucibus ij lapides iueniuntur.

Alij plures lapides. Cap. XCIII.

Lapis thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, et oleo restingui: quod in bitumina accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad æruleum vergente, lensus, nec admodum grauis.

Hb ij

DIOSCORIDIS

Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sūt qui magnetem crematum pro hematite vendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hemorrhoidas exiccat: eius cinis dentifricio optimus. Galactites appellatur, quod lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones & vlcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recodere, propter vim glutini, quod ei obhæret. Melitites omnia galactitæ similis: hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochthus lapis, quem aliqui galaxiā, aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, utpote molli, & facile liquecente, lintea nes dealbandis vestibus vtuntur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, cœliacis, & vesicæ doloribus, cum aqua potus: itidem fluxionibus vuluæ, impositus velleri. Mollihus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atq; delacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, vlcera quæ sunt in teneris partibus corporis ad cicatricem perducit. Alabastrites vocatur onyx, crematus, resina aut pice assumpta duritias discutit: Stomachi dolores cum cerato leuat, & gingivas cōprimit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subviridi colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit. Vehemen-

ter mordet: tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glanzdis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus, quasi industria detornatis: solutus nullam qualitatem manifestam gustui representat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cū calidæ aque cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in vesica comminuere. Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis: quo, vtpote flexili, telas & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora exeunt. Sapphirus lapis, percussis à scorpiõe potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Exerescētia in oculis, vnasq; & pustulas inbibet, et ruptas membranas cogit. Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere, qui cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, leuis. Huius ramenta comitialibus impotu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodem frugifera redduntur. Iaspidium quædam smarage

Hb iij

DIOSCORIDIS

dum imitatur, alia crystallum, colore similis pituitae. alia non dissimilis aeri, ob id vocatur aerixusa: alia veluti fumo infecta, quae capnias ex argumento vocatur: quaedam lineis albis et resplendentibus praecingitur, Assyrios appellata: alia terebinthinae similis, quae terebinthixusa dicitur: alia colore cal laida gemmam emulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensae. Aetites lapis est veluti praegrans, cum quatitur, alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricae sunt vulvae & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus e brachio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut glencino, aut alio excalfaciētes, comitiales magnifice iuuat. Ophitae genera multa: quidam ponderosus & niger: alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapides in spongys inueniuntur, qui vesicae calculos rumpunt, in vino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur: conflatur autem ex marmore, lapide

Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo
 admotum, incōmodos oculis pilos replicare. Ostrac-
 ites testæ similitudinem habet, crustosus, & in la-
 minas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos,
 pro punice vtūtur. Menses drachmæ pōdere potus
 ex vino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bi-
 batur sicilici pōdere, fœminis præstat ne cōcipiāt.
 Cum melle autem impositus, mammarum inflam-
 mationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis
 est, quo annularij sculptores lapides expurgāt, ad
 erodendum & vrendum utilis: gingiuis, quas hu-
 mor vexat, prodest: dentifricio commendatur. Are-
 na è litoribus sole feruefacta, hydropicorum tumo-
 res exugit. si capite tenus, in ea obruantur. Torre-
 ri solet ad aridos fotus, pro milio aut sale. Ecote
 Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alo-
 pecias ad pilū reducit: virginum māmās cohibet:
 nec increfcere patitur: potum ex aceto, lienē absu-
 mit, & comitialibus prodest. Geodes lapis, adstrin-
 git, siccatur, caligines oculorū discutit. Allitus aut ex
 aqua, testium māmārumq; inflāmationes sedat.
 Terra. Cap. XCIIII.

OMnis terra ad medendi vsū recepta, sum-
 mam & primam vim habet refrigerandi,
 meatūque obducendi, occludendique. sed specie di-
 stat, cum alia adiūctis quibusdam ad alia sit vti-
 lis. Eretriades duæ sunt, vna vehementer alba est,
 altera cinericia. Optima habetur ad cinereum co-

Hh iij

DIOSCORIDIS

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per æram
 ta tractim ducatur, lineam violaceam refert. La-
 uatur vt cerussa, aut hunc in modum: Teritur seor-
 sum, & cum aqua, & vbi pessum ierit, humor le-
 uiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur in-
 terdiu, adiecta aqua, vt vespere consadat: anteluca-
 nis colo excernitur, & demum in sole trita si fieri
 potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desidera-
 tur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perfora-
 tum coniiciuntur, oreq; vasis diligenter obturato,
 supra carbones candentes continenter foliis per-
 flantur: vbi vero cinis in fauillas se conuertit, aut
 aereum colorem contraxit, exempti reconduntur.
 Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, le-
 uiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta
 conglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tan-
 genti lingue glutinosius modo adhærescens, mollis, suc-
 cosa, friabilis: cuiusmodi est, quæ aliqui collyrion
 vocant. Dux enim species eius: vnâ, antè diximus:
 altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo
 prædessa. Vritur ac lauatur vt eretria, vimq; consi-
 milè habet: sanguinis reiectionis sistit, et fœminis
 fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris
 punice datur. Testium & mamarum inflamationes,
 illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores
 arcet: contra serpentium morsus & venena, pota ex
 aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inue-
 nitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, vt reo

splendeat. Probatur candore & duritia. Vis ei ad-
 strictoria, & refrigerans: prodest stomachicis po-
 tus: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum
 & vlcera, cum lacte efficax est partus, vt tradūt,
 adligatus accelerat, & conceptus fœminarū custo-
 dit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum,
 Samie similis: est aut crustosa, albaq; sed fictitijs
 formis differens. Vis eadē quæ & Samie: extēdit
 faciem, & erugat, atq; splendidā reddit: colorē in
 facie & corpore toto commendat. in balneis pro ni-
 tro deterget. Eadē præstat Selinusia: maximè lau-
 datur, quæ uehementer resplendet, candida, friabi-
 lis, et humore dilui celerrima. Cimolie duo genera,
 candida & ad purpureum inclinans. Optima exi-
 stimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, ta-
 ctuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, paroti-
 das, et alia tubercula discutit: ambusta igni, si sta-
 tim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: te-
 stium duritias, & totius corporis collectiones cohi-
 bet, igni sacro imponitur. In summa, vtraq; multū
 in medicina commendatur, si incorruptæ originis,
 nec spuria assumatur. Quæ pnigitis dicitur, colore
 fere eretrie similis est, grandioribus tantū glebis:
 manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu lin-
 guæ, vsque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui
 effectus idem qui cimolia, paulo tamen infirmior.
 Hanc aliqui pro eretrieade vendunt. Fornaceæ teste
 uehementer tosta, crustas vlceribus obducūt: quæ

DIOSCORIDIS

re prurigini & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, strumas discutunt, cerato exceptæ. Fornacum terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cineream eretiam imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, deraſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitilignes, & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resoluatur. Ex ampelitimide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra piceæ lōgos carbones referens, modicè assulosa, æquali splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vſus eius ad illinendas vites sub germinationis tēpus, utpote cum innaſcentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria. Cap. XC V.

Fuligo qua pictores utuntur, ex vitrariorum officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax.

facta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. XCVI.

Atramentum, quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gummi terne fuliginis vnciæ adijciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria fuligide, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sescuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè soluatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem vlceribus, sua sponte decidit. Cæterùm habes, amicissime Aree, ferè quæ tradenda duximus pro operis modò, quem destinaueramus, & materiæ auxiliiorumq; medicinalium copia.

QVINTI LIBRI
FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE VENE-
nis, quoque modo arcean-
tur, uidenturque,

LIBER VI.



UPERIORIBVS, amicis-
sime Aree, libris tradidimus de
aromatibus, oleis, unguentis,
arboribus, et earundem fructi-
bus, lacrymisq; item animalis-
bus, melle, lacte, seuo, frumene-
tis, oleribus, herbis, radicibus,
liquametis, vinis, metallisq;. In hoc uero totius ope-
ris ultimo, facultates medicamentorum recensebi-
mus, que pro lesse nobis, aut officere possunt. Vita-
ta igitur orationis prolixitate, opus institutum prose-
quamur. Huiusmodi autem tractatus, cum bis a-
riam distributus sit: in partem venena precauene-
tem, ita ut ne fallant sumentes, aut si quando per
imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant,
irrita q;. & in rationem ijs succurrēdi, qui iam no-
xiam sentiunt: primum disseram de precauēdi mo-
do, quem esse difficillimum plerique maiorum arbi-
tratur, quod dantes clam venena, ita insidias tem-

perant, vt peritissimum quenque decipiant. Si quidem venena sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorum eximunt: aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putantur: & præsertim in ualeitudine, ut absynthium, tragoricum, satureiam, aut hyssopum, quinetiam thymum, irim, origanum, abrotonum, castorium, aut si quid medicamenti purgatorij cognatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt: vt uinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ, musto: succis. vt in cremore lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Quare qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum, aut acidorum, abstinere: nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad saporem horum diligenter attendere, præsertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates agerrimè postea concoquuntur. In ægris quidem facile cauemus potiones auxilij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi ueneficorum artifices: itaq; ob id laborantes morbo non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facile incauti seductiq; homines capiatur dolis ueneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ uenorum vires hebetet, et inefficaces irritasq; red-

D I O S C O R I D I S

dant: cuiusmodi carice sunt cum iuglandium nuci-
bus manducate, & quæ cedromela vocant, id est
citria, seminisq; napi drachma cum vino. Item fo-
lia calaminthæ, aut creta quæ Lemnia sphragis
appellatur, pondere pari cum vino: aut rutæ folia
& nucis iuglandis nucleum: aut caricas duas, &
salis callum ieiuni sumant, & nullo veneni genere
ledetur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum
præbent. inter quæ intelligitur magnum Mitrida-
tium, & quod scinco, & quod sanguine tempera-
tur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculiares qui-
dam corporum affectus certo quodam modo consti-
tutorum cum quadam cibi potusq; qualitate, tum
vini copia ita temperatorum, ut cum venenis dis-
sentiant: siquidem ingesti veneni vires frangunt,
atq; iam priore alimento farctis præclusisq; me-
tibus, obstant ne membratim per digestionem in-
metur: Verum enim uero, quoniam fortunæ neces-
sitas interdum similia discrimina peregrè agentibus
affert, absq; ullis insidijs hominum, nonnihil dis-
serendum mihi de hac re necessarium duco. Iam pri-
mum igitur culinam apparare loco subdiali conue-
nit, cibosq; & potus in huiusmodi loco struere.
Si id fieri commodè nequit, secunda erit cõditio hæc,
apparandi apponendiq; sub tecto. Sed tum diligen-
ter laquearia animaduertenda: frequenter enim à
superioribus contabulamentis animalia decidunt,
exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem mo-

liantur, vt phalangia, stelliones, & alia quædã re-
 ptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet: nanq; reptilia odore vini illiciuntur, quæ inter-
 dum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum
 vero delapsa immersaq; expirarunt, & exitij cau-
 sas haurientibus attulerunt. Sed hæc hætenus di-
 cta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateant. Quod
 si qui sua sponte, aut ex quorundã insidijs sumpse-
 runt, auxiliari primo quoq; tempore oportebit: si
 quidem dum comites singulorum venenorum notæ
 expectantur, immedicabile fit venenum, & pauli-
 sper neglectũ, medicamentis ægrè cedit. Quare si
 qui pro comperto se virus sumpsisse intelligat, &
 fateantur, aut eorum, qui aderant, testimonio con-
 stet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile
 peculiari nativæq; constitutioni restituemus. Neq;
 enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusce
 modi frustra adhiberi contendunt. Quo enim mo-
 do morbi, quorum causæ cæcæ latentesq; corporibus
 insident, medicinam admittunt, & quæ forinsecus
 incurrunt venena, medendi rationem aspernantur?
 Aequè uero omnes morbi pro causarum ingruen-
 tium magnitudine, proq; antecedentibus affectio-
 nibus qualitatibusq;, quibus sit opportunum cor-
 pus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medica-
 mentis. Quod si qui forsan obmutescentes, aut te-
 mulenti, aut nolentes alioqui uenenũ à se egeri, nul-
 lam nobis eius cognitionem præbeant, tum pro-

DIOSCORIDIS

tinus accedendum ad ea, quæ cōmuniter epotis quibuscunque venenis opitulari consueverunt. Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, quàm vt proximo loco virus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, vt vomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, vrtica, scenogræco, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo vomitionibus exigēt vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducēt, & corporum inanitione ita aduersabuntur, vt acrimonia venenorum hebetent: Ad quod euidenter huiusmodi argumēto deprehendere licet: Esto, vt quisquam viua calce vel fece, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque uehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiā vomitus non ob id modò quod vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamētum adfert, sed quòd assumptum virus nunquam odore, coagulatis grumis aut colore, prodat: quippe cū odore & amaritudine, meconium: colore, cerussam, gyssūm: grumis, lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorū, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehēdit, ita vt nonnulla
ab ijs

ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorū auxilia transeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admiscetur, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, aut lixiū lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & uina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Alium namq; subducunt, uti diximus: & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad vomitionem reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ cōmuni doctē profunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotonū, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calamintha, nardum gallicum, castorium, ferulæ virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpilium, sagapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix, quam magударim appellarūt, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonice, quam cestron nominant, folia: singula cū uino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & seseli, et liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi au

DIOSCORIDIS

xilij ita se habet. Cæterum ab ijs qua consueuerunt
euenire, communia remedia sumptitari possunt. Fe-
rè enim vires venenorum quàm plurimorū, in affe-
ctus cōsimiles corpus tandem redigunt. Quam ob
causam plerisq; communia conducunt auxilia: va-
ria etenim sunt venenorum genera, communes ta-
men nec multi ijsdem affectus oriuntur. Neq; fieri
potest, ut omnes concurrentesq; casus, quæ sympto-
mata vocant, unum uenenum sequantur. Alioquin
superuacanta fuisset venenorum singulorum tradi-
tio cum suis remedis ab authoribus descripta. Neq;
vero in vno eodemq; promptū est inuenire, vt quis
stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesi-
cæ dolore uehementer crucietur, vt singultiat, eroda-
tur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuel-
latur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, ve-
terno prematur, vertigo obuersetur, caligent sen-
sus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre cō-
flictetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur,
crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore
sugilletur, palleascat, desipiat, stertat, viribus deficia-
tur, et pleraq; alia faciat, patiaturq;: singula enim
in generales affectus deducta, pauca numero, &
communis ea demonstrant, quæ euenire consueue-
runt. Quare in singulis, quæ suprà diximus, nō fa-
cile fuerit deuotum uirus cognoscere. Nam oris
& linguae erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renū
inflammatio, uehemens urinae difficultas, et inter=

dum cruoris cum eo exitus, lancinatio, & in plurimis
 partibus quidam adustionis sensus, non in cā-
 tharidibus modo potis reperiuntur, sed in erucis
 quoq; pinorum, & bupreste, & salamandra. Por-
 ro non modo eos, qui meconium hauserunt, veterno
 aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere,
 refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritus senti-
 re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mandra-
 goram aut cicutam deuorauerunt. Delirium non hyo-
 scyamus tantum infert, uerum etiam quæ toxica
 appellantur: itidem aconitum, & mel quod in He-
 raclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus
 in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconi-
 to, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile
 unum uni veneno proprium inuenire signū, quod
 haustum, gustatumq; virus prodere possit: maxi-
 mi, quod hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in
 corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cete-
 rum in his quæ celeriter enecant, noxam signis for-
 sitan indicare possit, si ad ea respexeris, quæ sumus
 dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægri tudines spe-
 ctant, nihil ad medendirationē difficile, duntaxat
 quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cū venena
 statim atq; præsentaneam vim illam perdiderūt,
 transmutata in longos affectus, communia reli-
 quorum uitiorum remedia, compositionesq; flagi-
 tent, cū uenefica proprietas non amplius insit.
 Si uero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum

DIOSCORIDIS

morborū genus recidet, à quibus facile fuerit me-
 dendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generali-
 ter auxiliantur, hæcenus. Consequenter quæ pri-
 uatim singulis prosunt, scriptis mandabimus, si
 prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis or-
 dinibus exitialem aut maleficam vim sortiuntur,
 vt medicine studiosi ea cautè obseruent, quæ ad ra-
 tionem salutis scripta inueniuntur: quòd nonnulla
 eorum, quibus vtuntur, venenis sint commista. In-
 curia enim magnas adfert noxas, & sepe cōtinuo
 vsu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde ani-
 malia quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: can-
 tharides, buprestis, salamandra, pinorum eruce, le-
 pus marinus, rubeta, & rana palustris muta, de-
 uoratae hircines. Semina sunt: hyoscyamus, coriā-
 drum, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta: meconiū,
 opocarpason, thapsiæ succus, elaterium, mandrago-
 ras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, tha-
 psia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerū,
 quod aliqui Colchicum vocant, quòd in Colchide
 nascitur. Herbae olera q̃: smilax, quam aliqui tithy-
 malum appellant, Romani taxum, solanum mani-
 cum, quod & doryenium dicitur. sardinia herba,
 quæ ranunculi genus est, corniculatum papauer,
 pharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab ani-
 malibus: taurinus sanguis recens, coagulatum lac,
 mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla: gypsum,
 cerussa, calx, auri pigmentum, duo sandarachæ ge-

nera, spuma argenti, adarce, plumbū, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abundè post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

Cap. I.

Quibus datæ sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsq; cuncta erodi sentiuntur, picem aut similem quidam cedrie resipiunt, dextra præcordia inflammantur: vrinam egrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquuntur, obortaq; vertigine concidunt: postremo mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorū aliquo, uomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryxæ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicū althææ, quam Latinus sermo ibiscū appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in alium ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammatæ autem partes,

DIOSCORIDIS

hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, utpote quæ dolores & permulceant et leniāt. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserūt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, et stabilitatem capeſſat. Gallinaceis carnibus & hædinis, aut suillis catu-
lis, maxime pinguibus & tenerimis, ac cum lini semine coctis, uesci debent: si quidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum ruta decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissime antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ. Cap. II.

Is, qui erucas pinorum hauserūt, illico dolor in ore & palato exoritur: uehemens alui, lingue ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur: corpus totum exæſtuat: fastidium urget. Quibus est

succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo et irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis.

Cap. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nostro virus sapiunt, stomachi uentrisq; uehemens dolor insequitur: tam uenter, quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem difflatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: itè earum decoctum, ex uino. Vbi uero iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

Cap. IIII.

Si salamandram hauserunt, lingue inflammatione consequitur, mens & sermo præpeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circunquaque sugillantur: sæpèque, diutius immorante ueneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabitur cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiariora uero remedia, resina pinus, aut galbanum.

DIOSCORIDIS

ex melle linctum, & aiuge decoctum, in quo nucleus pinei conterantur: urticae quoque folia, cum lilij & oleo decocta. Prosumt etiam oua testudinis marinae aut terrestres, cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

Cap. V.

Sumpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut sylvestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque is qui urtica aut scilla laceffuntur: interna rofionem sentiunt: stomachus cum ingenti grauitate exaestuatur. Ceterorum inualefcente morbo, cruor strigmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut is qui salamandram hauserunt, uomitione aut clysteribus auxiliari conueniet: sed antea quam uenenum inualefcat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum: item succum sanguinalis herbae, aut ramorum uitis, aut rubi, aut medullae recentis ferulae, aut myrti cum uino. Bacca autem myrti tuse tritaque, & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media castanearum tunicala, similem effectum praebet, si cruda in aliquo superdictorum succo sumptitetur: origanum quoque cum lixiuio epotum: eximie inuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

DOrycnion, quod aliqui manicon solanum appellarunt, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singultus ciet, humor linguā uocat: sanguis confertim reijcitur: mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt ante dicta, uomitus, clyster, & quæcunque potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdala amara, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchyliæ omnia, tam cruda quàm tosta esse, salutare est. Conueniunt & locustæ marine, & gamma-ri, & pota eorundem iuscula.

AConitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadā dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conatur, uertigines offundit: lacrymas ciet: grauitatem pectori, et præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absynthij decocto, cum uino absynthite uel semperuino, uel abrotono, uel chamelea, aut aiuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, et ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum

D I O S C O R I D I S

hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto, ferri quoque stercus, item unum, in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum, lixiuiaq; cum gallina & uino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum uino sumpta. Fertur & aīga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heraclia. Cap. VIII.

Mel in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntue, non secus affliguntur, quā qui aconitū ebiberunt. Iis eadē, q̄ poto aconito conueniunt: adiuuantur in primis continuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta. Coriandrum. Cap. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest: epotum aut uocem exasperat, insaniam adfert, a temulentis non abhorrentem. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, uenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatam, uti retulimus, merum & per sese, & ex absynthio potū auxiliatur. Itē oleum, nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur & epota muria, et ius salsum ex gallina & ansere: passum quoque cum lixiuia sumptū.

Psyllium. Cap. X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam adfert: ita ut animum despondeant. Cui omnia que exhausto coriano auxiliantur.

Cicuta. Cap. XI.

Cicuta pota vertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita ut minimum cernatur: singultus ciet, mentē turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, ut in reliquis, cicuta vomitu excutiemus: postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionē, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendū per interval-
la, in quibus proderit lac asininum, aut bubulū potui datum, aut absynthium cum pipere & uino, castorio, ruta, mentha cum uino, aut amoni, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis cum semine urticæ & uino, aut lauri folia. Itē laser ex oleo et passo, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus. Cap. XII.

Smilax, à quibusdam tithymalū, à Latinis taxus appellatur: frigus uniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicuta conueniunt.

Carpaci succus. Cap. XIII.

Potus carpaci succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuvantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonia herba. Cap. XIII.

Sardonia ranunculi herba generi assignatur, quæ uescentibus mentem adimit, & quæ

DIOSCORIDIS

dam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in uulgus infansto omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfaciunt: in calidam aquam oleūq; descendant, sed tum multum perficere & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus. Cap. XV.

HYOSCYAMUM potum aut comesum, similem Hebræis ab alienationem mouet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininū: si id desideratur, caprillū, uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctū. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semē ex passo sumptum, & uinum salsum cū adipe suilla recenti, passoq; itidem urticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cæpa, & allium: & hæc singula cum uino sumantur. Postea sinendi quiescere, quem admodum qui uinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora. Cap. XVI.

MANDRAGORA si bibatur, confectim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex ijs accidat, uomitus & aqua mulsa proderit:

postea nitrum & absynthiū ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatoriū, & piperis, sinapis, castoriū, & rutæ tritorum in aceto: & liquida picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quod si agere reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; cõmunibus auxilijs uti conueniet.

Meconium.

Cap. XVII.

EPoto papaueris succo, quem meconion uocant, consequitur ueternus cū perfrictione & pruritu uehemēti, ita ut sæpe inualeſcente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliātur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merū cum absynthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, & rutæ syluestris semen cū pipere, uino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, uel cum satireie aut origani decocto, cum uino. Hi olfactilibus excitandi, et ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foveantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cū uino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. Cap. XVIII.

Quod corniculatum papauer appellant, & potus, & cibo eadem inferre consuevit, quæ pa

DIOSCORIDIS

pauers succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum.

Cap. XIX.

Quod pharicon uocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum absynthitem potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinē aliqui uocauerūt: aut spice nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cū croco ex uino: dera sumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum.

Cap. XX.

Toxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sa gitta eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & lingue inflammatione torquentur: incoercitus furor uarias ijs imagines obuersat: quare uix medicina locus est: raroq; qui hauserūt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinū dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs cōuenit, quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus, malaq; cotonea trita esse, aut cū pulegio & aqua bibere, conueniet amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbūt, & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

IXia, quæ ulophonon appellatur, inter potandū aliquid ocymo simile gustu & odore redolet: uehementē lingue inflātionē excitat: mentem mouet: oēs excrementorū exitus supprimit: Strepitum cum animi deliquio ciet, ūs q; intestina latrant, nec egeritur quicquā. Post uomitionē aluum q; resolutam, auxiliū præstat aqua, in qua absynthiū mæduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota: ruta q; syluestris semē, aut laseris radix: item tragorigani decoctū, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorū singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes ex uino, cū resina, castorio, & ruta trite, ita ut singula drachmæ pondus æquent. At idem chamæleæ aut thapsiæ aut absynthij succi sicilicus cū aqua mulsa, & acetum calidum potum. Cerussa. Cap. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac lingue ariditatem excitat: ūs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficum aut malux decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmētis factam, amaricinum oleum aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum

DIOSCORIDIS

thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi
quod ulmus piorauit, aut humor, quem ulmea fo-
lia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque
uomant. Conuenit etiam tapsie succus, aut scam-
monie, cum aqua mulsa potus.

Fungi.

Cap. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia ledunt: omnes
tamen strangulatus suspēdio similes cōcitant.
Quibus confestim succurrendum: communiter ex
oleo uomere cogendi: mirificè iuuat lixiua ex sar-
mentis aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca
& nitro. Fructus, aut folia pyrastris cum fungis
decocta, strangulantem illam uim auferunt, esita-
taq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallina-
cea ova cum posca proficiunt, adiecta aristolochie
drachma: item absynthium cum uino melleq; sum-
ptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro, pa-
naxis radix & semen in uino, sex uini cremata
cum aqua, atramentum sutorium ex aceto, radix,
uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

Cap. XXIIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat:
quare eadem proferenda sunt, quæ mansis
fungus, auxilia, & ad hæc malua decoctum, quod
etiam olei uicem pensat: utpote cum pingue sit, euo-
mendo lubricas uias & faciles reddit, deradique
corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapidem,
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua
mul

mulsa, aut sicorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hiq; decocto malue proluendi.

Sanguis taurinus. Cap. XXV.

T Auri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumq; concitat: faucium tonsillarumq; meatus cum neruorum distentione precludit, lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimur: sanguinis enim globi attractu illo insublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiunt & aluum subducunt Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliatur: nec secus coagulum omne cum aceto & laserpitij radice, aut lasere: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyxa folia cum pipere, et rubi succus ex aceto. Aluus resoluenda. Iis qui seruatur, stercorosa et fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum aliumq; hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. Cap. XXVI.

E Os, qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sepius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item

K l

DIOSCORIDIS

succum, aut la serpitij radicē, aut la sercum posca:
thymumq; ex vino, & cum luto suo lixiuiam. Sed
nulla falsilago obijciatur, quoniam magis lac coiz
ret, et in casum densaretur. Neq; illos vomere cō
uenit: siquidem concretum lac sese in gulæ angus
tias insinuans, strangulat.

Argenti spuma. Cap. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & inte
stinalis grauitatem cū magnis torminibus ad
fert, & nonnunquam pondere suo intestina vulne
rat, urināq; supprimit: corpus intumet, plumbeaq;
deformitatem concipit. Quibus subuenit secundū
vomitionem, potum syluestris hormini semen, myr
rhæ drachmæ octo, absynthium, hyssopum, apij se
men, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum pa
lumbis: finum, cum nardo & vino.

Argentum viuum. Cap. XXVIII.

Argentum viuum potum, eadem quæ spuma
argenti infert. eisdemq; vtendum auxilijs.
Lac copiose potū auxiliari constat: sed postea eno
mant, qui auferunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

Cap. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum,
pota, aluum & intestina cum vehemēti
erosione excruciant. Præbenda cūcta quæ
suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac sol
uunt, & facilem lubricamq; aluum reddūt, cuius

modi ibisci et malæ succus est: natura enim utriq;
perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel se-
men tragi herbe, vel oryxæ, lacq; cum aqua mul-
sa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. Cap. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium vi-
rus olent: procedete tempore, alius dolore
afficitur, & urina sistitur: & si quando eam red-
dere contingat, purpureum colorem referet. Omne
piscis genus auersantur, et odio habent: foetido ac
gravi sudore manant: biliosus vomitus, interdum
sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum
lac asinum, vel passum cōtinuè, aut radicis mal-
uæ foliorūq; decoctum, aut trita cyclamini radice
cum vino, aut veratri nigri, aut scammonij succi
drachma, cum aqua mulsa, panicij; mali acinis.
Cedria cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut
tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuūt, asper-
nenturq;, solis fluuiatilibus cancri vesci possunt,
bibuntq; eos admisto vino, adiutiq; ab his percos-
quunt. Cumq; appetere et comessē pisce cœperint,
suæ salutis iudicium habent.

Rubeta & palustris rana. Cap. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumor-
res ciēt: pallor corpus vehementer decolorat,
ut planè buxum spectetur: spirandi difficultas
torquet, & grauis halitus oris, singultusq; et in-
uita interdum genitura profusio consequitur. Ad-

DIOSCORIDIS

inuuantur secundum vomitionem multo meri potu,
& arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi
totidem. Breuiter, cogendi sunt vt vehementi am-
bulationi & cursui se credant, ob torporem quo
corripiuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo.

Cap. XXXII.

DEuorata cum aqua hirudines, si ori ventriculi
adherent, tractione partium, nonnullam su-
etionis imaginem præbent: eo enim argumēto hau-
sta hirudo deprehēditur. Has muria sorbitione ex-
cutit, et cyrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut
beta, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca.
Nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum
sutorium aceto dilutum. Si faucibus hereant, inie-
cta lupinorum farina, aqua frigida ore contineas-
tur, et ad eam hirudines exilient. Prouidendū etiā
iis, quæ etsi ferendi auxiliij gratia tradantur, non
minora tamen ceteris venenis pericula sæpius ad-
ferunt. Qualia sunt album veratrum thapsia, ela-
terium, agaricum nigrum: si quidem ea strangula-
tus concitant, aut immodicas deiectiones mouent.
Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione
& similibus retulimus. Nimios aut deiectionū im-
petus, medicamentis, quæ excrementa supprimūt, co-
ercebimus. Neq; negligēda quæ parū quidē nocere
vidētur: iterim vero vitā i descrimīa agūt. Quo i
numero sūt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pap-
pi recētes: flores aut sunt eius spina, quæ coctos di-

citur. Eos, qui sumpserunt, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. Cap. XXXIII.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius et otum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, stragulatus et dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminetia solvunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est, præsertim & quod sanguine, et quod scinco temperatur. Verùm quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorū descriptiōe supersedemus.

Venenata. Cap. XXXIII.

DE bestijs, quæ virus eiaculantur, & exitialibus venenis, idè scribere aggredimur, ut tota curationis remediumq; ratio ad umbilicum perducatur: si quidem pars hæc non minus quàm ceteræ aliæ, necessaria est ijs, qui artem medicā exercent, utpote cum adminiculo eorum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam quid de feris virus inspuentibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui uerò de amoliendis veneficijs.

Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ

Kk ij

DIOSCORIDIS

sequi signa consueverunt, præmonstrabimus: tum
 quæ nonnihil auxiliū ferunt. Omnia autem in prō-
 ptu, & ad manum habere artificem oportet, pro-
 pter urgentem sæpenumero necessitatem: siquidem
 pauca ē venenis & virulentis animantibus, tarda
 & grassantia sensim pericula cient, ita ut dilatio-
 nem admittant: pleraque verò præsentaneam per-
 niciem afferunt. Hominū autē partim malè alijs
 cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita tēpe-
 rant, ut spatiū curanti liberū non relinquunt: par-
 tim sceleris admissi conscientia, aut trīsti aliquo
 euentu oppressi, hausto sponte veneno, mortem sibi
 consciscere conantur. Qui postea deprehensi, aut re-
 sipientes, & vitæ cupidi, præsentaneam opem po-
 scunt. Non desunt, qui hostiles sagittas illinentes,
 aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes,
 certam & inēuitabilem aduersarijs perniciem mo-
 liuntur. In quibus ipsis etsi maleficium non subito,
 sed aliquantō post grassari natura sua compara-
 tū est, tamē nisi primo quoque tempore coerceatur
 & remedijs subinde excipiat, frustra tandem
 succurritur, occupatis iam corporibus exitiali vi ve-
 neni. Proinde non vulgari industria diligentiaq; in
 ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars
 consuevit, in his quoque salutem mortalibus præ-
 beat. Quin & apud priscos genus hoc vnum exi-
 stimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pu-
 gnat: sed recentiores id ipsum discreuerūt, nomināe

tes præcautionem, & modum præcauentem, salu-
bris sanantisq; mediū statuentes, parua & leui su-
pra modum persuasione decepti. Siquidem treis in
humanis corporibus constitutiones esse contendūt:
vnā, qua sani degimus: alterā, qua sinistra vale-
tudine corpora laborant: tertiā, quæ medium inter
utrasque locum sibi vendicat. In qua positi, sanita-
tem specie mentiuntur, facileq; in morbos & peri-
cula concidunt, ob vim corruptricem, quæ corpori-
bus nostris incumbit. quemadmodum in ijs videre
licet, quos excādescens rabie canis momorderit, nec-
dum tamen aquam horrent. In ijs quoque qui can-
tharidas hauserunt, sed nondum vrinæ tormento
cruciantur. Tripartitō igitur artē digeri, tripliciq;
corporis constitutioni meritō respondere trahunt.
Salubrem partem esse volunt, quæ sanitatem tue-
tur: præcauentem, eandemq; prohibentem, quæ ob-
stat quò minus in morbos incidāt: & sanantem,
qua vitia discutiuntur. Quibus ita responderi po-
tēst, quòd primū ex ista ratiocinatione nō treis
corporis tantū, sed quatuor haberi constitutio-
nes fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui nec-
dum morbo laborant, morbo tamē maxime ob im-
pendentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
priori morbo defuncti, nondum tamen secundæ va-
letudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à mor-
bo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui vi-
rium recreationem & robur desiderant. Sed quæ

DIOSCORIDIS

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, vstionibus, amputatione, derodētibus epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enim vero sunt vsque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem apponent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agēdi modus, omnino auxiliarem remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cæli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, et in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis confluentur. Neque id silentio prætereundum, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à vi

rulentis animalibus venenisq; contrahuntur, voca-
 ri cecos, id est, quorum ratio minimè iniri potest.
 Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter
 sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus ob-
 servatorie artis, et eius, quæ ratione sulciatur, an-
 numerari solent. Neque prorsus verum deprehendi-
 tur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod sem-
 per se protrahit, & nullum in quibusdam necessa-
 rijs vsum exhibet, haud facili coniectura colligi po-
 test: etsi nature proprietate prorsus cecos eos affe-
 ctus concedimus, qui ab exitiis venenis, et ani-
 mantibus, quæ virulento morfu sæuiunt, contrahū-
 tur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præbet,
 datq; medendi occasionem, neque imperceptibile,
 neque cecum, nullius causæ obnoxium reputatur:
 se magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem
 se habere, & opinionem abditorum cognitione con-
 firmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm
 ut sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsi:
 inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in
 eo commentario quem Plinistarcho dicauit, satis mo-
 dos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nosse quis
 hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis,
 & scorpionibus, & reliquis id genus, secum ani-
 mo reputans, ut quauis exiguo sint corpore, vixq;
 conspectui subiiciantur, magnorum tamen discris-
 minum ac dolorum causas inferunt: quorum ni-
 hil præter quandam corporis exiguitatem, vimq;

DIOSCORIDIS

*praeter ceteris animantibus datam illis, facile fuerit
 spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quae
 a scorpijs ictu, & aliorum id genus venenatorum,
 qua nos morsu conficiunt, attingitur? quorum ali-
 qua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt,
 & putredines cient, nec desunt quae praesentaneam
 perniciem moliantur. Aut quantulum est quod à
 phalangij morsu ingeritur, & vniuersum corpus
 excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum
 apprehendere posset, cum prorsus exigua mole con-
 stent. Ergo quod haec ad affectus referantur, con-
 stitit inter omnes. Verum quod exactè deprehen-
 sum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quae
 insinuata corporibus molestiarum, quae exoriuntur,
 nobis causa sit, in confesso est, & omnium consen-
 su persuasum. Nec quisquam inuenietur usque adeò
 contentioni studio flagrans, qui aliunde exoriri mo-
 lestias asseueret, quam à materia mortifera partem
 corporis attingente. Porro id erat, quod inter utilia
 artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam
 res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos laedat, in-
 comprehensa communis causae, quae proprijs inest
 ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit
 cum deprehensa est. Ideò Erasistratus empiricorum
 pertinaciam graui cauillatione incessens, cecis affe-
 ctibus causas assignauit, inficiatus his communem,
 & supremam morborum causam incomprehen-
 sibilem esse: & hanc in eo, quem de causis scripsit*

commentario aptissimè prodidit, candido signatâ
 lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicât in
 quibusdam, vt in venenis, serpentium ictibus, &
 ceteris id genus trita medendi ratione contentos es-
 se. Neque satisfacturam sibi observationem eam,
 quæ à causarum comprehensione separata est. Pri-
 mum enim genere comprehendere facile possunt.
 Quod autem sit lethifera vis, corporaq; permutans,
 ita vt perimat, ex ijs, quæ per genus, non per specie
 vagantur, curationem indicat, qua hæc hebetare,
 & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiūgit:
 Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis,
 & ante observationem ad vomitū, ad vulneris di-
 lationem, ad demorse partis suclū, cucurbitulas
 adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut
 ea quæ vim eandem adipiscuntur admonit, post re-
 mō partem amputauit: secū reputauit medicami-
 na, quæ per summam cutim ferre, & applicari so-
 lita, immisse ad intima perniciæ repugnarent.
 Hæc itaque, quæ disseruit Erasistratus, veritati cō-
 sentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodi-
 cos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus
 illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse cau-
 sam diffiteantur, verum rudiusculè nomini at-
 tendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθορο-
 γωνία, id est mortifera, nominatur: φθορογονία
 autem nullius officij alius esse potest, quàm cau-
 se. Aiunt hæc nomina, μαρτογονία & φθορο-

DIOSCORIDIS

καὶ ὅτι, esse reliquis omnibus similia, in quibus
 partes quedam dictionum non pro virtute, sed nuda
 enunciatione comprehenduntur. Enimvero quæ
 admodum in his uocibus μα'σις, πος & ἀνακαλί-
 πται, partes neque certos, neque principes rei ment
 significatus: sic in hoc uerbo φθοροποιὸν partes
 productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt.
 Hinc ad causarum differentias transeunt, affir-
 mantq; causarum aliquas evidentes esse, quæ dum
 aduersam ualeitudinem creant, separantur: cuius-
 modi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quas-
 dam continentes, quæ permanent postquam mor-
 bum excitant, hoc est, quibus præsentibus, & ef-
 fectus eorum adsunt: incrementibus, effectus au-
 gentur: decrementibus, minuantur: & cum desi-
 nunt, idem finiuntur: quibus solis ac per se ma-
 nentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia qui-
 dem receptissima sunt causarum discrimina, quo-
 rum nulli phthoropœon subijci potest. Evidens
 enim causa nō est, quoniam morbus ipse perma-
 net, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens
 causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit:
 quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt
 demorfi. Quod si neque evidens causa, neque
 continens fuerit, neque per se, neque alterius con-
 sortio causa erit. Quod si à nulla causarum differ-
 rentia phthoropœon deducere possumus, con-
 sequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod

LIBER SEXTVS. 263

autem asserunt, vocabula quædam in se non habere partis rerum significatrices sed nuda, & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existamandum est: neque enim πούρ in hoc nomine φθορά πούρ perinde atque assumptitia profertur, sed longè principè obtinet significationem. Quemadmodum enim φθοράς, id est corruptionis nomen mutationem in peius significat, sic hoc verbum πούρ sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hæc dictionem φθορά secum habeat, declararet. neque prorsus id significat, quod omnes palàm audiunt, et huic simile redditur, παίδει' χεν δι' το. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utiq; vim in huiusmodi verbo πούρ subesse, siquidem aliquid est quod corruptionē efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subiiciuntur, idq; tam in lethalibus venenis, quàm in iis, quæ corporibus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causarum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt, non ex auctam diuisionem assumentes. Qui vero se dogmaticos profitentur, causam esse partim preparantem, partim continentē asserunt: ut inguinū vlcus, et inguinariam sebrim, et quæ affectui tum assistat, tum etiā separetur, ut à fractis præcipitatio. In summa, quoties quidpiā suscepta natura causa fuerit, nec vlla diuisione cōprehēditur,

DIOSCORIDIS

vitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ
 idem genus sortiuntur. Sed quod phihoropeon cau-
 sa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ
 contingunt aperiùs ostenditur. Quid aliud causam
 arbitratur esse post impressum à serpentibus ictum,
 quàm ex animante vim, & illapsum in corpora
 virus? Neque enim frigus, neque æstus, neque sectione
 corporis, neque cruditatem, neque aliud quicquam si-
 mile causari possunt. Verùm quoniam causarum
 differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias
 euidentes appellant: ipsis dicendum, utroque istorum
 modorum euidentem quidem causam esse, quod ef-
 fectum præcedit, & quod corporis substantiam
 præoccupat: continetem vero, quod morbus præsen-
 tibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa
 euenerant. Sed de ijs hætenus. Statuendum itaque
 mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse
 causam, ipsamque principem facere scopum oportet.
 Et antequam ad ima decumbant morbi, varijs
 modis est certandum, donec vis tota corporibus ex-
 cutiatur. Modo enim reuocari debet ea parte, quæ
 pestis intrauerit: modo aliqua alia, præsertim prin-
 cipatum non obtinente, aut è coerceatur, quàm ab-
 tius irrepens viscera tægat: aut eius perniciës elua-
 tur, retundaturque, cum iam membratim peruaga-
 tura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vo-
 mitionibus: si morsu impressa, scarificatione, affi-
 xis cucurbitulis, exuëctis, carnis circumscriptione,

nonnunquam amputatione extremae partis, euocantur. Retinentur vero infusione, et imposito medicamentorum acrium cohibetur. Haec simul utique arcere virus, & eluere possunt. Restinguuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quae acrimonia sint praedita. Postremo deiectione alui, euocatus sudor, et alia quaedam in commune, quae membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enimvero non lethiferam modo materiam, sed & magnitudinem, et tempus, prospicio considerare oportet. Etenim ab ijs remedia quam plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas aut exteriores excitant: alia vehemensissimos dolores aut cecos cient: alia vis medicamentis cedunt, & magis minusue molestias excitat. Oportet autem ea, quae pericula ferunt, peruicacioribus auxilijs expugnari. & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segravioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus uero, uehementium auxiliorum iniuria corpus laceffere. Finitio à temporibus in promptu est, hoc enim subito in pericula, & praesentes molestias adducit: illud uero sensim, & dilatas in diem longam aut breuiorem producit. Itaque in acutis quidem cōfestim multa simul auxilia representari oportet: reliquis, paulatim. Haec quae

D I O S C O R I D I S

Iam artis formula breuiter definita sint. Iam mē
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum
ab eo. Cap. XXXV.

DE rabiosi canis morſu ſermonem alijs præpoſui-
mus, quòd id animal domesticū ac frequēs
eſſe conſuevit, & in rabiem ſæpius agitur, ac pe-
rit, ab eoq; cauere difficile: inde periculum incuita-
bile hominem manet, niſi multis vtatur auxilijs.
Canis plerunq; flagrantiffimis æſtibus in rabiem
efferatur: interdum quoties frigora inceſſerunt.
Rabioſus autem potum, & eſcam auerſatur: lare-
gam ſpumantemq; pituitam naribus, & ore proij-
cit: toruē & ſolito triſtius intuetur: in omnes paſ-
ſim ſine latratu irruit, & æquē ſeras hominesq;
tam familiares, quàm ignotos mordet: nec protis-
nus inſeſtum quicquam inſligit, niſi, vt vulnus, do-
lorē: exinde morbus ille, qui ab aque metu hydro-
phobicus Graia eſt voce appellatus, contrahitur.
Eueri autem cum diſtentione neruorum, totiusq;
corporis rubore, præſertim faciei, cum ſudore, &
lāguore quodam. Aliqui auræ ſplendorem fugiūt:
alijs ſine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt
etiam, qui canum more latratus edant, & obuiā
factos morſu adoriuntur, ac mordendo ſimili vitio
labefactant. Proinde ex ijs, qui hoc vitium ſenſe-
runt, neminem ſeruatum vidimus, niſi forſitan ex
hiſtoria vnū aut alterū euafiſſe audiamus: ſiqui-
dem

dem Eudemus superasse quendam affirmat. The-
misonem aliqui demorsum in hunc furorem inci-
disse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico
aquâ expanscenti morē gereret, & officium exhi-
beret, quadā naturarū concordia similē contraxis-
se affectū: sed post multos tandē cruciatus seruātū
extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo
multos, antequā ipsam experirētur, uindicauimus:
& complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso.

Cap. XXXVI.

Ratio medendi duplex: una cōmunis, qua
utendum in omnes morsus, quos uirulē-
tē animantes impresserunt: alia peculiaris
priuatāq; eorum duntaxat, quos rabiosi canes mo-
rderint: quæ nonnullis quidem summam opem
ferre consuevit: alijs uerò inutilis, maximē qui ex
multo iam tempore iclū acceperunt. Quæ ad hanc
pertinent, primum exponemus, deinde cursim per-
stringemus, quæ ad communem medendi rationem
pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis
albæ uitis tremare oportet, & cinerem eorū quā
minutissimē tritum habere reconditum: itidem gē-
tiane radicem tusam cribratāq; reponere. Quo-
ties autem canis rabiosus morsum intulerit, in qua-
ternos cyathos meraci uini, bina cineris cancro-
rum cochlearia, unumq; gentiane coniiciantur:
hec in polentæ dilutioris modum subacta, quatri-

ll

DIOSCORIDIS

duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morfu bini ternive dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque vnum satisfecit, eoq; cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil ceteris vti prohibet. Satius autem multò fuerit etiamsi in vanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, et vlcusculis cutis similia: quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In vtrisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitula cum multa flamma agglutinata id iuuamenti præstant, vt veneni vis extrahatur. Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, vtpote cū ignis cetera viribus præstet, simul quòd virus domet, & ferri penitus non patiatur: simul quòd pars igne experta, postea non vulgare

fundamentum curationi futurae præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crustæ decident, ne vlceris ora coalescāt, & cicatrice induantur: sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum tempus, vlcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optime præstabit, & syluestre allium detritum: item caepe, succusq; præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quam non mansa imponantur: si quidem subactæ pistæ a perfusione vulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est. Cæterum tempestiuus eorū vsus minimè est contemnendus. Si verò, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt. nāque eas didacere, carnemq; scalpello circinare, aut iterū inuere, expedit. Vbi vero propositum tempus præterierit, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod e salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multo post Sinapismo vtendum.

Ratio uictus in morfu rabiosi canis.

Cap. XXXVII

QUæ ad partem istā pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum uictus rationē ex ijs quæ veneno aduersantur, conie-

LI ij

DIOSCORIDIS

Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni vires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quò minus ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorum utrumque præstare potest vini meracioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod omnem eius acrimoniã obtundat. Simili modo alliorũ, porrorum, cæparumq; cibis: quòd ea difficultè cõficiantur, vixq; aboleãtur. Nã multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus accommodatur, & theriaces, Mithridatij, & eius, quod eupatorio temperatur. Denique omnium, quæ magnam aromatum partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantijs egrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet: Nosse conuenit, pauorem aque non statò definitoq; tempore exoriri: plurimũ tamen ad quadagesimũ usque diem neglectis differri cõsuevit. Post semestre etiã nonnullos inuadit: quendam post annũ aquam horruisse constat. Quæ nobis visu comperta fuere. Narrat & aliquos post septennium aque metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorũ à cane rabiosa curandi ratio talis est. Verũenimvero si ea, quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermisã fuerint, nec scalpro carnẽ

circinare, nec vstionem experiri operæpretium est. Non enim quod iam pertransiit, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut vtilitas, sed incassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis modus accedat. Deiectio magnum præbet iuuamentum, utpote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Caterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismiq; alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimū diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam, qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam vitio tēatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curā contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus seuire consueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus cōuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus eo, quæ sua proprietate nonnullis auxilia

DIOSCORIDIS

lium præstare possunt. Postremò subnectètur etiam
venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à uenenatis demorsi
sunt. Cap. XXXVIII.

DEmorsis à phalāgyis locus quidem ipse, quasi
ab impacto aculeo rubet, nō intumescens, nec
per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit:
ubi verò contrariorum occurso refrixit, cōsequitur
corpore toto tremor, distēt ones poplitum & ingui-
num, cōuulsionibus non dissimiles. In lumbis colle-
ctio exoritur, et perpetua vrine libido laceßit, mule-
taq; reddēdis excrementis colluctatio. Vniuersa cus-
te frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offus-
sisq; nebulis caligāt. Si scolopēdra aut dicta ophio-
etene, morsum intulit, locus per ambitum liuore su-
gillatur, & computrescit: interdumq; , licet raro,
sæculentas atque ruber cernitur. A morsu ipso ex-
ulcerari locus incipit, ulcusq; id negotium exhibet,
ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore prur-
igo sentitur. Scorpionis morsu inflammari stae-
tim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet,
uicissimq; dolore premitur. Modò siquidem ex-
æstuat, modò frigore occupatur. Labor repentè fati-
gat, & aliquando meliusculè habet, aliquando ue-
rò recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus,
& tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt,
inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capil-
li eriguntur, pallor membra decolorat et dolor, tã-

quam ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur. Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidue commulsiões, lassitudo, & imbecillitas. Mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olēs excernitur. A mure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas vrine, & frigide asperginis offusio consequuntur. Si vipera momordit, corpus intumet, vehementer arescit, subalbidumq; colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum suppinguis, mox cruenta: pustule adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit: gingivæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrine difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eueniunt ijs, qui à cecilia nomine, aut amphibæna demorsæ sunt, eadēque ferè auxiliantur: quare hoc venenum priuatam descriptionem sortitum non est,

DIOSCORIDIS

neque visum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsis pustula molestiq; dolores incidunt, praesertim quā diluta saniei emissariū subest. quinetiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab haemorrhoo ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angusta contractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit: et quaecunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluensq; sanguis in globos coit. A pu' mone sanguinem extussum, & in vomitiones effusi sine remedio comoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisq; usque eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: etsi potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuam sitim, & praeter, & causon, aut dipsas appellatur. Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & lividum ac ingens evadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malò olēs, non secus atque ijs, quae serpunt vlceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur. Carnes antea, ut in aqua inter cutem, praetumida, defluunt. Lethargo corripiuntur, & veterno pressi somno captant. Erasistratus eos iocinere, intestino ieiunio, coloq; conflari author est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferè

partes corruptæ reperiuntur. A cerasæ percussis locus attollitur, cum duritiæ pustulosus. E plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior: sed toto cōcretu varicosus intumescit genitale intēditur: mēs labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore neruorum distenti commoriuntur. Ab aspidē iētis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander per pulchrē cecinit: At vir perit absque labore, virens atque discolor. Mediocris stōmachi dolor afficit: frens perpetuō reuollitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro, quē de medicaminibus & venenis condidit, de vocato basilisco scitē ita refert, Cum basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus eiaculantur, comites notæ ita se habent. Transseuntes utique ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus disse-remus.

Communis curatio in omnes iētus virulentos. Cap. XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis iētum. Quod venenum vibrat, oris suclio conuenit. Sugentem uerō oportet ieiunum non esse, sed & ci-

DIOSCORIDIS

bum sumpſiſſe, & vino os abluiffe: poſtea exiguum
 olei in ore continens plagam exugat. Locus ipſe
 ſpongia fouendus, deinde ſcarificandus: ſed vlcuſ-
 cula altius imprimere expedit, quo viroſa mates-
 ries profundo euocetur. Circinatio autem carnis,
 & ſectio, ſcarificatione longè potentius opitulan-
 tur: nanque ab ijs duo peculiaria præſidia ſiunt.
 Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod
 eius veneni pars, que ad interiora graſſatur, cum
 multo copioſoq; ſanguine excernitur. Quòd ſi locus
 ſectionem non admittat, cucurbitule cum largiori
 flamma adſigende ſunt. Sed iam de vſtione ſuprà
 in rabioſorū morſu diſſeruiſimus. Si verò iſta pars,
 vtpote extrema, eam ſectionem commodè non reſ-
 puit, præſertim in omnibus ſerpentium iſtibus,
 vt aſpidis, ceræſtæ, ſimiliumq; proculdubio ampu-
 tanda eſt. Conuenientiora ſuprà dictis auxilia
 ſunt, que epithemata vocant. Imponatur ſarmen-
 titius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio ſtillatitio ſuba-
 ctus, garo, & acris ſalsamento: porri, cepæ, & al-
 lia modo miniſtriſſime contrita illinuntur, modo cre-
 mata vulneribus inſiciuntur. Quinetiam diſſecti
 gallinarum pulli, cum maximè tepent, percuſſo lo-
 co applicentur. Nec deſunt qui hiſce tanquam diſ-
 cordia quadam naturali pugnantibus vtantur: ve-
 rum huius rationem inire facillimū fuerit. Galli-
 næ enim calida natura prædite ſunt, argumento,
 quod deuoratum inſigne virus cōficiunt, & aridiſ

sima quæq; semina consumant, item nōnunquam
 arenas lapillosq; ingluvie sua deuoratos, dissoluūt.
 Itaq; animātis admoti calore adiutus spiritus, ab
 ic̃ta parte impetū capeffens exiliensq; secum vene-
 nū exigit. Nec me fugit quid in Aegypto fieri so-
 leat. Cū spicas Aegyptij metunt, ollam picis para-
 tam habēt, & appensam fasciam: tunc enim ma-
 ximē serpentū iniurias expauescunt, tum propter
 spicilegij tempus, tū quod opacis simul abdite spe-
 luncis & cauernis, densoq; aruorum cespite delite-
 scunt. Molestissima enim animalia et virus eructā-
 tia, Aegyptus in cāpis ferre cōsuevit. Vbi ergo aut
 in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt,
 qui adsunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, &
 semel aut iterum brachiū aut crus paulū supra
 vulnus obligant, & arctissimē duo ē præsētibz
 distringunt, locumq; secantes, qua circumactus est
 laqueus, picem instillant. Cumq; satis vulnus exce-
 pisse videtur, laqueum resoluunt, & capis alijsq;
 suprā memoratis illiniunt. Præterea pix liquida cū
 sale trito & feruente illita, præsētaneo est auxi-
 lio, si iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & fi-
 mum caprarum ex vino decoctum. Locum aceto ca-
 lido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida
 muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam nō
 desunt emplastra vehementissima, & calidissima,
 quæ venenū elicere, expugnare, et discutere possūt.
 Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, &

DIOSCORIDIS

cachrye componuntur: de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephanti fel, crocodilue sanguinem, ouaq; testulinis, & consimilia. Nam cum iuuantia quedam literis tradidisse videntur, plane in hac sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quod nostra fides ijs obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum praestiterint. Quae autem ad communem omnium usum pertinent, quaeq; facile suppeditari, & omnibus a serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque, & erica, & astragalus, cum aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virentes platani pilulae in vino diluto coctae, & paliuri decoctum: radix aristolochiae, & eryngii: decoctae etiam lauri baccae & deuoratae, piperq; largius esitatum, ruta, anethum, et cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane aut allium, aut caepe, salsamentaq; quam acerrima: origani decoctum cum vino potum, scaenicali, pulegij, calaminthae, porrorumq; succus cum melle desorptus. Haec quidem a plantis conquiruntur. Ab animalibus vero quadam utiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum ex vino, itidem castorij sextans: testes mari-

nae testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxilia medica-
menta est. Comendatur in primis exenterata, quae
sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas
cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quae
dari solent, haecenus. Percussus à serpente prodest
alui deiection, disfluens sudor, urina copiose reddita.
Sunt & compositae quaedam potiones, quae mira
remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhae
singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur,
& instar Aegyptiae fabae dantur cum uino. Itidem
syluestris ruta seminis, gith, cumini Aethiopici, ari-
stolochiae, galbani, singulorum pares portiones tri-
te, & cum eruae succo subactae, digeruntur in pa-
stillos, qui drachmae pondus aequent: dantur ex ijs
terni cyathi cum uino. Haec habui de communibus
auxilijs quae dicerem. De peculiaribus remedijs con-
tra bestias, quae uenena uibrant, consequenter est
dicendum.

Peculiariora remedia uirulentorum
ictuum. Cap. XL.

INter ferientium uenenatorum notas nihil de
uespis et apibus articulatum digestimus, quod
conspicuae omnibus forent, & nihil excellens
aut notatu dignum in his observaretur: inter reme-
dia tamen, earum meminisse non fuit alienum.
Igitur aduersus utrarumque ictus prodest illita
malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-

DIOSCORIDIS

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fatus. Phalangiorum ictibus ficulneum cōnerē, adiecto sale trito, & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissimē tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactā. Vlcera aqua maris proluēda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinēda. Lauacris perpetim vtendum, & propinādum abrotono semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifoliae herbae semē: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina cōuenit. Item myrice fructus & chamæpityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluminalis cācri expressi succum, cum lacte, assumpto apij semine, cōfestim molestijs liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sed quā lenissimē tritus ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta sylvestris superponēda. Locus acidus muria fouēdus, & dāda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, presenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatū. Scorpis ipse, qui ictum vibrauit, tritus, & percusso loco impositus, suae plagae remedium est, ob cecam quandam naturam (vt constat) discordiam, quae antipathia appellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpis conuenit. Sulphur

ignem non expertum, resina terebinthina exceptū,
 & emplāstri modo adiectum auxiliatur. Itidem
 galbanum ad splenij formam ductū, & calamin-
 tha, quæ trita illinatur, & farina hor lei in vino
 parata, in decocto rute. Semē trifoliæ herbæ tritū,
 & vulneri iniectum opitulatur, Hæc ad affectum
 locum pertinet. Post hæc quàm efficacissimis por-
 tionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præ-
 sertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gen-
 tiana, & pulegium decoctū, & bacce lauri pau-
 co numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua
 magnopere discoqui debet: cupressus cum vino &
 ruta, nec secus ficulnæ lac, la serpitium, si adsit:
 sin desideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est
 potus trifolij, & ocymi semē. Horum autem om-
 nium vicem pēsant iugis lauacri vsus, euocatus su-
 dor, & dilute vini potiones. Ei, qui marina pasto-
 naca icitur, omnia quæ de viperarum morso paulo
 post referemus, simili modo conueniunt. Peculiaris-
 ter autem ictus à marino scorpione, & dracone in-
 feruntur, qui molestos cruciatus cient: interdum an-
 tem, sed raro, nomas excitant. Quibus absynthij,
 saluæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit.
 Pastinaca diuulsa & vulneri imposita, sui ictus
 medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur
 ex galbano splenium, per se vulneri exterius im-
 positū, vt medicamēti modo aceto tritum, & hordea-
 cea farina cū aceto mulso illita. Quinetiā mus ipse

DIOSCORIDIS

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
sui ueneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pu-
nici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita,
necnon aque calide fectus: sed hæc ad locum perti-
nent. Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si
in uino detur. Præterea serpyllum, & galbanum,
& cruca uino madefacta, recentes cupressi pilule
cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyre-
thrum cum uino, & chamæleonis herbe radix.
Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt,
tritum murem araneum contra suos ictus commo-
de bibi. Quam historiã apud alios inuentam, di-
gnam duntaxat censuimus, quæ amitteretur. Alij
asseruerant demorsum non aliàs exulcerari, nisi præ-
gnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari fe-
runt. Si uipera morsum impressit, finum caprinum
cum uino, studiose impositum opitulatur. Item lau-
rus, & abrotonum, & galbanum splenij loco sus-
periectum, & origanum uiride inditum. Pulli galli-
narum discerpti, & confestim admoti: erui farina
uino subacta: radice cortex usque eò tusus, ut in
puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum
chamæmelum hordeaceæ farine cataplasma in
aceto mulso preparatum: sed locus antè eo calido
foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos
ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam te-
nuifolio constantè auxiliari produunt. Leporini co-
agulæ in uino terui oboli bibuntur, et porracei succi
hemina

hemina in mero, & foliorum apiaſtri ſuccus, & ſylueſtris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia m. idenda, & capæ, & porri recentes, ſalsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc ſunt. Percuſſis à vipera præclare auxiliatur medicamētū, quod myrrhæ, piperis, caſtorei floris portulacæ ſeminisq; dimidio acetabulo cōſtat: hæc oīa in Cretico paſſo teruntur, aut in alio probato. Eraſiſtratus i eo libro, qui περὶ δυνάμεων, id eſt de viribus, inſcribitur, pleraq; alia tradidit, quæ iſtis ab vipera auxilium ferre poſſunt: inter quæ talia maximè laudātur, Gallinacea cerebella cum vino pota, ſemen ſatiuæ braſſicæ tritum, & acetabuli mēſura cum vino potum. Quinetiam bonum eſt digitum in liquidā pacē intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc ſunt, quæ contra viperæ iſtus auxiliantur. De amphiſebena mentionem hoc loco fecimus, quoniā ſerè remedijs ad viperas ſcriptis, percūſſi ab ea adiuuari ſoleant. A dryino iſtus conuenit ariſtolochia cū vino pota, trifolium herba, radix haſtule regiæ ſimiliter aſſumpta, et fructus ex omni quereus genere, & tuſæ ilicis radices, & illitæ parti iſtæ auxiliantur. Hemorrhoidiſadisq; morſus velut i medicabiles à plerisq; maiorū deplorati relinquebantur: quare ſi peculiaribus cōtradipſadē remedijs egeamus, cōmunia experiri operæpretiū erit. Protinus autē ſcarificatione vti, vſtionem facere, et ſi locus

DIOSCORIDIS

patiatur, extremorum amputatione opus erit: con-
 sequenter quàm acerrima cataplasmata admove-
 re, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit,
 acres cibos, maximè à salsamentis, vtilis esse. Me-
 racæ potiones et lauacra prosunt, quæ subinde in-
 teriecto breui spatio assumenda sunt, priusquam
 morbi genus emergerit: quo semel erumpente, opem
 ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmor-
 rhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune opi-
 tulantur, vt scarificationes, vstiones, acres cibi, me-
 raci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus.
 Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle tri-
 ta. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tri-
 tum & aqua subactum, lixiuia cum oleo indita,
 aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minis-
 tim contrita, & hordei farina cum aqua & mel-
 le colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ
 drachmæ in potione poscæ cyathis duobus deinceps
 marrubij succus, vel decoctum alterius cum vino.
 Fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio
 auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus,
 & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllū
 cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus
 vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item carda-
 momum & gentiana. Si cerasæ percusserit, cita
 partis amputatio suffragatur: quare sine mora
 ictam partem amputare, aut scalpro confestim
 circuncidere, & ijs similia prosequi oportet. Vren-

tia insuper reliquis admonenda, siquidem virus
 hoc veneno basilisci simile est. Is, qui ab aspidē fe-
 riuntur, quæ de ceraste scripta sunt auxilia dari
 debent. Nam venenum hoc, quemadmodum basili-
 sci, aut sanguis bubulus, celerrimè in arte-
 riis sanguinem cogit. Ad basilisci mor-
 sum, vt Erasistratus author est,
 auxiliatur castorii drach-
 ma in vino pota: item pa-
 paueris succus.
 Ictuum reme-
 dia ita se
 habent.

SEXTI ET VLTIMI
 LIBRI FINIS.

Mm ij

NOTHA ET DIOSCORIDI

falso adscripta, quæ ut facile, si quis
ita uelit, suis singula locis appli-
centur, numeris notantur.

5. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thelpide, ab
alijs vrania, à nonnullis catheron aut thaumae-
stos, à Romanis marica radix, à quibusdam gla-
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecratrix, ab
Aegyptijs nar appellatur.

6. Aliqui choron aphrodisias, Romani vene-
ream, aut radicem nauticam, Galli piper apium
vocant.

6. Romani iunci radicem aut iuncum.

9. Magi sanguinem Martis, Latini perpensam,
alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij cerea,
alijs nardum rusticum, Galli bacchar, Hetrusci sue-
cium: odorata herba est, qua in coronamentis
utuntur.

10. Quibus odor inest cinnamomo proximus:
asperum siccumque solum amat. Eius radix, ru-
ptis, conuulsis, in tussi vetere, & spirandi difficul-
tate, & si vrina ægrè redditur, opifera est: menses
ciet, contra serpentium ictus, eam in vino bibere
salutare est. Folia, ut quæ adstringant, illita capie-
tis doloribus, oculorum inflammationibus, incipiē-

NOTHA.

tibus ægyptijs, mammis tumentibus à partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Crateas herbarius de eo ita scriptum reliquit: Asarum.

14. Alij sphagnon, alij phasganon, Syri diaxyelon vocant.

16. Ab aliquibus caſtor, ab alijs cynomorphos, à Magis Herculis sanguis appellatur.

16. Symphyton aliqui vocant, alij persicam, alij medicam, alij oreſtium, alij neſtario, alij cleoniā: alij ideamboton, aut phlomū idem, Latini terminalem, aut enulam campanam, Aegyptij lenen.

36. Iuniperum paruum Græci arceuthida, aliqui mneſitheū, alij acatalidem. Aphrixuorinſipet, Aegyptij libyum, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant.

37. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus magna, quā aliqui ſylueſtrē cupreſſum appellāt, alij mneſitheū, alij acaterā, Romani iuniperū, vulgò cognita eſt, cupreſſo aſſimilis: aſperis maritimisq; locis plerūq; nascitur, eaſdē quas ſupradicta vires habēs.

37. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Romanis herba Sabina appellatur.

40. Rhamnum alij perſephonion vocāt, alij leucacantham, Romani ſpinam albam, aut cerualem ſpinam, Aphri atadin.

40. Halimum alij damafonium vocant, alij erymon, alij britanicam, alij ihabdon, alij baſilion, Magi Mercurij baſim, aut Oſiridis diadema, alij

M m iij

D I O S C O R I D I S

ely Stephanon, aut sacrū caulē, Pythagoras anthe-
noros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascaluri,
alij asariphen, Latini albucium aut ampeluciam.

45. Agnon aliqui agynon, alij lygon vocant, alij
amictomienon, alij tridactylon, Magi semnon, alij
hamaideos, Aegyptij sum, Romani salicem maris
nam, alij piper agreste, alij lecristicum.

63. Eorum venter sale conditus, & in vmbra
siccatus, contra eximias vacuationes medicamen-
torum, trium drachmarum pondere, presenti est
auxilio: quādoquidem protinus deiectiones cohibet.
Teri autē debet in farinā, et aqua subactus dari.

81. Telin, alij carpon, alij buceron, alij egocerō,
alij ceraitiden, Latini scenumgræcum appellant,
Aegyptij itasin.

82. Aliqui linocalamin vocant, alij annon, alij li-
non agrion, Romani linum, Pœni xeraphoes.

84. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij bre-
chon vocant.

85. Gongylen satiuam, alij gongylida, alij golz-
gosium, Romani rapum vocant.

85. Alij polyides eryngium, Aphri thorphat

86. Syluestris raphanus quam Romani armo-
raciam vocant, alij montanum raphanum, alij
apium, alij ischada, alij chamebalanum. Romani
etiam radicem syluestrem: ramulos tenues, iūceos,
duos siue tres spargit, ruentes: solijs rute sylue-
stris, oblongioribus, & angustioribus: semine par-

uo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyrri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radicis superior vomitione bilem pituitamq; extrahit, inferior per aluum, tota susq; deq; purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesqui obolo potus, vtraque parte purgat.

86. Romani napium dicunt.

86. Aegyptij echlotoripam appellant, alij riplā, Romani blitum, Daci bles.

86. Pythagoras anthema vocauit, Zoroastres diadema, Aegyptij chocortem, Magi lienem caprae, aut muris vrinam.

87. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aegyptij ochi vocant.

87. Cramben Romani brassicam vocant.

87. Romani rusticam appellant.

88. Portulaca syluestris. Cap. Syluestris portulaca, quā aliqui aizō syluestre vocāt, alij telephio, Romani illecebrā, aliqui portulacā, Aphrimœmoē, Daci lax, Aegyptij mochmutim, folijs pusillis, ad satiuā accedētibus, hirsutis, latioribus. nascitur in petrosis, nonnunquā in hortis, folia oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubētes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui māducati bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantū salusti. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discuit

DIOSCORIDIS

Arum, cum axungia illita.

89. Aliqui petreon, alij myacanthan, alij myon vocant.

89. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probac tion, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij poly neuron, Magi eurenemona, Aegyptij asonth, Ro mani plantaginē, Hispani thesaricā, Pœni atjrcō.

90. Syrius plantaginis, & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, das tum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

90. Aliqui aquatilem anagallida, alij darenion, alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

90. Alj Veneris coronam, Romani veneream, aut eusteralem.

90. Aliquibus ammonos, alj astrion, Pœnis atirsite, Romanis caciatrix, alj stilago, alj sanguinaria dicitur.

91. Sonchon asperum alij cichorion vocant, Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

91. Alj picrida appellant, Aegyptij agon, Roma ni intubum.

92. Thridaca hemeron, Romani lactucam sati nam, Aegyptij embrosi dicunt.

92. Magi sanguinem Titani, Zoroastres phe rumbrum, Romani lactucam sylvestrem appellāt.

93. Romani bisacutum, Aegyptij dorisatru, Sya

NOTHA.

ri adonium, Aphri tirieta appellant.

93. Romani herbam scanariam, aut aculam nominant.

93. Alij caucum, alij myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem pulli, Aegyptij seselin vocant.

93. Euxomon Romani Erucam vocant, Aegyptij ethrericem, Poeni asuric.

93. Alij cynomoriō appellant, à similitudine canini genitalis, alij leonem, Cyprij thyrfinem, communiter lycon.

95. Crommyon aliqui polyidos vocant, Magi calabotim, Romani cepam.

95. Greci scorodon, alij geboscon, alij elaphoboscon vocant.

96. Romani sinape vocant.

97. Cardamon alij cynocardamon, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romanis nasturtium dicitur.

97. Aliqui thlaspidion, alij sinapi Persicum, alij myiten, alij sylvestre synapi, alij dasmophon, alij myopteron, alij bitron, Aegyptij sui tempsum, Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedengalinaceum vocant.

97. Aliqui chamæplion, Magi Herculis alphita, Aegyptij erethmon.

99. Ab aliquibus cerdon, ab alijs catharsis, ab alijs struthocamelus, à quibusdā chamærrhytō, à

DIOSCORIDIS

Magis callirrhytō, ab Aegyptij ceno, à Pœnis syris,
à Latinis lanaria herba. aut radícula appellatur.

99. A quibusdam cissanthemon, ab alijs cisso-
phyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron,
ab alijs silene. à Zoroastre triūphalites, ab Osthane
aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesce, à Ro-
manis rapum terre, aut terre vmbilicus, ab alijs
arcar vocatur.

100. Dracunculus. Cap. Draguntium magnum
aliqui aron, alijs isaron, alijs iarō, alijs hieracium, alijs
biaron, alijs arniagrion, alijs ciperida vocāt: in vmbrosis
sepibus gignitur. Caulem habet rectum, le-
uem, diuum cubitorum, baculi crassitudine, versico-
loribus draconum maculis, purpureis tamen euin-
centibus: folia rumicis, inflexa. fructum summo
caule facit, racemosum, coloris primum cineracei,
mox per maturitatem in crocum & purpurā ver-
gentis: radicem prægrandem, rotundam, cādulam,
cortice tenui vestitum. Colligitur, & dum matus-
rescit, succus exprimitur, siccaturq; in vmbra. Ra-
dix quoq; messibus effoditur, elotaq; particulatim
conciditur, & funicula transfixa siccatur in vmbra.
Cum diluta potione, crudam coctā melle, cum
melle delingi prodest, contra orthopnœas, rupte, cō-
ualsa, tussim, & destillationes: pota cum vino ve-
nerem stimulat: vlcera que cacoethe vocantur atq;
que phagedenica, expurgat, præsertim cum vite al-
ba, ex ea & melle collyria ad fistulas. & partus

evocandos componuntur: ad vitilignes cum melle
 efficaciter illinitur: polypus & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra
 nubeculas, caliginem, albuginesque effectum præbet:
 herbarum radicisque odor, teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta grana eius in posca bibantur.
 Sunt qui eius succum cum oleo aurium doloribus
 infundere: quinetiam folia, utpote quæ adstringant,
 vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino
 pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem
 exemerit, posse à vipera feriri inficiantur.

101. Aliqui alimon, alij thymon, alij draconiam,
 Cyprii colocasion dicunt.

101. Græci asphodelon, alij narthecion, Romani
 albuicum vocant.

101. Floret mæsis albuicum. Quare æquinoctio
 verno, antequam semine adoleuerit, demetendum. Radicem
 aiunt potam, Veneris cupiditatem inhibere,
 quod herbarius Crateuas assuevit: addiditque sanare
 podagræ dolores, si drachmæ potere bibatur.

102. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe impositi,
 tumores ac tubercula velocissime ad suppurationem
 perducunt, & rumpunt.

103. Aliqui cynosbaton alij capriam, alij coru-
 malum, alij ophioscorodon, alij phyllostaphylon,
 quidam thalliam, aut petræam, alij olophyton,
 alij ionitem, nonnulli oligochloron, aut acotion,
 aut hippomanes, alij trichomanes, Magi po-

DIOSCORIDIS

tera, alij pentheron, aut cor lupi, alij alofchorodon,
alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi
aut inturim, Aphri herbie athon.

104. Ranunculum aliqui sylvestre apium vo-
cant.

104. Anemonem, alij agriam, aut nigram vo-
cant, alij anemonen phoenicam, alij enemion, non-
nulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinen,
aut harbylan, Osthanes berilion, item ornios cera-
nio, Pythagoras attractilida, Magi cnicū agriam,
Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

105. Aliquibus anone vocatur, alijs anthemis,
alijs homonoea, aliquibus flos campestris, Roma-
nis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia, Gallis
corona.

105. Ea, vt herbarius Crateuas author est, con-
trita cum axūgia, strumas discutit. Cribrata eius
farina cum nitro, & sulphure ignem non experto
contra vitilignes efficax est: easq; sicco linteo an-
tea cōfrictas in balneis sanat: facit & ad scabiē.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone,
quam artemonem aliqui, alij arselam, aut sarco-
collam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syl-
vestri papaueri similis est. Recens trita interci-
siones impositu sanat. oculorum inflammationes
mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur:
vulnera conglutinat: convulsis, & vellicatibus im-
posita medetur, inflammationibus utilis, contra

NOTHA.

Serpentium morsus cum vino bibitur.

105. *Anagallis purpurea*, quibusdā *aeritis* aut *agitis* vocatur, alijs *sauritis*, Magis oculi sanguis, aut *chelidonium*: Romanis *macia*, *Hetruscis* *masytipos*, *Gallis* *sapana*, *Dacis* *cerceraphron*. *Anagallis* communis, quibusdam *corchoron*, alijs *halicacabon*, alijs *xeliaurus*, Magis *nycteritis*, *Aegyptijs* *mecij*, Romanis *aneciaton*, *Aphris* *asirrisæ*.

105. *Aliquibus* *citharō*, alijs *cissaron*, alijs *chrysocarpos*, alijs *poetica*, alijs *corymbethra*, alijs *cysion*, alijs *dionysia*, alijs *ithytheriō*, alijs *persis*, alijs *cemos*, alijs *asplenos*, Romanis *sylva mater*, alijs *hedera*, *Gallis* *suibites*.

106. *Chelidonium* magnam nonnulli *pæoniam* vocant, alijs *crateam*, alijs *ajbium*, alijs *glauciam*, alijs *pandios* radix, quidam *philomedion*, alijs *othonion*, *Romani* *fabium*, *Galli* *thonan*, *Aegyptij* *mothoth*, *Daci* *crustana*.

107. *Auricula muris*. *C. p.* *Myosota* alijs *myoson*, alijs *anthyllion*, alijs *alsinen*, nonnulli *myorthoscon*, alijs *myrthosplenon*, *Latini* *muris* *auriculam* vocant, *Aphri* *labatholabat*. Nomen ideò accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur. *Lucos* & *fabulosa* loca amat, ideò *alsine* dicta est. Ea *helxine* similis, sed *humilior*, ac folijs *minor*. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflammationibus convenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur: in totum eadem po-

DIOSCORIDIS

test, quæ helxine.

107. Asatis satina aliquibus augion, alijs egne. Magis arusion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

107. Sed sciendum est, ne tra lita errorem pariant, satium glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos lingue speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulemq; supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre vero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiore. florem purpureum, aut coeruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito. diuisum.

107. Aliqui sylvestre semperuium, alijs portulacum sylvestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptijs anoth, Aphri atirtopurum.

109. Aliqui rhian vocant.

109. Aliqui centauriam radicem, alijs aloen Gallicam, alijs narcem, alijs chironion, Dardani aloitin, Romani gentianam aut cicendiam, alijs ciminalē vocant.

110. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

110. Appellatur à quibusdam ararisa, & mele caprum, ephestios, lestitis, pyxionyx, Dardanion, iontitis, Gallis theximion, Aegyptijs sophoeph, Siculo chamamelon, Italis malum terre, Dacis absyru

NOTHA.

thium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus: & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si nidore subditis carbonibus sebricitans suffiatur, febris leuabitur. vulnera impo-
sita sanat: carcinomatis narium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest. rigoribus me-
detur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;. Crate-
nas herbarius, & Gallus, eadem de hac tradiderunt, & praeterea podagricis eam auxiliari.

110. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithra, alij libyestason, alij homœnomenœon, alij peenthaomœon, Latini dulcem radicem appel-
laere.

110. Aliqui narcem vocant, alij lymneson alij maronem, alij plectroniam, alij chironiam, alij limnestim, Magi Herculis sanguinem, Romani phie-
ri, & vneseram, & sel terre.

111. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnerum vrinae stillicidia, calculosorum cruciatus, clyster-
re immissa sedat. Legitur matutinis, sola ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumie-
ne complentur.

111. Aliqui limneson, alij helleboriten, alij amarathon, Magi Herculis sanguinem, Latini se-

DIOSCORIDIS

brifugam, alij auram, multi radicem, Daci tulbelā appellant.

111. Quibusdam chrysisceptron, alij ixia, Romanis carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur, alij ephthofechin.

112. Pancarpon aliqui, alij vlophonon, alij ixiā alij cynomaxon, alij ocimoides, alij cnidion coccon, alij cynoxylon, Latini carduum nigrum aut verni luginem, Aegyptij sobel vocant.

112. Aliqui crocodilion vocāt, alij chameleonē, alij onoc.irdion, alij Veneris lauacrum, Romani labrum Veneris, alij Carduum Veneris, Aegyptij seneor, alij chir, alij meleta, Daci sciaram.

113. Aliqui agriocinnaram, alij donacitim, alij erysisceptron vocant, Romani spinam albam aut regiam, alij carduum ramptarium.

113. Quaeacanthis aliquibus dicitur.

113. Aliās pherusa, aliās pyracantha nominatur, in Aegypto cnus.

113. Aliqui phrynion, aliqui acidoton.

113. Acantham aut herpacantham, quidam melampyllon, aliqui topiariam, alij mamolariā, quidam crepulam vocant.

114. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij ischiada vocant, Romani spinam albam.

115. Aliqui eryngē, alij erynerē, alij caryon, alij gorginion, alij hermiō, alij origanū, chlounion, alij myac anthon, alij moly, Aegyptij crobysen, Magi
syferton,

NOTHA.

syserion, Romani capitulum Martis, Daci sicupnoex, Hispani centumcapita, Aphri cherdam, alij orōam chloem, alij chida appellant.

115. Aloe aliquibus amphibion, alij herminion, alijs cryngion, alijs tragoceros, Romanis aloa, Barbaris aloe dicitur.

116. Aegyptij somi, Romani absynthium.

116. Latini Sandonicum vocant.

117. alij abutumon, alij absynthium, alij heraclion, alij cholopæon, alij absynthiomenon, alij thelypthorion, alij procampylon, Magi æuraphænicos, alij cynanchitē, Romani absynthium ponticū, nonnulli thelythamnum, alij glycin ancona vocāt.

117. aliqui later vocant, alij cassialā, Aegyptij pesalem.

117. aliqui syncliopa, alij alcibiadem, alij pancration, nonnulli styphoniam, Aegyptij suphlo, Magi pythonis oculum, Romani sciolebinam vocitant.

118. vers. vlt. Glichona alij blechron, alij arsen canthon, Latini pulegium vocant, Galli aluolum, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

119. alijs embactron, alijs belouacos, alijs artemedeion, alijs cretica, quibusdam ephemeron, nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion, aut helbunion, Romanis vstilago rustica.

119. alij elaphoboscon, aliqui phacon, alij ciosmin, alij phagnon, Aegyptij becion, Romani salz

N n

DIOSCORIDIS

wiam vocant.

120. Hedyosmon sativum alii minthā, alii calamintham, Latini mentham vocant, alii nepetā, Aegyptiis, alii pherthrumerthumonthu, alii perko, alii maceto.

120, quidam cephaloton, alii epithymida, alii thyrison, Latini thymum, Aegyptiis Stephanen, Daci mosulam.

121. aliqui zygin sylvestrem, alii polion vocant, Aegyptiis mernopyum, Latini serpyllum.

121. aliqui nominant amaracum, alii triphylalon, alii agathides, alii cnecion, alii acapuon, Pythagoras thramben, Aegyptiis sopho, Armeniis myron, Magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini maioranam.

122. aliqui origanida, aut hysobriū vocant.

122. alii sylvestre basilicū, Latini ocimastrū.

122. ruta montana, quam aliqui rhyten montanam vocant: & hortensis, quam Aegyptiis epnubum, Syri harmala, alii besasa, Aphri churma.

123. Sylvestris ruta Cap. Rutam sylvestrem aliqui appellant hypericon, alii androsemon, alii coron, alii chamapitin, Romani hederalem, aut cetonalem, Aphri churma semmaced, odor seminis resinofus est, ideo chamapitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia ruta figura: flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant, unde androsemon vocitarunt. Ramulū

NOTHA.

subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus
semen nigrum resinam olens, gignitur incultis &
asperis. Vrinam ciet, menses appositum trahit, pota
cum vino quartana liberat. Folia cum semine am
bustis illitu medentur, & diebus quadraginta epo
ta ischiadicos sanant.

124. aliqui sylvestre leucoion appellant.

126. aliqui cerascomen vocant, Latini rusticā
pastinacam, aliqui carotam, Aegyptii babibylon,
Aphri sicham.

126. nonnulli sphagnon vocant.

126. Aegyptii cyonum phricem vocant.

127. Anethum quod estur, aliqui polgida vo
cant, alii anicetum, Magi cynocephali genituram,
aut capillos, alii Mercurii semen, Latini anethum,
Aphri sicciriam Aegyptii arachu, Daci pulpum.

127. siue cuminum syluaticum.

128. Ammi, Latini ammium Alexandrinum,
quidam regem cuminum appellant.

128. Aegyptii ochion vocant, Aphri goed.

128. aliis sonchites, Romanis lampuca, Poenis si
thileas.

128. aliqui sonchiten, alii entimon agrion, Ro
mani intybum sylvestrem uocant.

129. a quibusdam pedinon, ab aliis hydrofelie
non agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

129. aliqui petroselinon sylvestre appellant,
Aegyptii anonim.

Nm ij

D I O S C O R I D I S

129. aliqui grielon, alij agrioselinum.

130. aliqui elaphicon, alij nephron, alij ophigenion, nonnulli ophioctonon, aliqui herpycen, alij lymen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij chemin, Aphri ascaucau.

130. hippomarathron, aliqui marathin, alij marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, Magi thymarnolion, Latini fœniculum erraticum, aliqui mion, Galli sistrameor.

131. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs paraly sis, alijs camarus, alijs hyacithus, alijs delphinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron, aut cronion, Romanus bucinus minor vocitatur.

131. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij pyrotō, aut pyrothron, alij arnon pyriten, Magi pyriten, Romani saluarem vocant.

131. aliquibus xea aut campsanema appellatur.

132. aliqui arangem vocant, alij phalangion, alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, quidam chorodanon, aut xenanthen, Romani herbam rutinalem, Aegyptij apsapher, Magi osirin.

133. aliqui agrion vocant, alij agriophyllō, Magi bonum demonem, Romani satariam.

134. aliqui melanthium, alij mecona agriō melana, Romani papauer nigrum appellant.

137. herba est, ex qua ammoniacum fit suffimen, quod thymiama vocant, aliqui agaxyllon,

NOTHA.

aliū criotheum, aliū heliustrum, Romani guttam.

138. aliqui ampelocarpon, aliū omphalocarpon, nonnulli philanthropon vocant.

138. aliqui aspidion, aliū haplophyllon, aliū accyseton, aliū adyseton nuncupant.

138. aliqui cission, aliū cissophyllon.

138. aliqui armyrō vocant, aliū enicō sylvestre, aliū aspidion, Magi aphedron, Aegyptij chenō, Romani præscipiū, aliqui fusum agrestem, aliū colum rusticam.

139. quidam clinopedion, aliū polygonaton, aliū Iouis colum, aliū echeonymon vocant.

139. Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ violentie vocantur, magno esse præsidio.

139. aliqui cleonicon, aliū ocimoides, aliū xopyron vocant.

139. aliquibus leontopodion, aliū leuceoron, alijs leontion, alijs doris, aut doriçteris, alijs lychnis agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rhapezion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Romanis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

140. aliqui athanathon uocant, aliū acylonion, aliū ballarion, aliū geranopodion, quidam corymbion, aliqui taurion, aliū sceptron, aut maloion, Aegyptij semeon, Magi sanguinem apocathemenes, Romani genicularem aut ballariam.

140. aliàs tragonaton, aliàs atocion, aliàs hiera

N n ij

DIOSCORIDIS

capodion, aut lampas vocant, Aegyptiis semura,
Magis apocathemenes taurus, Romanis agreste in
tubum.

140. Crinō basilicon alii crinanthemon vocāt,
alii gallirion, Magi Martis sanguinem, Osthane
aurem crocodili, Aegyptii symphæphon, quidam
trialō, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Syri sasa,
Aphri abiblabon.

140. Alii magnū vocant, aliqui naphthan, alii
notiano scemin, alii nosprasson, alii nothera, alii no
ehelin aut nostellin, alii nophryn, alii gnotorim, alii
gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut ulce
rariam, aut marrubium nigrum, alii canthurinū.
Aegyptii asphon, magi Isionis sanguinem.

140. Alii melyteon, alii meliphyllon, alii erys
thran, alii temele, Latini apiastrum aut citraginē.
Galli merisimorion vocant.

141. Prasion, alii eupatorion, alij phyllophares,
alii tripedilon, alii camelopodion, Aegyptii asterō
pen, Magi tauri sanguinem, aliqui aphedron, alij
Horigenituram, Latini marrubium, aliqui labco
niam, Aphri atierberziam.

141. Aliqui phyllia, alii acaulon, alii sylvestre
lapathum vocitant.

141. Aliis leucacantha dicitur.

141. Alii cnicion vocant, Romani trifolium acu
tum, aut odoratum.

142. Polium montanum, aliqui temhrion, alii

NOTHA.

pheux aspidion, alii achamenin, alii ebenitin, alii melosmon, nonnulli belion, quidam leontocharon vocant.

142. Aliqui scorbion, alii pleuritin, alii disosmō, alii syluestrem calaminthen, quidam chamædryn, alii mithridanion, Magi Podotis sanguinem, Aegyptii apho, Romani trissagmem palustre appellant.

143. Pechion quidam rhechion, alii petrinam vocant, alii peganon, alii pithion, alii pagonaton, alii chamæleucem, alii procheton, alii arcophyton, alii chamægeron, Aegyptii saarthan, Latini tussilaginem, quidam pharphariam aut postulagine, Bessi asa.

143. Quibusdam polyclonos, alii monoclonos, alii toxitesia, alijs ephesia, alijs anaetorios, alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, Magis hominis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanis valentia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia, alijs rapiu, aut tertana, Gallis pona, Dacis xuoſte dicitur.

143 Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sampsiuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laboras, herbam cum amygdalino oleo bene contundat in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur: qui nervorum dolore cruciatur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

143. Romani caprum sylvaticum vocat, quidam

Nn iiij

DIOSCORIDIS

botryn, alij apium rusticum, Aegyptij merseon.

144. Aliqui Pelonitum, alij tricam, alij geranogeronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen appellant.

144. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij oxyphyllon, alij cardamomon, alij origanum vocant, Magi hierobryncas, Latini gruinam, aut pulmoniam, aut cicotriam.

144. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocon, alij anaxiton, alij anaphalin, Aegyptij semeon, Galli gelasonen, Latini centunculum vocant, quidam tucularem, alij albinum.

144. Aliqui cerascomion, alij leucanthon vocant.

144. Conyza magna. Cap. Conyza magna aliquibus cynoxematitis, alijs danais, alijs tanachio, aliquibus phycos, alijs ischys, alijs dynosmos, Magis brephoctonos, quibusdam anubias, nonnullis hemedias, Aegyptijs ceti, Romanis intybum, aut militaris, aut deliarium, aut febrifuga, alijs phragmosa, alijs musteros, alijs pissa nuncupatur.

145. Aliqui conyzam parvam, alij panion, alij libanotidem, Magi cronon vocant.

145. Alij hemerocatalacton, alij crinon agrio, alij crinanthemon, alij porphyranthes, alij bulbum hematicon, alij anticantharon, Aegyptij iocri, Romani bulbum, aut lilium sylvestre, aut marinum, Aphri abiblabon vocant.

NOTHA.

145. Aliqui basilicon vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

146. Alij melion aqueum, alijs entaticō, alijs priapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

146. A Latinis geminalis, à Dacis hormia dicitur.

147. Aliqui osinada, aliqui ononin, alijs phlonistin appellant.

147. Hanc nymphona alijs vocant.

147. Sunt qui picrada appellant, alijs leucen, alijs thalassiam.

147. Alijs pteryx, alijs lonchitim, alijs aturion, alijs phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodoten, Magi mustele sanguinem.

148. Quidam anthyllon, alijs anthemida vocāt, alijs eranthemin, alijs leucathemon, alijs soranthin, alijs campestrum florem, Romani solastrum.

148. Anthemida aliqui leucanthemon, alijs eranthemon, quoniam vere floreat: alijs chamæmelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melanthemon, alijs chrysocomam, alijs calliam, Romani mælium, Aphri asteriphen appellant.

149. Alijs anthemida, alijs leucanthemō, alijs chamæmelon, alijs chrysocalin, alijs melabathrō, nonnulli campestrum florē, Romani solis seculum aliqui millefolium. Hetrusci autam, Aphri thamath.

D I O S C O R I D I S

149. Alij balsamenam, Magi hemorrhan, alij Mercurij genituram, alij aphthitis semē, aut mne sitheum, Romani Cappacoraniā, Aphri narat.

149. Alijs orobeliō, quibusdam orobax, alijs hemagogon, alijs pæsedon, alijs monogenion, alijs menio, alijs pæoniō, alijs pæthiceratos, alijs idei dactyli, alijs aglaophotis, alijs theodonion, alijs seleniō, Magis selenogonon, alijs phthisis, Romani casta.

150. Alij egonychon vocant, alij leontion, alij leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tantalitin, alij diosporon, Romani columbam, Daci gonoleta, alij heracliam.

150. Aliqui tetrion, alij dracanon, alij cinnabarim, Latini rubiam, Hetrusci lappam minorem, Aegyptij sophobi vocant.

150. Alias cestron aut medusa dicitur, Latine venerea aut lanceola.

151. Latini longinam, aut calabrinam dicunt.

151. Alij alithiocon vocant.

151. Aliqui cannabion, alij schinostrophon, alij asterion appellarunt.

151. Aliqui hydrastinam, Romani terminalem dicunt.

152. Aliqui acopon, alij anagyron, alij agnacion, vocant.

152. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

152. Aliqui onobrochilon, alij eschasinenen, alij hypericon, alij corion, alij chamæpytis, Romani

NOTHA.

opaeem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocinalē,
Daci aniaffexe appellant.

153. Alij ascyron, aut dionysiadem.

153. Alijs pitysorysis, alijs orixelon, ijs qui Pon-
tū incolūt olocyrō, alijs bryonia sylvestris, Athenis
ionia, Eboicis sideritis, Magis Minervae sanguis, La-
tinis aiaga aut cypripū, Dacis dochela appellatur.

154. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pra-
tis & montibus, locis mundis, & opacis, circa fru-
tices. animas hominū & corpora custodit, nocture
nas ambulationes, & loca sancta: grauibus som-
nis resistit: ad omnem medendi vsum cōmendata.
Radix habet rubram, odoratā, porracea folia,
medio eorum puniceo, in recto calamo triangula,
floribus in cacumine purpureos. Farina recētis vul-
neribus capitis indita, dolorem finit: vulnera gluti-
nat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi de-
bet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iu-
re decocti perfundatur, aut temporibus cum bitu-
mine illinatur, aut radix suffiatur.

155. Aliqui polygonatum appellant, alij cyno-
chalam, alij heraciam, alij asphalion, alij chilio-
phyllon, alij clemā, alij polycarpō, alij carcinethrō,
alij teuthalida, alij myrtopetalon, alij cnopodion,
alij xaritheam, alij pedalion, Aegyptij thephin, ali-
qui stemphin, Magi genituram heros, aliqui vn-
guem muris, Latini sanguinariam aut seminalē,
Aphri chulum.

DIOSCORIDIS

156. Alijs philetæron, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

156. Aliqui epigetm, Aegyptij philacum, Romani ambuxum vocitant.

157. Romani soldaginem vocant.

157. Rutaceis similes.

157. Alij tobion, Romani stipam vocant.

157. Alij calycanthemon, alij periclymenon, alij heliophyes, nonnulli hepatitim, alij milacem, alij anatolicon, alij diticon, alij merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptij oxyui, alij clymenon, alij clymenion, quod & agonon nuncupant.

158. Aliqui Aeginam, alij clymenon, alij carpathon, alij splenion, alij epatitim, alij axinam maiorem, nonnulli clematitim, alij myrsinen, alij calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

158. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauroceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

158. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon, aliqui sarxiphragon, alij empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: Strangurie prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit, & urinam ciet.

158. Aliquibus potamogiton appellatur.

NOTHA.

alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mysijs mendruta, Syris neuda, alijs lycosemphyllon: alijs helleborosemata, alijs scyllion, Magis lus icor, Romanis viartum nigrum, quibusdam tintinabulum terre, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

158. Aliqui leporis cuminum appellant.

159. Aliqui medicam appellant, alij triphyllō, alij clemation, nonnulli osmon, quidam trigonon, alij cypellion, alij polyphyllon, Romani trifolium odoratum, Aegyptij epaphon.

159. Ab alijs erineos, ab alijs thrias, à nonnullis pollyrrhizon, à Romanis vindicta nominatur.

159. Aliqui anaetorion, alij phasganō, alij macharonion, alij arion vocant, Romani gladiolam, quidam genitalem.

159. Alij bolon vocant.

159. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos, à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis aprus dicitur.

160. Anchusam aliqui catanchusam vocant, alij libycam, alij archibellion, alij alcibiadion, alij onophyllon, alij porphyrida, alij mydusam, alij sallyca, alij noneam, Aphri buinesath.

160. Aliqui aridam, alij alcibiadion, Romani alcibiacum nominant.

160. Aliqui & hanc echion vocant, alij scorpiuron, alij sparganon, alij altheam, alij amarantida, alij probateam, alij elaphiō, alij antiminō, alij

DIOSCORIDIS

porphyrida, alii augion, alii nemesion, alii philetes-
rion, alii hyenopsolon, alii thyrsitim, alii thermus-
tin, alii misopathos.

161. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

161. Agrostin aliqui egicon, alii amaxitin, Aeg-
gyptii amphivocant, Latini gramen, aliqui asy-
phyllion, alii sanguinalem, alii violam, Hispani
apuriam, Da. i cotiatam, Aphri iebal.

161. Magi genituram, aut sanguinem Titani,
alii scorpionis urinam, Pythagoras parmiron, An-
dreas xanthophanea, Osthanees beephthalmion,
Aegyptii sendionor, Romani vertemum, alii so-
teastron, Aphri udedonin.

162. Aliqui myriomorphon nominant, alij chi-
liophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, Latini
supercilium Veneris, alij acron sylvaticum, alij mi-
litarem, alij millefolium.

162. Batos, ab alijs cynosbatos, ab alijs selinori-
tio, ab alijs asyntrophos, à Magis Titani sanguis,
ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus, ab alijs
fentes, à quibusdam mora baticana, à Dacis man-
tia, Aegyptijs hemoos, alijs ametros appellatur.

163. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani vo-
lucrum maius.

163. Pentaphyllon aliqui pentaperes, alij penta-
tomon, alij pentadactylon, alij pseudoselinum, alij
callipetalon, alij xyoloton, nonnulli xylopetalon,
alij asphalton, alij pentacenon, alij thymiatitin,

NOTHA.

Aegyptij orphitebeocen, alii enotron, Magi ibidis
vnguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon,
Romani quinquefolium, Galli pempedulam, Daci
propedulam appellant.

163. Aliqui rhon, alii anchinopa, alii phœnica-
pteron, alii rhon stachyos, alii osthaleu, Aegyptii
athnon nominant.

164. Alii rhodida nominant.

164. Hippurin, alii trimachion, alii anabasin,
alii cheredranon, alii phædran, alii itiandendron,
alii gis, alii schœniostrophon vocat, Aegyptii pher
phram, Magi Saturni cibum, Romani equinalem,
alii equi salicem, aut anabasion, alii ephydron.

164. Aliqui equition, & alii chedran, alii gy-
non, Romani salicem equinam appellant.

164. alii scorpion, alii garganon, Romani cornu
lacam, alii bituensa, Daci saliam, Aegyptii sober,
Aphri achæosim.

165. Oxyschœnos aliquibus schœnos levis, aliis
oxypternos, aliis Solis supercilium, Romanis iucus
marinus, aut manualis, Aphris chudua dicitur.

165. Aliis adocetos, aliis neuras, aliis phrynion,
Romanis bouinalis.

165. Aliis chrysitis, aliis chrysanthemon, nonnul
lis amaranton, aliis diospogon, Aphris dubath,
vel burchumath, Romanis Iouis barba appella-
tur.

165. Aliqui chrysspermon vocant, alii da-

DIOSCORIDIS

spin, alij origanon, alij arcophthalmon, Romani
arilariam.

166. Aliqui chalchitin vocant, alij chalcathon,
alij chalcanthemon, Romani acantham, Hetrusci
garuleum, Aphri churseten.

166. Alij trigonion, alij bunion, alij hierobotas
nen, alij philtrodoten, Aegyptij pemsempe, Magi Is
nonis lacrymam, nonnulli mustela sanguine, alij
sanguinem Mercurij, Romani cristam gallinacea,
alij pheriam, alij trixalidem, alij exuperā, aliqui
herbam sanguinalem.

166. Alij erigenion, alij chamelycon, alij sideri-
tin, quidam curitin, alij persephonion, alij Iouis co-
lum, alij dichromon, alij callesin, alij hipparison,
nonnulli demetriada, Aegyptij pemphihenphtam,
Pythagoras eryscisceptron, Romani cinnamolem.

167. Aliqui chamefycen, alij gatalen, alij onyo-
cha vocant, Romani pinum triuam, aut ficum ter-
re, aliqui glandulam alij tium, alij nonariam.

167. Aliqui heloniam, alij porphyranes, Roma-
ni vaccinium, alij vlcinum vocant.

167. Nonnulli oxytonon, Romani papaueralem,
Aegyptij nanti.

167. Papauer satium aliqui chamefycen, alij
papauer rhœada, alij oxytonon appellant, Romani
papauer, Aegyptij nanti.

169. Aliqui paralion, alij syluestre papauer,
alij thalassion, Romani fabulum marinum, Aphri
fifim

NOTHA.

sifimacam uocant.

169. Qui hoc papauer hauserit, nō alia accidēt, quā qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semē astate dum siccū est, colligitur. Deco- Etum radicis bibitur cum uino, sanatq; dysenteria.

169. Alij pythionion, aliqui dioscyamon uocant, alij adamantā, alij adamenon, alij hypnoticon, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dithiambrion, Ma- gi, Pythagoras & Osthānes, xeleo, Zoroastres ti- phonion, Magi rhapōticā, Romani inanano enta- riam aut apollinarem, Aegyptij saphtho, Hetrusci fabulum, Galli bilinuntiam, Daci dieliam.

170. Aliqui cataphysin, alij cynocephalion, alij chrystalion, alij cynomyam, alij psyllerin, alij sice- lioticon, Siculi comidyn, Romani herbam pulicarē aut silbacium, Aphri uargugum appellant.

170. Romani strumum uocant, alij cacubalum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismu- sim uocant.

171. Aliqui dircion appellant, alij strychnon ma- nicon, alij dorycnion, alij calliada, Romani apollina- rem minorem, alij ulticanam herbam, aut opsagi- nem, Daci cycolidem, Pœni catabum.

171. Strychnonmanicon, alij anydron, alij penta- dryon, alij enoron, quidam orthogyion uocant.

172. Alij exeranthēs, aliqui antimnion aut anti- mion, alij bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij apemum, Pythagoras anthropomorphon, alij alce-

DIOSCORIDIS

ten, alij thridaciam, alij cāmaron, Zoroāstres dia-
monon, aut archinen, Magi hemionos, aliqui gonoz-
geonas, Romani caninum malum, alij terreſtre
malum.

173. Alij cyamon leucon, Rom. colomeſtrum.

174. Conion, aliquibus eginos, alijs ethuſa, alijs
apoleguſa, alijs dolia, alijs amauroſis, alijs paraly-
pſis, nonnullis aphron, quibuſdam creidion, alijs cœ-
ten, alijs catechomenion, alijs abioton, alijs apſeu-
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody-
nos, alijs dardanis, alijs catapſyxis, Oſtani babat-
thy, Aegyptijs apēphi, Romanis cicutā appellatur.

174. Aliqui cynanchon appellant, alij pardalian-
ches, alij cynomoron, alij cynoſtonon, alij phaleon,
alij cynāchen, alij oligoron, alij hippomanes, alij oni-
ſtin, alij ophioſcorodon, alij cynaricam, alij elapho-
ſcorodon, Magi paralyſin, Romani Braſſicā ruſti-
cā aut caninā.

174. Alij ſpongon, alij hæmoſtarin, Romani rho-
dodendron, Lucani icmanen, Aegyptij ſchimphen,
Pœni rhododaphnen dicunt.

175. Aliqui elitim uocant, alij canocerſeam, alij
amelxinen, alij euſinem, alij amorginem, alij ſucota-
chos, alij pſychuacos, alij melampelon, alij cittampe-
lon, alij ciſſameihon, alij anacetamenon, Romani
uolutum laparon, Aegyptij apap, alij parthenion,
alij ſideritim, alij heracleam, nonnulli agriam, qui-
dam clibodion, alij polyonymon.

NOTHA.

176. Alj myortochon dicūt, alj myortosplenon, Romani muris auriculam: Pœni labatholabat.

176. Agriam phacon aliqui, alj epipteron, Romani uiperalem, alj iceosmigdonon uocant.

176. Aixoon maius, aliqui aithales, alj ambrosion, alj chrysispermon, alj zoophthalmon, alj biophthalmon, alj stergethron, alj æonion, alj aichryson, alj holochryson, nonnulli chrysanthemon, alj protogonon, alj boron, alj notion: Magi paronychiam, alj chrystin, Romani ceriam cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alj leapetes, alj sedum maius, Aegyptj pamphanes.

176. Aixoon paruum, alj petrophyes appellant, alj brotion, alj theobrotton, crobysson, alj chimerinen, alj cerauniam, Romani uitalem, alj semperuiuum, Aegyptj eiyceltam.

176. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui aixoon paruum, alj petrophyes, alj aixoon syluestre, Romani semperuiuum minus appellant.

177. Aliquibus cymbalion, alj scytalion, alj hortus Veneris, alj terre umbilicus, alj stœchis, alj stergethron, Latinis umbilicus Veneris dicitur.

177. Acalyphen aliqui cnidem, alj adicen, Latini urticam, Aegyptj selesion, Dacidyn appellant, Acalyphen etiam alteram aliqui cniphen, Romani urticam mollem uocant.

O o ij

DIOSCORIDIS

177. Alijs galeobdolon, uel galephos, Aegyptijs ætopi, Latinis urtica labeo dicitur.

177. Alijs galation, aut gallerion.

178. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio uocatur, alijs erechthites.

178. Marinum bryon, aliqui ballarin, alij iranē, Latini gnomeusilon uocant.

178. Alijs stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

178. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nūcupatur, Aegyptijs tibus, Magis æluri sanguis.

179. Phlomon, alij phlonon, Latini uerbascum, alij pheminalem uocant.

180. Arcion alij prosopida, alij prosopion, alij æparinen, Latini personatam, aut lappam appellāt.

180. Alijs borion appellatur.

180. Capnon, aliqui corydalion, aut corion uocant, alij syluestre corydalion, alij capnon in hordeis, alij capniten, alij marmariten, alij capno gorgion, alij chelidonion micron, alij peristerion, alij cātharida, alij chalcocri, Romani apium aut fumarriam, Aegyptij enyx, alij tucin.

180. Alij tripodion, alij tribolion.

180. Aliqui libyon, alij triphyllon.

180. Aliqui telinen, alij lotum magnum, alij triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

181. Alij melophyllō, alij stratioticem, alij achil lion, Latini millefolium uocant, aliqui supercilium

NOTHA.

ueneris, Galli beliocandas.

181. Alij myrrham, alij conilen uocant.

181. Aliqui buglossum magnum uocant, Romanis spinam mollem.

182. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alij asterion, quibusdam hyophthalmion, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.

182. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea non uiderunt, esse inane, simulacrum arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhixotomus hæc de ea refert: Si uiridis cum axungia uetere tundatur contra rabiosorum morsus, turgentia guttura, proderit, suffitu quoq; serpentes fugat.

182. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij ion syluestre, alij cybelion, Romani setialin, aut mura-riam, aut uiolam purpuream uocant.

182. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

182. Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphoron uocant magi paradacry, Aegyptij erxoen, Romani scopam regiam, Aphri xigar, nonnulli thepso.

183. Alio nomine chamæleuce, alio cissos acarpos, aut terræ corona, aut selinitis, Latine hederapluiatica dicitur.

183. Magi eluri gonon, Osthanez txauchi, Aegyptij autucrimbesor, Romani linguam bubu-

O o ij

DIOSEORIDIS

lam, alij libanium, Pœni asanaph uocant.

183. Alij phyton, alij caballation, alij splincion, alij scolymon, Romani linguam canis, aut caninā appellant.

183. Aliqui zoonychon uocant, alij aetonychon, alij cemos, alij damnamenem, alij idiophyton, nonnulli phytobasilā, aliqui crosion, alij crossophthoon, Magi sanguinē crocodili, alij crocomerion, Aegyptij daphnoenen, Romani minerciū, alij palladium, alij neumatum, alij flammulam.

183. Aliqui & id antirrhinon, alij anarrhinon, nonnulli lychnida agriam uocant.

183. Nonnulli lychnida agriam appellant.

184. Catanance aliquibus damnamete, alijs dionysias, alijs thyrsion, alijs demos, alijs cemos, alijs crotion, magis archaras, alijs arcopus, Romanis herba filicula, alijs datisca, Dacis caropithla dicitur.

184. Aliqui psychen, alij merida, alij potamogitona, alij stachyiten, Romani calium marē nomināt.

184. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Aegyptij epier, Romani cinnamalem, alij terræ capillum, alij superciliū terræ, Daci phithophithehela uocant.

185. Aliqui pterion, alij opteron, Romani capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli & eam adianton appellant.

185. Aliqui phasganon, alij antithesion, alij chascaron, alij chæradolethron, alij & hanc apariz

NOTHA.

nam nominant, Latini lappam.

185. Aliquibus sit ospelos, alijs siphon, alijs brosmos, Romanis auena dicitur.

185. Aliqui siphonion, alijs acrospelon uocant.

186. Alijs epapitis, alijs lycanthemon, alijs cynosbaton, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs anatolicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe, Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

186. Alijs hieromyrton, alijs myacantha, alijs agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangelos, alijs anangelos, alijs aceron, alijs ocneron, alijs cinen, alijs lichene, alijs chamepitys, alijs chamemyrte, Bæotis gyrenia, Magis Herculis genitura appellatur.

186. Aliqui idean, alijs danaen, alijs hippoglottō, alijs xaliā, alijs stephanen, alijs daphnon, alijs samothracicen, alijs methrion, alijs hypoglossion uocant.

186. Daphnoides alypo simile, flos ut nymphæe, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in quo semen: aliqui chamædaphnen, alijs peplion, alijs eupetalon uocant.

187. Aliqui & hanc alexandrinam appellarūt, alijs daphniten, alijs hydragogen, Romani laureolā, alijs lactaginem, Galli vsu bim.

187. Aliqui ascida uocant, alijs atomon, alijs pigatoxin, Magi sanguinem Herculis, alijs polyidos, alijs anaphyston, Aegyptij somphia, alijs unre, Galli laginum, aliqui anepsa.

DIOSCORIDIS

187. Aliqui melanpodion uocant, alij ecstomon,
alij polyrrhizon, alij protion, alij melanorrhizon,
alij cyiranion, Magi xomarition, Aegyptij iseam,
alij elaphine, alij cemeleg. Latini ueratrum nigrū,
alij saraca, Daci prodiorna.

188. Aliqui sesamiten, alij sesamin, alij lycocytal-
lion, alij helleborum album appellant.

188. Aliqui coronion, alij sesamon syluestre.

188. Aliqui elaterion uocant, alij grynon, alij ba-
lin, alij syncrisin, alij bubalion, alij scopion, alij phe-
rombron, alij peucedanon, alij notion, Romani ancez-
tum, alij agrestem, Pæni cusimexar.

190. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris tri-
ta radix, & drachmæ unius pondere pota in hydro-
melite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnā
uomere uelit, binis obolis sit contentus,

190. Alij triphyllon, alij stefion, alij astaphida,
alij phthiroctonon, alij phthirion, alij apathropon,
alij polyides, alij pseudopathes, alij arsenoten, Aegy-
ptij ibesæden, Romani herbā pediculariam uocāt.

190. Aliqui hypopyon uocāt, alij pancranon, alij
scammonion, alij thelyterim, Romani ferulagine,
alij ferulam syluestrem, Pæni bæden.

191. Aliqui lygon, alij lobon appellant.

192. Aliqui narcisson anydron, alij autogenes,
alij bulbon emeticon, alij lirion, Romani bulbū mor-
bitarium dicunt.

192. Alij hippophyes, alij hippophanes, alij hip-

NOTHA.

pion, alij echinion, alij pelicinon, Romani lappaginem uocant.

193. Aliqui sesamon syluestre uocant, alij seseli cyprion, alij crotona, Aegyptij systhanna, aliqui trixin, magi sanguine febris. Latini ricinu, alij lupā.

193. Aliquibus cometes, alijs gobios.

195. Aliqui clema, alij crambion, alij paralion, alij canopicon uocant.

195. Aliqui sycen, alij mecona aphroden.

196. Alij spumosum papauer uocitant.

196. Aliquibus scambonia radix, alijs colophonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, Magis apopleumonos, Aegyptijs sanilum dicitur.

196. Alij chamelea nigra, alij pyros achmen, alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidion, Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam oleastellum uocant.

197. Alij chameleam, alij pyros achmen, alij cestron, aut cneoron uocant.

197. Acten aliqui dendron arctu, alij hemeron, Latini sambucu, Galli scobiem, Daci sebā uocant.

197. Alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Euboica, Gallis ducone, Dacis olma.

198. Nonnulli ischiada, alij chamebalanum agriam, alij linoxostin, Latini radicem syluestrem, Pæni thorpathsade appellant.

198. Aliquibus colocyntha egos, alijs sicya picro, alijs alexandrina colocyntha, Zoroastri thym

DIOSCORIDIS

bra, Osthani autogenes, Romanis cucurbita syluati-
ca, Dacis tutastra dicitur.

199. Alij cedæes, Romani involucrum uocant.

199. Alij ophiostaphylon, alij chelidonium, aut
melothron, aut psyllothron, aut archezostin, aut
agrostin, aut cedrostin appellant.

200. Alij chironion ampelon, alij bucranion, Ro-
mani oblameniam, alij batanutam, alij betisalcā,
Daci priadelam, alij pegrinam, Aphri lauother.

200 Pterin alij pterion, alij pterineon, alij dasy-
clonon, alij anasphoron, alij blechnon, alij polyrrhi-
xon uocant, Magi hermubain, Romani filicem, alij
laculā, alij filisfanariā, Aegyptij asini sanguinem.

200. Thelypterin aliqui nymphæam pterin no-
minant, Romani linguam ceruinam.

201. Polypodium aliqui scolopendrium, alij pte-
rin, alij polyrrhizon, Latini filiculam uocant.

201. Aliqui pterion, alij nymphæam pterin no-
minant.

201. Alij Argyron, alij aritrillin, alij chrysitin,
Aegyptij aplhopho, Latini mercurialem masculā,
alij tessiculatam, Aphri asumes.

202. Aliquibus linoxostis, Aphris armas, alijs
asumes labon dicitur.

202. Aliqui scorpiuron uocant, alij heliotropon,
alij dialion, alij heliapon, alij scorpioctonon, alij ses-
samon agrion, alij scorpj uram.

202. Aliqui scorpiuron uocant.

NOTHA.

205. Idem adstringit: prodest stomacho qui cibi
 & enax non est, aut tardius cibum concoquit. Itē q̄s
 qui ilei dolore conflantur: conuenit in grauidarū
 malacia: sorptum auxiliari constat, cū populatim
 grassatur pestifera lues. Huiusmodi omphacium
 non nisi post annos multos bibi potest.

217. Quam alij Medicinā, alij symphyton, alij
 ideum phlomon, alij orestion, alij nectarion uocāt.

226. Alij larbason, alij gynacion, alij Chal-
 cedonion.

231. Alij pecton, hepthon, aracton, lonchoton.

255. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat si lente luna, & secum
 ferat, cōtra uenena & improbos homines proderit:
 pecoribus inuandis appenditur: nauigijs circūponi
 solet: ualet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter fa-
 cit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, he-
 stias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-
 luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, & lo-
 cum totum oblinito, cum somno indulgendum est:
 strangulatuū uulue mirum in modum auxiliatur:
 urinae stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylum si quis circū corpus portet, nullo
 dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tonsillarū

DIOSCORIDIS

tumores. uiam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, pforam perniciali fame contracta iuuat: remoratos à partu menses eicit: insusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cū luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorum auxilium tur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De dictamno.

Dictamnium siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta uini stilla, corpus tangito: si quidem contra omnes serpentium iniurias auxilium tur: vlcera & putrescentes nomas prapurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, ut presenti sit auxilio: ad lienem & in abditis locis uicia inflammatione turgentia, redactū in farinam illinito. Herbam uere, magnis aestibus, autumnūq; eruito.

De Saluia.

Salvia singultū tuſsimq; discutit: omnibus malis ulceribus cum cera & rosaceo sumpta auxilium tur: lienis dolorem dysenteriamq; pota cum uino albo pari modo sanat: sanguinem excreantibus, potu

NOTHA.

medetur : ad extrahenda uulnæ onera efficax est :
pessimæ mulieres pessum ex ea subiiciunt, ut partus
excutiant.

De Cupresso.

Cupressus herba contra rauedines auriculasq;
prodest: induratos tonsillarum tumores, aquam in-
ter cutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centauro.

Centaureum contra inflammata uitia & pul-
santes ictus ualet sceminis uulnæ malo laboranti-
bus auxiliatur: stillicidij urinae, calculorumq; tor-
menta leuat. Herbam uere oriente sole legito.

De Buphthalmo.

Bupthalmum crescente luna legere oportet. Fa-
cit autem contra pauores, laruas, & mala medica-
menta, fascinationes, utpote cum eas auertat. Radi-
cem si quis mandat, dentem expuet, fluxionemq; cō-
festim sistens auxiliatur: quin & uentrē resoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æstus Caniculæ ante Solis or-
tum uellitur: appensaq; contra uenena, fascinū, pa-
uores & laruas prodest: item contra febrem cum
horrore uenientem, diurnam nocturnamue, &
aduersus tertianam. Proditur lemures à monte, in
quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, ueneficiorum
& fascinationis amuletum est.

D I O S C O R I D I S

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-
to, & faciem illinito cum ad negotia te conferes :
uegetiores reddit pueros, imo uentri appensa & ad
arcendos pauores nocturnos manu teneto. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit,

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortum erua-
tur, & collo appēdatur, ueneficas mulieres omnesq;
fascinantes amolitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum uino tritum, aduersus uentris do-
lorem bibitur: si quis grana septem domum iniece-
rit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boion dici-
tur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bi-
bitur contra omne uenenum, & iocineris uitia.

F I N I S.

INDEX OMNIVM

QVAE IN DIOSCORIDE
CONTINENTVR.

A Brotonon	117	Adianton	184
Absynthium	116	Aegilops	185
Absynthiū marinū	116	Aeris squamma	222
Absynthiū Sātonicū	117	Aeris flos	222
Acacalis	40	Aerugo rasa	223
Acacia	43	Aerugo scolecia	224
Acacia altera	43	Aes ustum	222
Acanthus	114	Aethiopsis	179
Acanthum	113	Actites lapis	241
Acāthus syluestris	114	Agallochon	15
Acetum	209	Agaricum	108
Acetū ē betonica	215	Ageraton	166
Acetum mulsum	209	Agnus	45
Acetū scillinum	210	Aiuga	152
Acetū ē stœchade	215	Alabastrites	242
Achillea	162	Alcea	151
Achras	52	Alcibiadion	160
Acida muria	210	Alcyonium	239
Acinos	122	Alisma	132
Acorum	6	Allium	95
Aconitum	173	Aloe	115
Adarces	239	Alfne	176
Adeps omnis	70	Althæa	151

INDEX.

Alumen	234	Anisum	127
Alumen scissile	ibidē	Anonis	114
Alus	157	Anthemis	148
Alysson	138	Anthericum	101
Alypon	199	Antyllis	148
Amaracum	121	Antipathes	240
Amaranton	166	Antirrhinon	184
Ambrosia	143	Antispoda	222
Amiantus lapis	241	Aparine	138
Amni	128	Aphaca	94
Ammoniacon	137	Apiastrum	140
Amomis	12	Apios	198
Amomum	12	Apium	129
Ampelitis terra	245	Apocynon	174
Ampeloprason	54	Apollinaris	169
Amphisbena ictus note		Apri iecur	63
267. eius curatio	268	Apum ictus curatio	271
Amurca	46	Aqua	208
Amygdale amara	53	Aqua frigida	259
Amylum	81	Aqua marina	208
Anagallis	105	Aqua mulsa	208
Anagyris	152	Arabicus lapis	242
Anchusa	160	Araneus	65
Androsaces	147	Arbutus	53
Androsemon	153	Arcion	180
Anemone	104	Arction	179
Anethum	127	Arcturon	ibidem
Anguimum senectus	60	Arena	244
		Argemone	

INDEX.

Argemone	105	Astragalus	167
Argēti recrementū	227	Athamanticum	6
Argenti scoria	ibidem	Athera	80
Argenti spuma	ibid. & 257	Atractylis	138
Argentum uiuum	230.	Atramentum librarium	246
& 257		Atramentū sutoriū	231
Arisarum	101	Atriplex	87
Aristolochia	110	Auellana nux	54
Armeniaca mala	51	Auena	80
Armenius lapis	229	Auricula muris	107
Armoracia	86	Auri pigmentum, siue ar senicon	234
Aron	101	Bacca lauri	38
Arrhenogonon	145	Baccharis	122
Arthemisia	143	Balaustium	49
Arundo: vide Harundo		Ballote	140
Asarum	9	Balsamum	13
Asclepias	138	Barbula hirci	94
Ascyron	153	Basilisci ictus notæ	269
Asininum iecur	63	eius curatio	273
Asini ungula	62	Bdellium	30
Asius lapis	240	Beta	88
Aspalathus	14	Betonica	154
Asparagus	89	Bitumen	35. & 36
Asplenon	142	Blata pistrinaria	62
Aspidis ictus notæ	269	Bliton	86
eius curatio	273	Botrys	143
Aster Atticus	182		

Pp

INDEX

Brassica	87	Cancamum	15
Brassica marina	88	Cancer	59
Brassica sylvestris	87	Canis rubus	41
Britanica	155	Canis rabidi iecur	63
Bromus	185	Canis rabiosi signa	264
Bryon	15	curatio morsus eius	
Bryonia	199	255. ab eo morsorum	
Buccina	57	nictus ratio.	256
Buglossum	183	Cannabis	151
Bulbus esculentus	102	Cantharides	65
Bulbus vomitorius	102	Capnos	180
Bunion	182	Capparis	103
Buprestis	65. & 252	Capra ungula	62
Buphthalmos	149	Caprinum iecur	ibidem
Butyrum	68	Cardamomum	7
Butyri fuligo	ibide	Cardamina	90
Acacia	182	Carduus	113
Canchrys	132	Carpasi succus	154
Cadmia	219	Cariota	48
Ceciliae ictus nota	167	Carum	127
curatio eadem que uis-		Caseus	67
pere morsus.		Casia	10
Calamus odoratus	13	Castanea	47
Calamintha	120	Castorium	60
Calcifraga	199	Catanance	184
Caltha	257	Caucalis	93
Calx	230	Cedria	37
Calx nina	238	Cedrides	38

INDEX

Cedromela	51	Chamaesyce	183
Cedrus	37	Chamaelea	197
Celticum nardum	8	Characias tithymalus	
Genchri ictus nota	268		193
eius remedia	273	Chelidonium	106
Centaurium magnum		Chelidonium minus	106
110		Chia terra	245
Centaurium minus	111	Chondrylla	92
Cepa	95	Chrysanthemon	166.
Cepaea	152	& 229	
Cera	78	Chrysocolla	229
Cerastia	50	Chrysocome	165
Cerastia ictus nota	260	Chrysogonon	ibidem
eius curatio	273	Cicade	64
Gerui genitale	62	Cicer sativum	82
Cervinum cornu	64	Cicer arietinum	ibidem
Cerussa	228. & 256	Cicer sylvestre	82
Cestron	154	Cichorion	91
Chalcitis	232	Cici	193
Chamae	58	Cicuta	174. & 154
Camæactæ	197	Cimices	62
Chamaecissos	183	Cimolia	245
Chamaelaphne	187	Cinis sarmentitius	238
Chamedrys	139	Cinnabaris	230
Chamaeleo albus	111	Cinnamomum	11
Chamaeleo niger	112	Cionia	57
Chamaeleuce	183	Circea	144
Chamaepitys	152	Cirsum	181

Pp ij

INDEX.

Cistus	41	Gornus	52
Citria mala	51	Corruda	89
Clematis	156	Cos Naxia	244
Clinopodium	139	Costus	12
Clymenon	157	Cotonea mala	51
Enicus	201	Cotyledon	177
Coagulum	69	Crataegonon	145
Coccum gnidion	197	Crimnon	80
Coccum infectoriū	164	Crithmum seu critha = mon	90
Cochleæ	58	Crocodilion	112
Cœruleus	230	Crocomagna	16
Colchicon	175	Crocum	ibidem
Colligendorn ratio	4	Croton	193
Colocasia	83	Cucurbita	92
Colocynthis	198	Cucumis sativus	92
Colymbades	45	Cucumis sylvestris	188
Communis curatio in o= mnes ictus virulentos		Cuminum sativū	127
269.		Cuminum sylvestre ibi= dem	
Conyza	144	Cunila	118
Corallium	240	Cupressus	36
Coriandri 128. & 253		Curmi	79
Coria veteramentaria		Cyclaminus	99
63		Cyclaminus altera	100
Coriarius frutex	48	Cydonomeli	212
Coris	152	Cynia	202
Coronopus	90	Cynocrambe	ibidem
Cornu cervi	64		

INDEX.

Cynoglosson	183	Dracunculus	100
Cynorchis	146	Dryini ictus notæ	268
Cyparissias tithymalus		eius curatio	273
194		Dryopteris	201
Cyphi	15	Dulcis radix	110
Cypirus	7	E Benus	42
Cytinus	49	E Ebulum	197
Cytisus	180	Ebur	64
D Amascena pruna		Echinus	57
55		Echion	160
Damasonion	132	Elaphoboscon	130
Daphnoides	186	Elaterion	183
Daucus	131	Elatine	162
Delphinium	ibidem	Electrum	39
Dendroides tithymalus		Elelispheos	119
194		Elæomeli	18
Deuteria	206	Eleoselinum	129
Dictamnium	119	Elichryson	166
Dictamnii Cretense	119	Empetron	199
Diphryges	233	Ephemeron 175. et	252
Dipsacum	112	Epimedium	159
Dipsadis morsus notæ		Epimelis	52
268. eius curatio	273	Epipactis	180
Dorycnion 171. &	253	Epirotica mala	51
Draba	97	Epithymum	199
Draco marinus	59	Equisetum	164
Draconis marini ictus		Equorum lichenes	63
remedia	271	Eretria terra	244

P p iij

INDEX

Erica	40	Flos aris	222
Erinaceus	57	Flos salis	237
Erinei	56	Flos punice	49
Erinus	161	Flos sylvestris punici ibi	
Eruca	93	dem	
Eruce olerum	65	Foeniculum	130
Eruce pinorū 65 et	251	Foeniculum erraticum	
Erum	84	ibidem	
Eryngium	115	Fœnum gracum	81
Erysimon	97	Fraxinus	38
Erythrodanon	150	Fuligo è myrrha, resina,	
Eupatorium	163	styrace	32
Euphorbium	135	Fuligo liquide picis	35
F Aba	82	Fuligo pictoria	245
Faba Aegyptia	83	Fuligo thuris	32
Fax	238	Fumaria	180
Fagus	47	Fungi	175. & 256
Farina crassior	80	G Agates lais	242
Fel	74	Galactites lapis	
Ferri rubigo	225	242	
Ferula	133	Galaxias	ibidem
Festuca	185	Galbanum	136
Fibrini testes	60	Galerita	64
Ficus	55	Galion	177
Filicula	201	Galiopsis	ibidem
Filix	200	Galla	47
Filix femina	ibidem	Gallina	63
Fimum	75	Gallinae cerebellum	ibid.

INDEX

Garum	62	Gummi amygdale	53
Genitale cervi	62	Gummi cerasi	50
Gentiana	109	Gypsum	238 & 256
Geranium	144	H Aematites	241
Geodes lapis	244	H Hemorrhoi ictus	
Gingiberis	98	note 268. eius curatio	
Gingidion	93	273	
Gith	134	Halica	80
Gladiolus	159	Haliacacabō solanū	171
Glans	47	Halimus	49
Glans Iouis	47	Harundo	39
Glans Sardiana ibidem		Harundo Cypria ibidem	
Glans unguentaria	192	Harūdo wallatoria ibid.	
Glastum sativum	107	Hastula regia	101
Glastum sylvestre	107	Hedera	105
Glaucium	137	Hedysaron	147
Glaux	185	Helcysma	227
Gluten piscium	137	Helenium	16
Glutinum	ibidem	Helenium alterum	16
Glycyside	149	Helioscopius	194
Gnaphalium	144	Heliotropium magnum	
Cnidium granum	107	202	
Gobius	61	Heliotropium parvum	
Gramen	161	ibidem	
Gramen arundinaceum		Helleborum album	187
ibidem		Helleborum nigrum	187
Gramē Parnasi ibidem		Helxine	162 & 175
Grossi	56	Hemerocallis	145

P p - iiij

INDEX.

Hemionitis	148	Hypocistis	41
Herba sabina	37	Hyssopum	117
Hieracium magnū	128	Iaspis	243
Hieracium paruum ibi-		Iberis	56
dem		Ibiscum	151
Hippace	68	Ichthyocolla	137
Hippocampus	57	Idea radix	164
Hippoglosson	183	Iecur apri	63
Hippolapathon	86	Iecur asininum	ibidem
Hippomarathon	130	Iecur canis rabidi	ibid.
Hippophaes	192	Iecur caprinum	ibidem
Hippophaeston	193	Iecur mergi	ibidem
Hippopotami testes	60	Illecebra	176
Hippofelinon	129	Ilex	47
Hirci barbula	94	Indicum	230
Hirculus	8	Inguinalis	182
Hirundines	64	Intybus	91
Hirudo	255	Iouis glans	47
Holostium	157	Irio	97
Hordeum	79	Iris	5
Horminum	146	Isopyron	182
Hyacinthus	167	Iudaicus lapis	243
Hydromeli	212	Iuglandes nuces	53
Hydromelon	212	Iuncus	165
Hydropiper	99	Iuncus odoratus	13
Hyoscyamus 169. et	254	Iuniperus	36
Hypecoon.	169	Ius piscium	62
Hypericon	152	Ixia	256

INDEX

L Abrū Veneris	112	Lens palustris	176
Labrusca	203	Lentiscus	33
Lac	66	Lentiscina resina	34
Lac coagulatum	257	Leontopetalon	139
Lac humanum	67	Leontopodion	183
Lac schiston	67	Lepidium	104
Lactis serum	ibid.	Leptocarya	54
Lacerta	66	Lepus marinus 60. et	58
Lactuca sativa	92	Lepus terrestris	60
Lactuca sylvestris	ibid.	Leucacantha	114
Ladanum	42	Leucanthemon	148
Lagopus	158	Leucas	139
Lampsana	86	Leucoion	145
Lana	68	Lichenes equorum	63
Lana cremata	ibidem	Lichen	165
Lanaria herba	99	Lignorum marcor	39
Lappa	185	Ligusticum	125
Lapathum	86	Ligustrum	41
Lasfer	134	Lilium	140
Laserpitium	ibidem	Lilium sylvestre	145
Lathyris	195	Limonion	158
Lauer	90	Lingua bubula	183
Laurus	38	Linoxostis	201
Laurus Alexandri =		Linum	82
na	186	Lithocolla	243
Lauri bacca	38	Lithospermon	150
Lemnia terra	231	Locustæ	64
Lens	83	Lolium	81

INDEX

Lonchitis	150	Malum praeox	ibid.
Lora	409	Malum punicum	49
Lotus arbor	52	Malum sylvestre	ibid.
Lotus Aegyptia	181	Mādragoras	171 et 254
Lotus sylvestris	180	Manna thuris	31
Lotus urbana	ibidem	Marcor lignorum	39
Lupinus	84	Maron	122
Lychnis coronaria	140	Marrubium	141
Lychnis sylvestris	ibid.	Marrubium nigrū	140
Lycium	43	Mastiche	33
Lycopsis	160	Meconium	255
Lygos	45	Medica	94
Lysimachia	155	Medica mala	51
M Acer	39	Medion	159
M Mene	61	Medulla	73
Magnes	242	Mel	77
Magularis	185	Mel heraclion	253
Malabathrum	10	Melampsythium	232
Malicorium	49	Melanteria	232
Malua	86	Melanthium	134
Malum	51	Melia terra	245
Malū Armeniacum	51	Melilotos	122
Malum cotoneum	51	Melimela	81
Malum dulce	51	Melissophyllon	140
Malum Epiroticū	ibid.	Melitites lapis	242
Malum Medicū	ibid.	Melomeli	212
Malū orbiculatū	ibid.	Memphites	243
Malum Persicum	ibid.	Mentha	120

INDEX

Menthastrum	ibidem	Myagron	181
Meon	6	Myosotis	207
Mercurialis	201	Myrica	40
Mergi iecur	63	Myrrha	18
Mespilus	52	Myrrha Boeotica	29
Metopion unguentū	27	Myrrhis	181
Milium	80	Myrtidanum	50
Millesolium	181	Myrtussatiua	50
Millepede	62	Myrtus sylvestris	186
Misy	232	N Aphtha	36
Mituli	58	Napus	85
Moly	124	Narcaphthon	15
Molybdæna	226	Narcissus	192
Molybdoides lapis	227	Nardi genera	7
Morochthus	242	Nardum Celticum	8
Morus	54	Nardum montanum	9
Mullus	60	Nardinū unguentū	28
Mulsum	208	Nasturtium	97
Muralis herba	175	Natricis ictus notæ	268
Muria	237	eius curatio	273
Mures	66	Nepeta	120
Muris auricula	207	Nerion	174
Mus araneus	66	Nitrum	237
Muris aranei ictus notæ		Nitri spuma	237
268. eius curatio	264	Nux auellana	54
Muscus	15	Nux iuglans	53
Muscus marinus	178	Nux pinea	32
Mustela	61	Nymphaea	147

INDEX

O Chra	230	Oleum sinapinum	19
Ocymastrum	160	Oleum styracinum	30
Ocymum	93	Oleum terebinthinū	20
Oenanthe	144. & 204	Oliæ colymbades	45
Oesypum	69	Oloschoenos	165
Olea sylvestris	45	Olusatrum	129
Oleaster	ibidem	Omphacium	204
Oleæ ethiopice lacry-		Omphacomelites	212
ma	46	Onagra	181
Olei vires	17	Onitis	118
Oleum amygdalinū	19	Onobrychis	152
Oleum balaninum	19	Ononis	114
Oleum cicinum	18	Onosma	147
Oleum enicinum	19	Onyx	58. et 242
Oleū è gnidio grano ibi.		Ophioscorodon	96
Oleum hyoscyaminū	19	Ophites lapis	243
Oleum laurinum	20	Opium	168
Oleum lentiscinum	20	Opobalsamum	13
Oleum mastichinū ibid.		Opopanax	24
Oleum melanthinū	19	Orbiculata mala	51
Oleum melinum	52	Oreoselinon	129
Oleum myrteum	20	Origanum	118
Oleum oliuæ sylvestris		Origanū sylvestre ibid.	
17. & 45		Ornithogalum	94
Oleum omphacinū	17	Orobanche	93
Oleum picinum	35	Oryza	80
Oleum raphanium	19	Osisfragus	64
Oleum Sicyoninum	18	Ostracites	244

INDEX

Osyris	185	Parthenium	149
Othonna	106	Passum	205
Ouorum natura	63	Pastinaca herba	126
Oui candidum	ibidem	Pastinaca marina	60
Oxalme	210	Pastinacæ marinæ ictus	
Oxylapathum	86	note 268 eius cura =	
Oxymyrsine	168	tio 272	
P Aederota	114	Pedicularia	190
Pœnia	149	Pelecinon	147
Paliurus	40	Peplus	195
Palma	48	Peplos	ibidem
Palma elate	49	Pepo	92
Palma Thebaica	48	Periclymenon	158
Panaces Asclepij	125	Peristercon	166
Panaces Chironiij	ibid.	Persea	56
Panaces Heracleum	125	Persica mala	51
Pancration	103	Personata	180
Panicum	80	Petasites	ibidem
Papauer corniculatum		Petroselinum	129
169. & 255		Peucedanon	133
Papauer erraticum	167	Phalangium	141
Papauer sativum	ibid.	Phalangij morsus nota	
Papauer spumeum	169	te 267 eius cura =	
Pappi	255	tio	271
Papyrus	39	Phalaris	150
Paralios	194	Pharicon	255
Pardalianches	173	Phasiolus	84
Paronychia	165	Phœnicobalanus	48

I N D E X

Phœnix	163	Polion	142
Phrygius lapis	240	Polycnemon	139
Phu	9	Polygala	185
Phycus marinus	178	Polygonaton	156
Phyllitis	141	Polygonon	155
Phyllon	145	Polypodion	201
Phyteuma	183	Pompholyx	220
Picea	32	Populus alba	38
Picis liquida fuligo	35	Populus nigra	ibidem
Pineæ nuces	32	Porrum capitatum	94
Pinorū eruce 65.et	251	Portulaca	88
Pinus	32	Potamogeton	178
Piper	98	Poterion	113
Piscium ius	62	Propolis	78
Pissasphaltos	36	Prunus,pruna	82
Pissaleon	35	Pseudobunion	182
Pistacia	53	Pseudocasia	10
Pityusa	195	Pseudocinnamomū	12
Pix liquida	35	Pseudodictamnium	119
Pix sicca	35	Psoricon	232
Plantago	89	Psychotrophon	154
Platanus	38	Psyllion 170. &	253
Plumbago	226	Ptarmica	99
Plumbum elotum	225	Pulegium	118
Plumbum ustum	ibid.	Pulegiū sylvestre	119
Plumbi recrementū	226	Pulicaria	170
Pnigitis terra	245	Pulicula	80
Polemonia	156	Pulmones animalū	62

INDEX

Rumex	235	Rheon	ibidem
Purpura	57	Rhodia radix	164
Pygnoomon	198	Rhododendron	174
Pyrafter	52	Rhus	48
Pyrethrum	131	Ricinus	193
Pyrites	241	Rosa	43
Pyrorum genera	52	Rosei pastilli	ibidem
Q Vercus	47	Rosmarinus	131
Quisquesoliu	163	Rosmarinum corona =	
R Adicula	99	rium	132
Radix	85	Rubeta	258
Radix dulcis	110	Rubia	150
Radix sylvestris	86	Rubigo ferri	225
Rana	61	Rubrica fabrilis	231
Rana palustris	258	Rubrica Sinopica	ibid.
Ranunculum	104	Rubus	162
Rapum	85	Rubus canis	41
Recondendoru ratio	5	Rubus Idens	162
Recrementu argeti	227	Rumex	86
Resine varie	34	Ruscum	186
Resina lentiscina	34	Ruta	122
Resina liquida e pinu et		Ruta sylvestris	123
picea	34	S Abina herba	37
Rha	109	Saccharum	77
Rhamnus	40	Sacra herba	166
Rhaphanus	85	Sagapenum	135
Rhaphan^s sylvestris	86	Sal	236
Rhaponticum	109	Salis flos	437

INDEX

Salis spuma	437	Scammonia	196
Salamandra 65 & 252		Scandix	93
Salinaris	131	Schistum lac	67
Salunca	8	Schistos lapis	242
Salix	48	Scilla	192
Salvia	119	Scincus	66
Sambucus	197	Scolopendra	59
Samia terra	244	Scolopendræ ictus notæ	
Saminus lapis	ibidem	267. eius curatio	271
Sampsuchum	121	Scolymos	113
Sandaracha 234 & 257		Scordion	142
Sandyx	234	Scorodoprasum	96
Sanguinaria	155	Scoria plumbi	226
Sanguinaria scemi =		Scorpioides	202
na	156	Scorpius marinus	59
Sanguis	74	Scorpius terrestris	ibid.
Sanguis tauri	257	Scorpij ictus notæ	267
Sapa	265	eius curatio	271
Saphirus	243	Securidaca	147
Sarcocolla	137	Sedum magnum	176
Sardianæ glandes	47	Selenites lapis	243
Sardonia	254	Selinus terra	245
Sarmentitius cinis	238	Semen	80
Satureia	121	Semperuium	176
Satyrion	146	Semperuium minus	176
Satyrion erythronion		Senecta anguim	60
ibidem		Senecio	178
		Sepia	60

Seps

INDEX

Seps	66	154	
Seris	91	Smilax aspera	185
Serpyllum	121	Smilax lewis	186
Sertula campana	122	Smyris lapis	244
Serum lactis	67	Smyrnion	129
Sesama	81	Solanum hortense	170
Sesamoides	188	Solanum manicum	171
Seseli	126	Solanū somniferū	ibid.
Seseli Aethiopicū	126	Sonchus	91
Seseli Greticum	ibid.	Sorba	52
Seseli Peloponnese	ibid.	Sory	233
Setanium	32	Sparganion	159
Sicyonium oleum	18	Spartion	191
Sideritis	161	Spatha	48
Sidion	49	Sphondylion	132
Siligo	80	Sphragis egos	231
Siliqua	51	Spina acuta	41
Silphium	134	Spina alba	113
Silurus	61	Spina Arabica	ibid.
Silybum	192	Spongie	239
Sinapi	96	Spongiarū lapides	243
Sion	90	Spuma nitri	237
Sifer	86	Spuma salis	236
Sifon	126	Spuma argenti	227 .
Sisymbrium utrūq;	90	☞ 257.	
Sitania	79	Squamma eris	223
Smarides pisces	61	Squamma exacie de-	
Smilax 94. ☞ 185. ☞		cussa	223

INDEX

Stachys	141	Terebinthus	33
Stacte	27	Terebinthina	ibidem
Staphis agria	190	Terra	244
Stercus ferri	225	Terra fornacum	245
Stibium	227	Teste	245
Stimmi	ibidem	Testiculus canis	140
Stœbe	157	Teucrion, Teucris	139
Stœchas	117	Thalassomeli	209
Stomoma	223	Thalictron	178
Stratiotes	178	Thapsia	190
Stratiotes millefolium		Thelygonon	146
ibidem		Thlaspi	97
Strigmēta balnearū	18	Thracias lapis	242
Struthia cotonea	51	Thunnus	62
Struthion	99	Thus	30
Styrax	29	Thuris cortex	31
Succinum	39	Thuris fuligo	32
Suillus pulmo	62	Thuris manna	31
Suillus talus	64	Thyites lapis	242
Sulphur	235	Thymelea	197
Sycomorus	54	Thymoxalme	210
Symphyton	157	Thymus	120
T Alus suis	64	Tilia	41
Tamarix	40	Tihymali	193
Taxus	174. & 254	Tordylion	126
Tauri sanguis	257	Torpedo piscis	59
Telephion	107	Toxicon	255
Tellinæ	58	Tragacantha	114

INDEX

Tragium	164	Vimen	45
Tragoriganum	118	Vina marina	211
Tragos 80. &	164	Vina picata	214
Tribulus	158	Vina resinata	214
Trichomanes	185	Vini natura	205
Trifolium	141	Vinum abiegnum	214
Trimestria	228	Vinum abrotonites	216
Triphyllon	141	Vinū absynthites	215
Tripolion	184	Vinum acorites	217
Trissago	139	Vinum adynamon	207
Triticum	75	Vinum anethinum	218
Tuber	94	Vinum apiites	212
Tussilago	143	Vinum aromatites	216
Typha	144	Vinum asarites	217
V Eneata	259	Vinum bunites	216
Veneris umbili-		Vinū calaminthites	216
cus	177	Vinū catorchites	213
Veratrum album	187	Vinum cedrinum	214
Veratrum nigrum	187	Vinum cedrites	214
Verbascum	179	Vinum cestrites	214
Verbenaca	166	Vinū chamædryites	215
Vermes terreni	66	Vinū è chamælea	218
Vesparum ictus cura =		Vinū chamæpityinū ibi.	
tio	271	Vinum è conixa	216
Vesicaria	171	Vinum cupressinū	214
Vetonica	154	Vinū cydonites	211
Victus ratio in morsu		Vinum daucites	217
rabiosi canis	266	Vinū dictamnites	216

Qq ij

INDEX

Vinum è flore salis	218	Vinum pineum	214
Vinum helleborites	218	Vinum è pipere	217
Vinum hyssopites	215	Vinum è pulegio	216
Vinum ex iride	217	Vinum resinatum	214
Vinum iuniperinũ	214	Vinum rhodites	212
Vinum laurinum	ibid.	Vinum rhœtes	ibid.
Vinum lentiscinũ	213	Vinum saluiatum	217
Vinum mandragorites		Vinum è satureia	216
	218	Vinũ scammonites	219
Vinũ marathrites	218	Vinum scillinum	211
Vinum è marrubio	216	Vinum selinites	218
Vinum melites	211	Vinũ stœchadites	215
Vinum melities	207	Vinum strobilites	214
Vinum melomeli	217	Vinum è sycomoris	213
Vinum è myrrha	217	Vinũ è Syriaca nardo,	
Vinum myrsinites	213	celtica, malabathro	
Vinum myrtites	212		217
Vinum à nardo sylue-		Vinũ terebinthinũ	213
stri	217	Vinum thymites	216
Vinum nectarites	217	Vinũ è thymelœa	217
Vinum œnanthinũ	212	Vinum tragoriganites	
Vinum omphacites	207		216
Vinum palmeum	213	Viola alba	145
Vinum organites	216	Viola purpurea	182
Vinum panacites	217	Viperæ ictus notæ	267
Vinum phthorion	218	eius curatio.	272
Vinum è petroselino ibi.		Viperinæ carnes	59
Vinum picatum	214	Viscum	137

INDEX

Vitis alba	199	Vng.nardinum	28
Vitis nigra	200	Vng.ocyminum	23
Vitis sylueſtris	199	Vng.cenanthinum	22
Vitis uiniſera	203	Vng.onychinum	25
Vitex	45	Vng.rosaceum	21
Vlmus	39	Vng.sampsuchinũ	22
Vmbilicus Veneris	177	Vng.ſtyracinum	25
Vnedo	53	Vng.ſuſinum	23
Vnguentorũ ratio	20	Vng.telinum	22
Vng.abrotoninum	23	Vngula aſini	62
Vng.amaracinum	26	Vngula capræ	ibid.
Vng.anethinum	23	Vnguis odoratus	58
Vng.butyrinum	25	Vrina	76
Vng.cinnamominũ	27	Vrtica	177
Vng.crocinum	24	Vſtio contra uenena =	
Vnguentũ cyprinũ	25	tos iſtus	265
Vng.elatinum	21	Vua	203
Vng.gleucinum	26	Vua paſſa	204
Vng.hedychroon	27	Vulpinus pulmo	62
Vng.iaſminum	28	X Anthion	185
Vng.irinum	25	X Xyphion	159
Vng.lilinum	23	Xylobaſſamon	13
Vng.malabathrinũ	28	Xylocinnamomum	11
Vng.megalinum	27	Xyris	159
Vng.melinum	22	Z Ea, ſeu ſemen	80
Vng.mendeſium	27	Z Zopiſſa	35
Vng.metopion	27	Zythum.	79
Vng.narciſſinum	24		

FINIS.

Rq iij

INDEX NOMEN-
CLATIONVM, QVIBVS OF-
ficinae Seplastiariorum, & Herbarij
nostri temporis utuntur.

A Cacia	43	Buglossa	181
Agnus castus	45	C Alamentum	120
Agrimonia	163	Camomilla	148
Alcanna	41	Capillus Veneris	184
Alkekengi	170	Caprifolium	158
Aloe	15	Cartamus	201
Apium	129	Cataputia maior	193
Apium risus	144	Cataputia minor	195
Aphrodilos	101	Cauda equina	104
Arabis	97	Centinodia	155
Artichault	113	Cerefolium	93
Aspergula	138	Ceterach	142
B Alsamita	90	Cheiri	145
Bardana	180	Coloquintida	198
Basilicon	93	Consolida maior	157
Berberis	41	Cornu cerui	90
Berula	90	Crassula maior	107
Bismalua	151	Cucumer asininus	188
Borago	183	D Ragagan =	
Branca ursina	114	tum	114
Bruscus	186	E Nula campana	16
Bryonia	199	Eupatorium vulga	

INDEX

tum	151	M	Aluauiscus	151
F Aba inuersa	107	M Malūgranatū	49	
Filipendula	144	Mastix	33	
Flammula	156	Matricaria	149	
Fumus terre	180	Matrisylua	158	
G Allitrichum	146	Melissa	140	
Genista	191	Mexereon	197	
H Edera terre =		Milium solis	150	
stris	183	Millefolium	178	
Hepatica	165	Morsus galline	176	
Herba Iudaica	161	N Asturtium a =		
Herba Simeonis	151	quaticum	90	
Herba tetrahil	161	Nenuphar	147	
Hermodaetylus	175	O Robus		
I Arus	101	84		
Iringus	115	P Apauer cornu =		
Iua arthritica	152	tum	255	
Iusquiamus	169	Papauer rubrum	167	
L Acca	15	Parietaria	162	
Lapatium	86	Perforata	152	
Lappa maior	180	Persicaria	145	
Lappa minor	185	Pes columbinus	144	
Laureola	186	Petroselinum	129	
Lenticula aque	176	Piperitis	104	
Lilium conuallium	175	Plantago aquatica	152	
Linaria	185	Polytrichon	185	
Lingua hircina	160	Prasium foetidum	140	
Liquiritia	110	Pulicaria	144	

Q 9 iiij

INDEX

R esta bovis	114	Squinantum	13
Reuponticum	110	Stichas Arabica	117
Rostrum porcinum	91	Stœchas citrina	166
Rubia tinctorum	150	Sumach	48
S aponaria	102	T Amariscus	40
Satyrion	146	Tapfus barba	179
Scariola	91	tus	179
Scrofularia minor	106	Terpentina	33
Sicla	88	V Ermicularis	176
Sigillum Salomonis	156	Vicia syluestris	94
Siler montanum	126	Vincamperuinca	156
Solatrum	170	Virga pastoris	112
Sparagus	89	Vngula caballina	143
Spelta	80		
Squilla	102		

FINIS.

CURATIONVM MORBORVM IN DIOSCORIDE contentarum Index.

ABSCENSVM
remedia.

M^{El}
Cucurbitæ
Thlaspi Mentha
Viscum
Bechion siue Thussilago
Pentaphyllon
Buglosson

ABORTVM

facientia.

Asparagus Arisaron
Ampelolence
Hedysaron
Populus alba
Oxyacanthos
Coagulum
Brassica sativa
Cyclaminos
Dracunculus duplex
Onosma Elaterium

Scammonium

Thelypteris

Vinum phthorion, siue
abortivum

Vinum helleborites

Coniza.

ABORTVS,
remedia.

Sabina

Galbanum

ACONITO

contraria.

Balsamum

Morus

Lac schiston

Coagulum

Chamæpitys

Vinum in communi

Scoria, siue recrementum
ferri.

Diosco. lib. 6. cap. 7.

ACVLEOS ex:

libo
parto acer
herba bene-
nosa

INDEX

trahentia.
Vide, spicula corpori in=
fixa extrahentia.

ACVLEATORVM

putum *despectus* remedia.

Laurus

Malua

Sisymbrium

Anisum

Althæa

Oxalme

Vinum thymite

Adipum medele

Diosc. lib. 2. cap. 63.

ADVRENTES

ch musario medicina.

Buprestis

Cantharides

Pityocampe

Salamandra.

ADVSTIONVM

remedia.

Vide Ambustorum

remedia.

AEGYLOPIAE

spes *ad* remedia.

Asarum

Iuglans

Malua

Myosota, uel myosotis
altera

Baccharis Anthemis

Strychnon satium siue

Solanum hortense

Aegilops

Vua cenanthe Alica.

ALARVM

uirus
extinguentia.

Myrrha Myrtus

Scolymos, siue Cara

dus Alumen.

ALGORIS

res
media. *frigoris*

Laurinum oleum

Ocyminum unguentum

Cinnamomum

Aristolochia terra

Abrotonum

Vinum scilliticum

Eleomel, uel Eleomeli.

ALLII

acrimoniam
apza extinguentia.

Ruta

ALOPECIAE

mor
pelam bi remedia.

Myrtus

Oryza

Harundo

Iuglans

CVRA TIVVS.

Auellana		atque purgantia.	
Erinaceus terrestris		Asarum	Crocus
Hippocampus		Crocomagma	
Rane	Locusta	Oleum amygdalinum	
Adeps	Fimum	Oleum cicinum	
Rhaphanus	Beta	Oleum balaninum	
Cape	Milium	Oleum cnidium	
Sinapi	Cyclaminus	Olea Aethiopica	
Asphodelus		Fagus	Galla
Batrachion		Faba Thebaica	
Myosotis		Siliqua	
Nymphaea		Mespilus	Cornus
Cynoglosson		Ficus Aegyptia	
Adianton	Thapsia	Caprificus	
Aerugo ferri		Cerasia	Melimela
Sandaracha		Citrea mala	Pruna
Halcyonium	Cotes	Amygdala amara	
Cinis ungularum capri-		Morus	Ficus
narum.		Telline	Chamae
ALVV M con-		Iuncus odoratus	
turbantia. <i>Vētrē.</i>		Cochleae terrestres	
Eruum	Orobis	Sepia	Silurus
Brassica sativa		Pisces saxatiles	
Allium	Capparis	Lac	Lac schistum
Peplus	Vuae recentes	Butyrum	Medulla
Vinum dulce		Fel	Fimum
Aqua maris	Flos salis.	Tragus	Iinum
ALVV M soluentia		Lens	Phaselus

INDEX

Rhaphanus		Hippophaes	
Lapathum		Characias	Linoxostis
Nasturtium		Lathyrus	Quercus
Eruum	Eruca	Chamaesyce	Cici
Scandix	Lactuca	Scammonium	
Cucumis		Ampeloleuce	
Cucurbita	Atriplex	Thelypteris	Passum
Brassica sativa		Melicratum	
Brassica marina		Vinum Albanum	
Malva Blitum		Vinum Lesbium	
Asparagos		Coccimela	
Porrum	Caep	Vinum melitite	
Struthion	Zinziber	Thalassomeli	
Cyclaminos	Scilla	Vinum absynthite	
Bulbus esculentus		Vinum helleborite	
Agaricum	Aloe	Vinum scammonite	
Absynthium scriphium		Rubrica sinopis.	
Hyssopum		ALVVM sistentia.	
Ammoniacum		Aspalathus	
Phyllitis	Cestron	Mastichinum	
Scordion		Laurinum	
Chamaepitys		Populus nigra	
Androsomon		Populus picea	
Papaver ceratitis		Paliurus	
Vrtica	Cynoglosson	Oxyacantha	
Spartum		Cynosbatos	
Balanus myrepica, siue		Cistos	Rosa
glans unguentaria		Acacia	Palma

CVRA TIVVS.

Palma elate		Polygonon mas
Malum punicum		Lagogus
Malus	Silique	Clematis daphnoides
Cotoneæ		Xyris Anchusa
Mala epirotica		Gramen Parnasium
Pyra	Mespilus	Rubus Pentaphyllon
Lotus	Cornus	Phœnix herba
Sorbus Pruna syriaca		Idea radix
Lepus terrestris		Oxyschœnus
Lac	Caseus	Rubrica sinopis
Fulygo butyri		Aixoon
Sanguis	Fimum	Papauer sativum
Lyncurion	Triticum	Adianton
Brassica sativa		Phlomidès Vna
Hordeum	Plantago	Vinum phalernum
Crimnon	Seris	Vinum œnanthe
Bromos	Chondryllæ	Vinum passum
Oryza	Alica	Vinum rhoite
Milium	Faba	Vinum myrtite
Lens	Anethum	Vinum cedri
Apium	Aphace	Vinum lauri
Smyrnion		ALVINIS utilia.
Hippomarathrum		Coagulum
Acantha		Nymphaea
Aloe	Hæma	Clymenon
Ruta	Anisum	Papauer sativum
Orchis serapias		Omphacomeli
Pœonia	Althea	AMATORIIS nec

INDEX

icati.

neficijs attributa.

Cyclaminos
Catanance
Dorycnion
Coryledon
Mandragoras
Leontopodion
Phyteuma.

A M B V S T O R V M

brusati

remedia.

Acacia
Asphodelos
Aristolochia
Althea
Aixoon maius
Archion
Atramentum scriptorium
Buccinum
Cyros
Corium ustum siue ueterum calceamentorum
Cynoglossum
Cinnabaris
Ebulus
Phlomis, siue uerbascum
Gallion
Hypericon
Lactuca sylvestris

Ascyron

Alumen

Beta

Cistos

Fimum

Hedera

Helxine

Lilium
Morus
Narcissus
Oliue colymbades
Ouum
Platanus
Sesamum
Sal

Myrtus
Malua

Picea

Plantago

Stimmi

Thus

Vnguentum felinum.

A M P H I S B A E N A E

serpe morsus curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 64.

A N G I N A E re

axalia media.

Acetum Absynthium

Cyprinum unguentum

Cedria Cape

Crocodilium

Elaterium

Fel animalium

Fimum Hirundo

Hyssopus Irinum

Laserpitium

Mel Oxymel

Spartum siue genista

Sal Viola

Piper Pix

Rhaphanus

CURATIVVS.

ANHELITVS dif Bdelium

ficulatis re-

media. *fiat*

Panaces heracleon

Terra lemnia

Asarum

Balsamum

Diosco lib. 6. cap. 55.

Naphtha

ANIMI defectus

Centaurium maius

remedia.

Baccharis Peucedanum

Cucumis

Pulegium

Galbanum

Coris

Parthenion

ANIMI uolupta-

Adianton

tes auget.

Ampelolence

Buglosson.

Et infra in uerbo Ortho
pnoicis.

ANIMI deliquia
generantia.

ANIMALIVM fe-
ritas mitigatur.

Diosc. lib. 6. in prefat.

ANODYNA. *medicamenta*

Oenagra

Hyoscyamus

dolore sciatia

ANI remedia.

Aconitum pardalian-
ches.

Vide, Sedis remedia.

ANIMALIA uen-
tris expellentia.

ANTIDOTVM *remedio*
ingredientia. *contra veneno.*

Vide, Tineas latas pellen-
tia.

Acorus

Phu

ANIMALIA quæ
perimunt.

Amomum

Costum

Iuncus odoratus

Cyhi

Diosco. lib. 6. in prefat-
tionis fine.

Scincus siue scingus

Sanguis Rape sativæ.

ANIMALIVM

Napum, siue bunias

ictus remedia.

Brassica sativa

INDEX

Piper	Abrotonum	ARANEIS con=
Stichas	Ruta	traria.
Caros	Anethum	Morus
Petroselinon		Grossi
Hedysaron		Melanthion.
Mandragoras		ARANEI ictus
Rubrica, siue terra le=		remedia.
mnia.		Mullus piscis
APVM ictus		Allium
remedia.		Melissophyllum
Laurus	Malua	Coris Oxyschœnus
Sisymbrium		Hyacinthus
Althea		Aizoon maius.
Diosc. lib. 6. cap. 57.		ARGENTI uiui
APOSTEMA=		curatio.
tum remedia.		Diosc. lib. 6. cap. 28.
Vide, Suppurationum		ARGEMATVM
remedia.		morbi remedia. in 2
APPETITVM ge=		Fel animalium <i>in 2</i>
nerantia.		Vrina <i>oculorum</i>
Cerasia.		Lactuca sylvestris
APPETITVM		Cera Argemone
incitantia.		Anagallis Ocimum
Vinum in communi		Papauer ceratitus
Vinum Selenite.		Lotus sativa.
AQVAE inter cu=		ARQVATORVM
tem remedia.		<i>merby</i> remedia. <i>regi</i>
Vide, Hydropicorum.		Onos siue millepeda
		Asparagus

CURATIVVS.

Asparagus	Ruta	Thapsia
Cyclaminos	Thymoxalme	
Sphondylion	Vua passa	
Oenanthe	Vinum melitite.	
Buththalmos	ARTERIAE <i>cana</i> <i>illa</i>	
Chrysanthemon	remedia. <i>golla</i>	
Vinum absynthite.	Irinum	
ARSENICI, siue au	Myrrha	Thus
ripigmenti cu	Caryotæ, siue caryotis	
ratio.	des	
Diosc. lib. 6. cap. 29.	Ficus	
ARTICVLORVM	Sinapi	
<i>io</i> <i>ura</i> morbis utilia.	Prason, id est porrum	
Amurca Anethinum	Glycyrrhiza	
Agaricum	Triticum	
Arction	Rhaphanus	
Bulbus esculentus	Laserpitium	
Centaurium minus	Pentaphyllon	
Cinis uitium	Vua passa	
Helleborus niger	Rhodomeli	
Scammonium	Tragacantha.	
Mandragoras	ASPIDVM <i>mora</i>	
Meon	siue remedia.	
Nardus	Napththa	
Ouum	Narcissus	
Palma elate	Oxymel	
Pentaphyllon	Butyrum	Clematis
Psyllium	Daphnoides	
	Aqua maris	
	Diosc. lib. 6. cap. 70.	
	Rr	

INDEX

ASTRICTO =		Pyra	Pyra sylvestria
ria medicinae.		Mespilus	
Aspalathus		Mespilus alia	
Bryon	Crocus	Cornus	Morus
Oleum omphacinum		Lixivia ex ficu	
Oleum ex oleastro		Ionia sive Cionia	
Myrrha		Adeps	
Vnguentum melinum		Adipum medicinae	
Vnguentum cenanthinum		Faba Aegyptia	
Cortex thuris		Lens	Portulaca
Picea ac pinus		Seris	Porrum
Pityides	Lentiscus	Hedera	Myosotis
Terebinthus		Agaricum	
Fuligo picis		Rhaponticum	
Cypressus	Iuniperus	Gentiana	
Vlmus	Paliurus	Absynthium	
Cyprus	Lilia	Absynthium seriphium	
Cistos	Hypocistis	Mentha	Melilothus
Cydonia	Rosa	Maron	Ruta
Acacia	Salix	Cuminum sativum	
Vitex		Hieracium minus	
Olea sylvestris		Conixæ tertium genus	
Quercus	Castanea	Lysimachium	
Galla	Thus	Clymenos	Anchusa
Palma	Palma elate	Idea radix	
Malicorium	Myrtus	Granum tinctorum	
Myrtidanum	Malus	Chrysocome	
Cotonea	Persica	Aizoon minus	

CVRATIVVS.

Phlomidēs	Arfenicum	Sal
Lotus syluestris	Fæx uini	Spongia
Ebulus	Lapis Phrygius	
Vitis syluestris	Lapis Asiꝯs	
Nuclei acinorum	Lapis scissilis	
Vua ænanthe.	Terra eretria	
Omphacium	Lapis Samius	
Passum	Fuligo pictoria.	
Vinum omphacite	ASSVLAS fixas cor	felide dō
Vinum nigrum è labrusca	poribus extra-	asse
Vinum cydonite	hentes.	
Omphacomeli	Cochlea terrestres.	
Vinum apyte	ATTONITIS utilia	
Vinum myrtite	Ampeloleuce.	
Vinum palmeum	AVRGINEM	morbis re-
Vinum è cedro	tollentia.	nus color
Vinum pissite	Lycium	auri.
Vinum absynthite	Agaricum	
Vinum tragoriganite	Libanotis coronaria.	
Vinum prasite	AVRICVLARVM	
Vinum calaminthite	remedia.	
Vinum aromatite	Bulbus esculentus.	
Spuma argenti	AVRIVM medi-	
Chrysocola	cine.	
Cinnabaris	Cannabis satiuā	
Chalcanthon	Araneus	
Diphryges	Adipum medicinae	
	Asphodelus	
	Absynthium	Anisum
	R r	ij

INDEX

Aparine	Aqua maris	Omphacium	Pix
Acetum		Populus alba	
Acetum scilliticum		Plantago	
Alumen	Aphronitrum	Porrum	Peucedanus
Blatte	Beta	Prasum	
Crocus	Cistos	Polygonon mas	
Cornix	Cucurbita	Papauer satium	
Cape	Capparis	Psyllium	
Cucumis anguinus		Rhus obsoniorum	
Daphnides		Rosa	Salix
Dracunculus maior		Senecta serpentis	
Ficus		Sesamum	Sinapi
Fel animalium		Spondylium	Stoebe
Faba Aegyptia		Strychnum satium	
Flos aris	Flos salis	Sulphur	
Hedera	Helxine	Thus cum pice	
Irinum unguentum		Terebinthina	
Hyssopus	Laurinum	Vermes	Vrina
Lycium	Lapation	Vinum myrteum, siue	
Malum punicum		myrsinite	
Myrtus	Mel	Vinum cedrites.	
Myosotis	Mentha	B DELLARVM,	
Melilotus	Myrrha		siue hirudinum cu
Oleum amygdalinum		ratio	
Oleum balanium		Diosc. lib. 6. cap. 32.	
Oleum hyoscyaminum		BESTIAS fu-	
Olea sylvestris		gantia.	
Onos	Origanum	Acanthaleuce, siue spia	

CURATIVVS.

na alba.

BESTIARVM ue-
nenatarum remedia.

Balsamum.

BESTIARVM mor-
sus remedia.

Helenium Aegyptium

Sanguis Porrum

Allium Argemone

Eryngium Pulegium

Apium Vinum cedrite

Sal Terra samia.

BILEM adgene-

rantia. *colera*

Iuglans.

BILEM pur-

gantia.

Agriorhaphanus

Androsamos

Anchusa Apios

Brassica canina

Calamintha

Clematis Cici

Cucumis anguinus

Characias Chamelea

Helleborum nigrum

Elaterium Ebulus

Epithymum Empetron

Helenium Hippophaes

Heliotropium

Iris Illyrica

Lychnis sylvestris

Lathyrus Linoxostis

Malus Melanthion

Mentha

Mandragoras

Ocimum Parthenion

Peplos Scammonia

Thlaspi Thapsia

Thymelea

Vitis sativa

Unguentum susinum

id est, lilij.

BLATTAS in se

contrahentia. *Larme*

Phlomidis.

BOVM scabiem

emendantia.

Cedria.

BRONCHOCE-

las discutientia. *tumor gutture*

Vide, gutturis remedia.

BVPRESTIS ue- *aiat vene-*

neni remedia. *natu*

Lac schiston

Diosc. lib. 6. cap. 3.

R r ij

INDEX

C ACHEXIAE, id	Bdellium	Daphnides
est maciei remedia.	Paliurus	Pruna
Aqua maris.	Fimum	Lapathon
C ACOETHE	Sisymbrium	Ononis
remedia.	Cyminum sylvestre	
Vnguentum rosaceum	Artemisia	
Crocinum	Thus	Hippomarathon
Glandes	Ficus	Asplenon
Cicer	Plantago	Parthenion
Dracunculus maior		Peonia
Dracunculus minor		Lithosperma
Hedera Viscum		Althæa
Asclepias		Tribulum
Psyllium		Saxifragum
Urtica		Gramen
Petasites		Tragion
Cadmia		Acanthus
Diphryges		Cotyledon prima
Flos salis.		Vitis sativa
C ALCIS curatio.		Myrtus sylvestris
Diosco. lib. 6. cap. 29.		Oxalme
C ALCVLI remedia.		Lapis Iudaicus
Cyperus		Ochra
Cardamomum		Lapides spongiarum.
Oleum amygdalinum		C ALEFACTIO
Cerasia		rie medicinae.
Amygdalus amara		Adipum medicinae
Ossifragus		Medulle animalium
Vrina		Fel
Struthion		Cera
Centaurium maius		Triticum
	Sium	Rhaphanus
		Rhaphanus agria

mal Typa.

CVRATIVVS.

Sisymbrium	Eleomeli	Laurinum
Sisymbrium aquaticum	Sampsuchinum	
Sinapi	Nasturtium	Ocyminum
Thlaspi	Erysimon	Anethinum
Piper	Zingiber	Susinum
Dracunculus maior	Cyprinum, siue ligustri-	
Dracunculus minor	num	
Asphodelus	Irinum	Cleucinum
Bulbus esculentus	Amaracinum	
Agaricum	Metopium	
Gentiana	Stacte	Nardinum
Anonis, siue Ononis	Malabathrinum	
Eryngion	Myrrha	
Absynthium	Myrrha Bæotica	
Absynthium seriphium	Styrac	Bdellium
Hyssopum	Thus	Terebinthus
Origanum	Resina	Palimpissa
Tragoriganum	Iuniperus	
Pulegium	Sabina	Cedria
Mentha	Cedrides	Laurus
Serpyllum	Daphnides	Cyprus
Sampsuchum	Cistos alia	Vitex
Maron	Amygdale amara	
Aspalathus	Ficus	
Crocomagma	Lixivia ex fico	
Helenium	Cisseris	
Oleum vulgare	Cochleæ terrestres	
Oleum sicyonium	Fiber	
Strigmenta gymnastorum & palæstrarum.	Buprestis pityocampa	
	Rr iiij	

INDEX

<i>Salamandra</i>		<i>Aerugo aurificum</i>
<i>Oesypus</i>		<i>Chrysocolla</i>
<i>Panaces heraction, siue</i>		<i>Chalcanthon</i>
<i>herculeum</i>		<i>Alumen</i> <i>Sulphur</i>
<i>Ligusticum</i>		<i>Flos salis</i> <i>Pyrites</i>
<i>Seseli Massiliense</i>		<i>Lapis hematites</i>
<i>Sison</i>	<i>Anisum</i>	CALEFACTO-
<i>Caros</i>	<i>Anethum</i>	<i>rum remedia.</i>
<i>Cuminum sativum</i>		<i>Lana succida. nō lota.</i>
<i>Ammi</i>	<i>Oreoselinon</i>	CALIGINIS
<i>Smyrnion</i>		<i>oculorum re-</i>
<i>Hippomarathrum</i>		<i>media.</i>
<i>Daucus</i>	<i>Libanotis</i>	<i>Fel animalium</i>
<i>Laserpitium</i>		<i>Lactuca sylvestris</i>
<i>Galbanum</i>		<i>Ocymum</i> <i>Cape</i>
<i>Ammoniacum Stachys</i>		<i>Dracunculus maior</i>
<i>Scordion</i>	<i>Artemisia</i>	<i>Sinapi</i> <i>Nasturtium</i>
<i>Anthemis Chrysocome</i>		<i>Erysimon</i> <i>Piper</i>
<i>Portulaca agrestis</i>		<i>Zinziber</i>
<i>Lotus sylvestris</i>		<i>Dracunculus minor</i>
<i>Vinum picatum</i>		<i>Anagallis</i>
<i>Vinum in communi</i>		<i>Chelidonium maius</i>
<i>Aqua maris</i>		<i>Sagapenon</i>
<i>Vinum è cedro, arbori-</i>		<i>Chamaedrys</i>
<i>busq; alijs</i>		<i>Chamaesyce</i>
<i>Vinum è cypresso</i>		<i>Flos æris</i>
<i>Vinum cedrite</i>		<i>Pumex</i> <i>Fæx uini</i>
<i>Vinum chamaedryte</i>		<i>Lapis thyites</i>

C V R A T I V V S.			
CALLORVM		Vrtica	Cynoglosson
remedia.		Fœniculum	
Triticum		Ballote	Oxalme
Laserpitium		Aphronitrum,	sive spu=
Chalcitis lapis		ma nitri.	
CANCRESCEN=		Diosc. lib. 6. cap. 37.	
tibus ulceribus		Herm. Coroll. cap. 212.	
medetur.		CANIS non rabidi	
Vrtica.		morsus remedia.	
CANES occidentia.		Amygdalæ amaræ	
Asparagus		Iuglans	Ficus
Apocynon.		Mituli	Gobius
CANIS rabie sanat.		Cucumis	
Alyssum.		Bulbus esculentus	
CANIS rabiosi mor=		Mentha	Ebulus.
sus remedia.		CANIS impetum	
Lycium	Cancr	cohibentia.	
Cinis uitium	Garum	Iecur & dens canis.	
Omotarichos		CANES necantia.	
Smaris		Chamæleon albus.	
Iecur ardens canis		CANVM scabiem	
Triticum	Sanguis	emendantia.	
Mel	Grossi	Oleum lentiscinum	
Panaces heracleon		Cedria.	
Cæpe	Laserpitium	CANTHARIDES	sp. ver.
Vrina		fugantia.	mi tem
Aster atticus		Vnguentum melinum.	mi.
Melissophyllon		CANTHARIDVM	

INDEX

ueneni remedia.	Aqua maris.
Lac schiston	CAPILLVM pur-
Adipum medicinae	gantia.
Diosc. lib. 6. cap. 1.	Fœnogrecum
CAPILLORVM	Linum.
defluuium repri-	CAPILLOS
mentia.	tingentia.
Oleum ex oleastro	Acacia
Myrrha	Myrtus
Cistos alia, siue ladanū	Morus
Myrtus	Stratiotes terrestres
Brassica satina	Ebulus
Nasturtium	Terra ampelites.
Aloe	CAPILLOS
Adiantum.	nutrientia.
CAPILLVM	Iuglans
denigrantia.	CAPITIS ulcerum
Cupressus	remedia.
Fagus	Ilex
Palma elate	Balsamum
Myrtus	Oleum ex oleastro
Elelisphacos	Hedera
Vinum myrtite.	Rubus
CAPILLVM	Oleum amygdalinum
rufantia.	Vnguentum rosaceum
Cyprus	Telinum
Lotus	Narcissinum
CAPILLVM flauū	Myrrha
reddentia.	Thus
	Vrina
	Fœnogrecum
	Cicer
	Linum
	Malua
	Allium
	Cyclaminos

CVRATIVVS.

Bulbus esculentus		Melanthion	
Melilotus	Lilium	Conixa maior	
Bettonica, siue Britan-	Anagyris	Bettonica	
nic.	Radix hederae		
Xyris	Rubus	Oxyshœnos	
Rubus Ideus	Oxalme	Psyllium	
Vinum myrsinite	Sal.	Papauer rhœas, siue erra-	
CAPITIS doloris		ticum	
remedia.		Strychnon, siue solanum	
Iris Illyrica	Asarum	fatium	
Meon siue meu		Aizoon maius	
Oleum oleastri		Hippoglosson	
Oleum amygdalinum		Chamedaphne	
Vnguentum rosaceum		Myrtus sylvestris	
Narcissinum	Cyprus	Elaterium	
Rose	Vitex	Scammonium	
Amygdale amara		Vitis sativa	
Torpedo		Vinum	
Lac humanum		Vua œnanthe	
Lana succida		Aqua maris	
Curmi	Sisymbrium	Acetum scillite	
Sesamum	Hedera	Lapis ophites.	
Portulaca	Aloe	CAPITIS dolorem	
Mentha	Serpyllum	facientia.	
Baccharis	Ruta	Styrax	Olinæ
Anisum		Glandes	Palma
Sphondylion		Arbutus	
Pencedanum		Inglans	

INDEX

Eruum	Lascepitium
Absynthium	Nasturtium
Ferula	Olea sylvestris
Men, siue meon	Pix Plantago
Peucedanus	Panaces heracleon
Mandragora	Sabina Vna passa.
Vinum gypsatum	CARDIACO
Vinum phœnicite	rum reme= <i>mal di</i>
Vinum rhetinite	dia. <i>uor.</i>
Vinum mesagite.	Buprestis
CAPVT purgantia.	Seris Rubus.
Anemone	CARNEM tenerio=
Brassica satina	rem reddentia.
Beta	Cape Vrtica siue acalyphe.
Chelidonium minus	CARNEM coalescere
Chalcanthum	<i>Cresset</i> facientia.
Cyclaminos	Lixiua ficus
Origanum.	Symphyton.
CARBUNCULO=	CARNES superuas
rum medicine.	cuas compescentia.
Brassica satina	Characias Cadmia
Cupressus	Aes ustum
Cinnamomum	Flos æris
Cyprus	Lascepitium
Coriandrum Characias	Lana usta
Eruum	Fimum Lapis Asius
Iuglans	Spuma argenti
Lupinum satium	Smaris

CURATIVVS.

[CARCINOMA= Rosa Sal
tum remedia. *cācro* Dioscor. lib. 6. cap. 55.

Fuligo thuris

& 69.

Buprestis

Cicer

CERVSSAE

Erysimon

curatio.

Dracunculus maior

Diosc. lib. 6 cap. 22.

Dracunculus minor

CERIONVM ulce=
rum remedia.

Aristolochia tertia

Vrtica

Galiopsis.

Grossi

Pepo

CASEVS ne cariem

tarlo sentiat.

Quere, Fauos rum=
pentia.

Dracunculus minor.

CERVICIS rigoris
medicina.

CAVA implentia.

Cadmia

Pompholyx

Vide, Opisthotonicorum
remedia.

Cerussa

Lapis schistos

CHIRONIORVM

ulcerum remedia.

Lapis morochthus

Terra samia

Fuligo thuris

Plantago

Ampelolence.

Aristolochia tertia.

CHOLERICIS

utilia.

CAEPAE acrimo=

fixa, niam retundit.

Cotonea mala.

Ruta.

Calamintha

CAERASTAE

Ferrum

Mentha

sepe ictus remedia.

Polygonon mas.

Cedria, siue cedrinus li=

CICATRICVM

quor

remedia.

Harundo

Anemone

INDEX

Aloe	Adeps Herm. Cor. cap. 366.
Bulbus esculentus	& 806.
Balanus myrepfica	CLAVORVM
Cistos Centaurium	remedia.
Chamaesyce	Smaris Fimum
Calx uina	Laserpitium.
Corallium	COELIACORVM
Aes ustum	remedia.
Aeris flos	Myrrha Hypocistis
Aerugo aurificum	Lycium
Fuligo buxyri	Olea syluestris
Faba Fex uini	Quercus aut robur
Oleum myrtinum	Galla Thus
Oleum Balaninum	Myrtus Cotonea
Oleum cicinum	Morus
Olea Aethiopica	Lixima ex ficu
Peucedanum	Ceruinum cornu
Plumbum elotum	Faba Aegyptia
Pumex	Lapathon
Scoria argenti	Plantago Coronopus
CICVTAE contraria.	Rhaponticum
Passum & uinum	Acantha leuce, siue spina alba
Vinum in communi	Ferula
Acorum	Laserpitium
Herm. Cor. cap. 17.	Tragos herba
CIMICES fugantia & negantia.	Papauer satium
	Vinacei

C V R A T I V V S.

Nuclei uinaceorum	Myrica	Paliurus
Eleomeli	Cyprus	
Vinum phœnicite	Olea syluestris	
Vinum rhetinite	Glandes	Morus
Ferrum	Grossi	Ouum
Lapis morochthus.	Triticum	Hordeum
COLI remedia <i>my tor</i>	Fœnogræcum	
Colocynthis <i>meti</i>	Linum	Cicer
Fimum	Galerita	Agriorhaphanus
Mel	Petroselinum	Plantago
Ruta	Sesamum	Nasturtium
Talus suis.	Bulbus esculentus	
COLOREM com=	Argemone altera	
mendantia.	Rhaponticum	
Acetum scillite	Acantha leuce	
Buphthalmos	Thymus	
Cerussa	Coriandrum	
Cuminum satium	Smyrnum	
Laserpitium	Libanotis	Viscum
Mastichinum	Parthenion	
Vnguentum rosaceum	Cannabis syluatica	
Vinum	Anagyris syluatica	
Vinum aromatite.	Helxine	
COLLECTIO=	Pentaphyllon	
num remedia. <i>lum</i>	Peristerion supinus	
Amomum <i>us pher nam</i>	Papauer satium	
Vnguentum telinum	Stratiotes aquaticus	
Zopissa	Naphtha	Cytisus

INDEX

Ampelos leuce
Vinum in communi
Vinum adynamon
Vinum cydonite.

mal caduus COMITIALIS morbi remedia.

Cardamomum
Balsamum Naphtha
Populus nigra Ficus
Iuncus odoratus
Lepus terrestris
Mustela
Vnguis asini
Lichen equi
Iecur hirci Hirundines
Serum Lac humanum
Coagulum Fel
Sanguis Fimum
Plantago
Eryngion Ruta
Seseli Massiliense
Libanotis
Spondylion
Peucedanum
Laserpiliun
Galbanum
Sagapenum
Ammoniacum

Trifolium
Conixa Anthyllis
Symphyton Cestron
Pentaphyllon
Papauer aphrode'es
Viola purpurea
Helleborum nigrum
Hippophaston
Ampelos leuce
Ampelos melena
Oxymel
Acetum scillite
Lapis selenites
Lapis aetiles
Cotes.

CONCEPTIONE contraria.

Epimedium
Heliotropium maius
Aerugo ferri
Alumen
Lapis ostracites
Herm. Coroll. cap. 267.

CONCEPTIO-
nem facilitantia.

Coagulum
Lolium
Staphylinos agrios
Lapis

CURATIVVS.

Lapis samius. alsamum Helenium

CONCOCTIO = Calamus odoratus
ni utilia, *Siges* Sampsuchinum

Anethum Althæa Metopium

Acetum scillite Bdellium Iuniperus

Balsamum Crocus Cedrides Halimos

Crocomagma Lixivia à ficu Fimum

Caros Cestron Dracunculus maior

Calx uiua Eruca Dracunculus minor

Ligusticum Pulegium Asphodelus

Papauer satium Capparis Argemone

Resina Syrax Rhaponticum

Seseli Masiliense Gentiana

Sulphur Vinum Aristolochia tertia

Vinum resinatum Centaurium maius

Vinum absynthite Acantha leuce

Vinum tragoriganite. Abrotonum

CONSTRICTO = Origanum Pulegium

ria medicine. Calamintha

Vide, Adstrictorie me- Serpyllum

dicine. Baccharis

CONVULSIO = Panaces heracleon

nis remedia. *spasma* Libanotis

Iris Illyrica Peucedanum

Acorus Laserpitium

Cardamomum Sagapenor

Asarum Costus Galbanum

Iuncus odoratus Clinopodium

ss

INDEX

Chamedrys	Vinum in communi
Alisma	Cestron Dioscor. lib. 6. cap. 9.
Xyris	Symphytum
Psyllium	Phlomides
Ampelo leuce	functa à corruptione diu tuetur.
Vinum scilliticum	Cedria.
Vinum chamadryte	CORPVS MA =
Vinum tragoriganite	crescentia.
Vinum daucite	Canthamum.
Vinum panacite.	COXA EDOLLO =
<i>per ma</i> GONDYLOMA =	ris remedia.
<i>in circa</i> Cololum remedia.	Strigmēta à palestris.
<i>na am</i> Strigmenta à balneis	COXENDICVM
Myrteum	doloris remedia. <i>usta</i>
Cotonea	Ouum
Aloe	Anethum
Libanotis	Agaricus
Ballote	Stachys
Phalangion	Aster Atticus
Penthaphyllon	Acetum scilliticum
Vitis sativa	Ferrum
Plumbum elotum	Centaurium minus
Sandaracha.	Calamintha
CORDIS TRE =	Coris
moris medicina.	Cestron
Nardi spica.	Cucumis sylvestris
CORIANthro	Erysimon
<i>per herbe</i> contraria.	Euphorbium
	Fimum
	Garus
	Helenium
	Ammoniacum

CVRATIVVS.

Hypericon Hiberis gantia. *xenxale*.

Heliochrysos Cupressus

Iris Illyrica Lolium Conixa Ebulus

Lupinum satium Absynthium

Laserpitium Hiberis

Naphtha Onos Plumbum ustum.

Populus alba CVTEM albicantia.

Panaces heracleon Rapum sylvestre.

Peucedanum CVTEM erugantia. *listeder*

Pentaphyllon Ruta Oleum amygdalinum

Scammonium Styrax.

Vinum a sarite Xyris. CVTEM lenientia.

CRASSITVDI = Amygdala amara

nem extenuantia. Oleum sicyonium

Porrum Vnguentum telinum

Staphis agria. Succus peponis

CROCEVM CO = Terra Chia.

lorem facit.

CVTIS VITIA

Rhaponticum.

tollentia.

CRVDITATIS

remedia / cul

Balsamum

Strigmenta à balneis

Gentiana

Vinum scilliticum.

CRVSTAS generat

Lana usta.

CVLICES FV =

Lotus sylvestris

sf ij

I N D E X

<p>Mel Ponticum Oleum raphaninum Picea Sanguis leporis Spuma argenti. CVTIS PRVRI= tus remedia . Lac</p> <p style="font-size: 2em; float: left; line-height: 1; margin-right: 5px;">D</p> <p style="clear: both;">ENTIVM doloris remedia.</p> <p>Amurc.i Halicacabus Asparagus Allium Anagallis Aristolochia Acantha leuce Absynthium Arction Acetum Acetum scillite Alumen Batrachion Cedria Cytinus Cochleæ terrestres Capparis Chelidonium maius Chamæleon niger Clematis daphnoides Cucumis anguinus, si= ue siluestris</p>	<p>Characias Colocynthis Ephemeron Helleborus niger Ficus Galba Galbanum Hedera Hyoscyamus Hyssopus Laserpitium Leucacantha Myrica Morus Melanthion Melissophyllon Naphtha Olea Acthiopica Picea Plantago Panaces heracleon Pyrethrum Peucedanum Pentaphyllon Rhus Rane Sepia Senecta serpentis Strychnon hypnoticon, sive somniferum Vnguentum rosaceum Vermes terreni.</p> <p style="text-align: right;">DENTIVM STV</p>
--	---

CURATIVVS.

poris remedia.	DEPILES faciētia.
Portulaca	Scolopendria
DENTITIONI	Characias.
infantium utilia.	DESQVAMATIS
Leporis cerebrum	utilia.
Butyrum cum melle.	Strigmenta gymnastorū
DENTIFRICIA.	Lana succida.
Purpura Buccinum	DESTILLATIO
Ceruinum cornu	nes coercentia.
Halcyonium	Irinum Styrax
Corallium.	Naphtha
DENTIBVS STV	Et in uerbo, Pituitæ des-
porem adferentia.	stillationis remedia.
Cadmia.	DILACRYMA=
DENTES firmātia.	tiones emendantia.
Lentiscus	Picea Pinus.
Oliuæ colymbades	DISCVSSORIAE
Myrrha	medicinæ.
Oleum omphacinum.	Androsæmon
DENTES ALBI=	Althæa Viscum
care facit.	Galbanum
Halcyonium.	Ammoniacum
DENTES VITIA	Lapis Gagates.
tos extrahentia.	DOLORVM inue=
Amurca	teratorum remedia.
Oleum oleastri.	Sinapi
DENTES mouētia.	Lana succida
Oleum oleastri.	Sf iij

INDEX

Ligusticum.	Capparis	
DOLORES lateris.	Erysimon	Aegilops
Vide, laterum dolores.	Ficus	Fimum
DOLOREM ne sen-	Glans	Galiopsis
tiant qui urendi se-	Hydropiper	
candine sunt.	Ammoniacum	
Mandragoras	Lens	Linum
Lapis memphites.	Lapis alabastrites	
DORYCNI curatio	Megalion	
Diosc. lib. 6. cap. 6.	Melanthion	
DRACONIS MA-	Mandragoras	
rini morsus.	Porrum	
Mullus piscis	Panaces heracleon	
Vrina	Ocymum	Pentaphyllon
Absynthium	Paronychia	
Plumbum elotum &	Pyrites	Styrax
crematum	Sanguis	Smyrnion
Sulphur	Terra cimolia	
Diosc. lib. 6. cap. 61.	Vinacei	
DRYINI MOR-	DYSENTERI-	
sus curatio.	corum remedia.	
Diosc. lib. 6. cap. 65.	Adipum medicine	
DVRITIEM E-	Asparagus	Argemone
mollientia.	Agaricum	
Amaracinū vnguentū	Althea	Alcea
Bdellium	Allisma	
Buphthalmos	Aizoon maius	
Cyprinum.	Butyrum	Cupressus

CURATIVVS.

Cotonea	Cornu	Pentaphyllon
Ceruinum cornu		Papauer ceratite, siue
Coagulum	Cera	corniculare
Glematis daphnoides		Quercus
Elatine		Rubrica, siue terra lenia
Eupatorium		Silurus Sanguis
Fænogracum		Sium Scordium
Faba Aegyptia		Symphyton
Ferrum	Galla	Stœbe
Omphacium		Sideritis achillea
Hypocistis		Salsugo Tragion
Hedera	Hippuris	Vitis sativa, siue vini fer-
Lentiscus	Lycium	ra Vinacei
Lotus		Vinum cydonite
Lixiua ex fico		Et in uerbo, Intestino-
Lac schiston		rum remedia.
Linum	Lapathum	E BRIETATI
Lysimachia		utilia.
Myrrha	Macer	Amygdalus amara
Malum punicum		Brassica sativa
Melissophyllum		Absynthium.
Naphtha		E LEPHANTIAE
Nymphaea		remedia.
Nuclei acinorum		Cedria
Oryza	Omphacium	Erinaceus terrestris
Oxalme	Portulaca	Serum
Plantago	Phyllitis	Fel animalium
Polemonium		Zythum Plantago

S f iij

INDEX

Calamintha.	Resina	
ELEPHANTIAS	Syrax	Viscum.
gignentia.	ENTEROCELAE	
Vinum sicyle.	remedia.	
EMOLLIENTES	Hippuris, siue equisetū.	
medicine.	EPHELIDIS	
Adipum medicine	utilia.	
Bdellium	Balanus myrepfica	
Cinnamomum	Cici.	
Cypros	EPINYCTIDIS	
Cistos	Cera	morbi remedia.
Cerussa	Chalcanthum	Olea sylvestris
Calx uua	Oesypus	Myrtus
Fœnogræcum	Amygdale amara	
Cleucinum	Grossi	Fimum
Ammoniacum	Brassica sativa	
Irinum	Laurus	Plantago Cucumis
Lana succida		Porrum Absynthium
Linum		Coriandrum cum melle
Lapis Gagates		passaque uua
Metopium		Viscum
Myrrha Bœotica		Heliotropium maius
Medulle animalium		Vua passa
Naphtha		EPIPHORAE
Palimpissa		remedia.
Panaces heracleon		Asarum Malobathrum
Psyllion		Cotonea Crimnon
Plumbum elotum		Coriandrum Lilium

CURATIVVS.

Ambrosia Vna passa Ochra Pumex

Terra samia Pyrites Scordion

ERV CIS pinorum Spuma argenti Sal.

conuenit

EXTEN VATO =

Vnguentum melium

ria medicine.

Dios. lib. 6. cap. 2.

Artemisia

ERVPTIONVM

Anthemis

remedia.

Iris Illyrica

Serum

Hyssopus

Lupinum satium

Lapis hematites

Beta Portulaca

Pulegium

Penthaphyllon

Panaces heracleon.

Balanus myrepica

EXTRACTO =

Vinum myrsinite

ria medicine.

Alumen.

Galbanum

EXCREATIO =

Viscum

Thassia

nis crasse pectoris

Scoria argenti.

remedia.

FACIES ne à sole
aduratur.

Pix liquida

Ouum

Dracunculus minor

FACIEI vitia au-

Tordylon.

ferentia.

EXCRESCEN =

tia deprimentia.

Ampelos agria

Alumen

Cerussa

Halcyonium

Cinis vitis

Adarces

Diphryges

Brassica satina

Erinaceus marinus

Bulbus esculentus

Lapis Asius

Balanus myrepica

INDEX

Cinnamomum	Peponis radix
Cochlea terrestres	Grossi.
Cyclaminos	FAVCIVM morbi
Eruum	Ficus remedia.
Hedera	Iris Illyrica Acetum
Lepus	Lilium Acetum scillite
Lotus sylvestris	Cacalia Aethiopsis
Mastichinum	Ficus Lac
Mel sardoum	Laserpitium Mel
Oleum amygdalinum	Papauer satium
Oleum raphaninum	Styrax.
Pepo	Polygonaton FAVCES asperas
Spuma argenti	facientia.
Sisymbrium aquaticum	Characias
Thapsia.	Cimolia terra.
FACIEI rugas aufe-	FEBRIBVS con-
rentia.	traria.
Cacalia.	Mala punica.
FASTIDIVM 'ge-	FEBRIFUGIA.
nerantia.	Centaurium minus
Vinum catorchite	Coniza.
Diosc.lib.6.in præfat.	FEBRIVM remedia.
FATIGATIO	Agaricum
num remedia.	Aristolochia tertia
Adeps.	Anthemis Anchusa
FAVOS rumpentia.	Aphronitrum
Eruum	Balsamum Buglossum
Vua passa	Coitus Cucurbita

C V R A T I V V S.

Clymenon		Verbenaca supina	
Foeniculus	Hypericon	Trifolium	Ruta.
Hyoscyamus		FELLE	suffusis
Heliotropium maius			utilia.
Lac humanum		Adiantum	
Lagopus		Vinum a sarite.	
Myrrha Ouum		FELLEI	humoris
Oleum siccyonium			remedia.
Portulaca	Piper	Absynthium	
Panaces heracleon		Centaurium minus.	
Polygonon mas		FERITATEM	ani
Pentaphyllon			malium mitigantia.
Peristerion supinus		Oenagra.	
Rhaponticum		FERRVMINA	N=
Ruta	Smyrnion		diuim habentia.
Sapapenon		Spuma argenti	
Saxifraga		Rubrica sinopis	
Trifolium	Vua	Spongia	
Vinum melitite		Lapis morochthus.	
Vinum rhoite		FILIVM	masculum
Vinum hyssopite.			generantia.
FEBRIS quartane		Phyllon	Orchis
remedia.		Crataegonos.	
Arancus	Buglosson	FISTVLARVM	
Cimices lecti	Dipsacu		remedia.
Hypericon		Adeps	Arifaron
Heliotropion maius		Cinnamomum	
Pentaphyllon		Characias	

INDEX

Calcites lapis	Acetum	Ebenus
Dracunculus minor	Licium	Lixivia ex ficu
Dipsacus	Vinum rhoite	
Helleborum nigrum	Vinum terebinthinum	
Orchis Serapias	Vinum pissite	
Omphacinum	Vinum melampsythiū.	
Papyrus	Plantago	FOETVS necantia.
Pentaphyllon		Vide, Partus necantia.
Stratiotes terrestris.		FOEMINAS ste-
FLATVS discus-		rientia.
tientia.		
Cinnamomum	Lepus terrestris	
Ocymum	Hedera	
Vinum stichadite.		FORMICAE mor-
FLATVM adges-		bi remedia.
nerantia.		
Malus	Zythum	Cicer
Phaseolus.		Characias
FLUXIONVM		Chamaesyce
remedia.		Batrachion
Fuligo butyri		Dipsacum
Erysimon		Heliotropium maius
Lichen in petris		Lacerta
Ocymum	Portulaca	Ruta
Pepo	Squama eris	Thus
Papauer sativum		Vitis sativa.
Acantha Arabica		FRACTURAE
Chium vinum		remedia.
		Fuligo pictoria.
		FVNGORVM ve-
		nenatorum re-
		media.
		Verbenaca
		Fimum
		Mel

C V R A T I V V S.

Rhaphanus		Malua	
Absynthium		Oleum oleastri	
Melissophyllon		Oleum amygdalinum	
Fungi		Oleum myrtinum	
Vinum in communi		Oxalme	
Acetum		Olea	Salix
Chalcantium	Sal	Vnguentum melinum	
Pyrorum ligni cinis		Vnguentum telinum	
Aphronitrum		Vrina	
Cinis uitium		Vinum myrsinite	
Lapis Afsus		Allium	Beta.
Diosc. lib. 6. cap. 23.		G A N G R A E N A E	
FVRVNCVLO=		morbi remedia.	
rum remedia.		Ampelos leuce	
Ficus		Brassica sativa	
Grossi	Triticum	Bulbus esculentus	
Rhaphanus		Cinnamomum	
Asphodelus		Characias	Galiopsis
Galbanum		Iuglans	
Pygnoconomum	Sal	Lixivia e fico	
Aphronitrum.		Lilium	Lens
FVRFVRES tollen		Lupinum sativum	
tia.	Allium	Laserpitium	
Adiantum	Alumen	Rhus	Rhaphanus
Foenogracum		Vrtica	Vua passa.
Fel animalium		G E N I T A L I V M	
Grossi	Linum	morbi remedia.	
Lilium	Myrtus	Asparagus	Amurca

INDEX

Aloe	Aster atticus	nem deprimentia.
Cyprinum	Cotyledon	Clymenon
Fœnegræcum		Heliotropium maius
Flos salis Linum.		Mentha Thelypteris
Malum punicum		Xyphion Asplenon.
Polygonon		GENITVRAM ex-
Sampsuchinum		tinguentia.
Vinum terrebinthinum.		Cannabis sativæ semen
GENITALIVM		Anethum.
virus extin-		GENITVRAM
guentia.		Argentia.
Alumen.		Semen coriandri
GENARVM morbi		Coriandrum.
remedia.		GENITALIVM
Aloe		torporem in-
Aerugo aurificum		ducentia.
Aerugo ferri		Cicuta.
Ammoniacum		GINGIVARVM
Lapis schistos		morbi remedia.
Mituli	Naphtha	Aristolochia tertia
Olea sylvestris.		Aloe Acetum
GENITVRAE		Acetum scillite.
profluviij in som-		Alumen Butyrum
no remedia.		Canchamum Cytinus
Lactuca sylvestris		Chalcitis lapis
Nymphaea		Aerugo aurificum
Hermol. Cor. cap. 932.		Aerugo ferri
GENERATIO		Galla Lycium

CURATIVVS.

Lepus terrestris

GUTTURIS

Lac schiston

remedia.

Lapis alabastrites

Bdellium

Myrrha

Mastiche

Ficus

Aster Atticus

Oleum omphacinum

Vinum halosanthinum

Pruna

Plantago

GYPSI curatio.

Pumex

Rosa

Lixiua ex ficu

Rubus

Staphis agria

Dios.lib.6.cap.24.

Sal

Tribulus

HAEMOR=

Vua cenanthe

Rhoidarũ remedia.

Vinum rhetinite.

Amaracinum

GLABROS aut des

Allium

Anonis

piles facientia.

Aloe Cape

Scolopendra

Irinum

Libanotis

Characias.

Lapis Arabicus

GLADIORVM

Ouum

Palma

aciem perstrin=

Plumbum elotum

gentia.

Rhus

Rubus.

Malum sylvestre.

HAEMORRHOI=

GLANDIS mem=

darum curatio.

bri remedia.

Diosc.lib.6.cap.69.

Mel.

HALITVS oris

GRAVEDINIS

remedia.

remedia.

Agallochum

Styrax.

Anisum

Bromos

GVRGVLIONI

Citrum Malobathrum

utilia.

Myrrha Mastiche

Silurus.

Vinum selenite.

INDEX

HASTVLAS in= Diofc. lib. 6 cap. 32.
fixas corpori ex= HOMINEM
trahentia. necantia.

Oxyacantha. Iuniperi ramenta
HEPATICORVM Smilax seu taxus.

remedia. HOMINIS mor-
Vide, Iecinoris morbo= sus remedia.

rum remedia. Iuglans.
HERBAE quae pe= HORRORES excu-
rimunt. tientia.

Diofc. lib. 6 in praefat. Vide, Rigorem excu-
HERNIAE medicinae tientia.

Cinnamomum HVLGERANTES
Cupressus Cylinus medicinae.

Pentaphyllum Buprestis Salamandra
Psyllium Xyphion. Batrachion Ruta

HERPETIS con- Lonchitis Hedyfaron
traria. Clematis

Strychnon sativum Portulaca agrestis
Acetum. Ampeloleuce.

HIRVNDINVM HVLGERVM
uisus restaurantia. remedia.

Chelidonium maius. Amygdala amara

HIRVDINES Ancemone Amylum
pellentia. Anagallis Aristolochia

Acetum. Aloe Anthemis
HIRVDINIS Anchusa
curatio. Astragalus Aconiton

Arction

C V R A T I V V S.

Arction	Acetum	Lentiscus	Lycium
Arsenicum	Alumen	Lana combusta	
Brassica sativa	Beta	Lolium	Lens
Bulbus esculentus		Lupinus Libanotis	
Ballote		Laferpitium	
Caries lignorum		Lilium	Myrtus
Cistos	Chelidonium	Mel	Mandragoras
Centaurium		Nasturtium	
Chamaleon niger		Narcissus	
Coriandrum		Olea sylvestris	
Chamedrys		Oleum amygdalinum	
Chamepitys		Orobus	Orchis
Chamelca		Oenagra	Omphacium
Cadmia	Cinis vitis	Plantago	Pix
Corallium		Palma	
Dracunculus		Purpura combusta	
Eleliphacon		Pepo	Panaces
Eupatorium		Peucedanum	Prasion
Ebulus	Aes ustum	Pentaphyllon	
Ficus	Fimum	Peristercon supinus	
Aerugo aurificum		Papauer ceratitis, id est,	
Fel	Glans	corniculare.	
Grossi	Hedera	Psyllium	
Goed, id est, coriandrum		Plumbum elotum	
Gentiana		Pumex	
Iris Illyrica	Isatis	Rhamnus	Ruta
Indicus lapis		Stratiotes terrestris	
Lixivia cum cinere ficus		Scordion	

T t

INDEX

Sandaracha	Sal	Cestron	Cotyledon
Spongia	Thus	Cucumis anguinus	
Viscum	Thelypteris	Cici	
Teste fornacum		Helleborum nigrum	
Vrtica.		Ebulus	Ficus
H V M O R V M malo-		Erinaceus terrestris	
rum medicina.		Hippophaes	
Metopium unguentum		Hippophaeston	
Nardinum		Hyssopus	Laserpitiu
Amygdala dulces		Lathyris	Origanum
Mel		Plantago	Pancratium
HYDROPIC O=		Polium	Rhaphanus
rum remedia.		Ruta	Silla
Afarum	Amurca	Sampsuchus	
Halicacabus	Allium	Staphylinus	
Absynthium	Anisum	Smyrnion	
Androsaces	Alisma	Strychnon hypnoticon,	
Ampelos agria		sive solanum somnifi-	
Aqua maris		cum	Sal
Acetum	Aphronitrum	Trifolium	Tithymalus
Halcyonium		Vitex	Vrina
Buprestis	Cyperus	Vinum scillite	
Cinnamomum		Vinum rheimite	
Calamus odoratus		Vinum cedrite	
Cochlea terrestres		Vinum asarite	
Cicer		Vinum panacite.	
Chameleon albus		HYOSCYAMI	
Chamedrys		curatio.	

C V R A T I V V S.

Diosc. lib. 6. cap. 15.

IECINORIS res
media. Acorus

Nardi spica

Nardum Gallicum

Amomum

Iuncus odoratus

Agallochum

Picea

Pinus

Daphnoides

Palma elate

Amygdala amara

Lac humanum

Scandyx Struthium

Anagallis Agaricum

Rhaponticum

Gentiana

Glycyrrhiza

Eryngium

Absynthium

Serpyllum Sphondylium

Ammoniacum

Anthemis

Chamepitys

Vettonica Eupatorium

Hyoscyamus

Pentaphyllum

Chrysocome

Papauer ceratitis, siue
cornutum

Epipactis Isopyrone

Vinum cydonite

Vinum pissite

Vinum absynthite

Vinum nardite

Vinum asarite

Vinum ex sylvestri asaro

Vinum chamelates

Rubrica sinopis.

I G N I S sacri res
media.

Asarum Acacia

Acinos herba

Anchusa Lycopsis

Aizoon maius

Brassica sativa

Acetum Beta

Baccharis Bechion

Crocus Cupressus

Coriandrum Cicuta

Cotyledon Cici

Chalcitis lapis

Aerugo ferri

Harundo Helxine

Isatis Lens

T t q

INDEX

Lilium	Lens palustris	Myrrha	Nasturtiū
Lapis smyris		Sinapi	Propolis.
Myrtus	Malua	INCVS SIS	utilia.
Mandragoras		Phlomides.	
Portulaca	Plantago	INFANTES	mors
Parthenion			tuos utero eijcientia.
Polygonon mas		Dictamnus.	
Pentaphyllon		INFANTIBVS	
Peristereon rectus			utilia.
Papauer satium		Athara	Aster Atticus
Psyllium Rhamnus		Strychnum satium	
Rosa	Ruta	Smilax aspera.	
Rubus	Idea	INFANTIVM	pue
Salix	sanguis		pille ut glauca,
Seris			non nigrae red-
Strychnon, siue solanum			dantur.
satium		Auellana.	
Stratiotes aquaticus		INFLATIONES	
Vrina			facientia.
ILEI morbi remedia.		Allium	
Oleum vulgare		Capparis	Glans
Strychnos halicacabus.		Laserpitium	Porrum
IMPETIGINIS		Bulbus esculentus.	
morbi remedia.		INFLATIONVM	
Amygdale amara			remedia.
Lapathon		Aspalathus	
Lichen in petris		Amygdale amara	
Lolium	Thus	Abfynthium	

C V R A T I V V S.

Anisum	Anethum	Argemone
Anthemis	Althea	Anagallis
Costus	Cicer	Artemisia
Cuminum	Eryngion	Aizoon maius
Epithymum		Acetum Butyrum
Helenium	Hyssopum	Brassica sylvestris
Hieracium maius		Bechion
Iuncus odoratus		Brion thalassion
Iuniperus	Lac	Cassia
Ligusticum	Hordeum	Cotyledon prima
Ocymum		Elatine Ebulus
Peucedanum		Faba Ficus
Rapa sylvestris		Harundo
Rhaponticum		Hyoscyamus
Triticum		Irinum Laurus
Thymoxalme		Linum
Vrtica	Vinacei	Lupinum sativum
Vinum		Lonchitis
Vinum pissite		Lichen in petris
Vinum absynthite		Lens palustris Lapis
Vinum scilliticum		Melilotus Mandragoras
Vinum chamædryite		Naphtha Ocymum
Vinum tragoriganite		Ochra Picea
Vinum sylvestris nardi.		Platanus Portulaca
INFLAMMATIO		Pulegium Parthenion
num remedia.		Polygonon mas
Coriandrum		Papauer erraticum
Adeps	Asphodelus	Rosa Rhus

T t ij

INDEX

Susinum	Sabina	Agallochum	Anthemis
Sesamum		Coclea terrestres	
Sonchos	Scordion	Hippuris	
Symphytum		Irinum	I.ac
Stratioles aquaticus		Linum Mastichinum	
Triticum	Tribulus	Malua hordeum	
Vinacei	Xyris.	Palma	Portulaca
INGVINVM mor-		Rosaceum	Rosa
bi remedia.		Ruta	Salix
Vide Genitalium.		Spartum	
INGENIVM prom-		Vinum Surrentium	
ptum facientia,		Triticum	
Ouum.		Et in uerbo, Dysenterico	
INSANIA in-		rum remedia.	
ducentia.		INTERTRIGO	
Hyoscyamus		ut tollatur.	
Strychnon hypnoticon		Vitex	Corium.
Mandragoras.		ISCHIADICO-	
INSANIEN-		rum remedia.	
tium remedia.		Asarum	Balsamum
Betonica		Cardamomum	
Helleborum nigrum.		Silurus	Fimum
INSOMNIA in-		Nasturtium	Thlaspi
ducentia.		Rhaponticum	
Vide, Somnifera medi-		Thymus	
cine.		Ammoniacum	
INTESTINO-		Ieontopetalon	
rum remedia.		Erythrodanum	

CURATIVVS.

Ascyron	Alysson
Androsamum	Thelypteris.
Chamaepitys	L ABIORVM scis
Polemonia	sura remedia.
Ocymoides	Adeps Lycium.
Aethiopsis	LAC coagulania.
Arction	Balsamum Ficus.
Chamaecissos	LAC extinguentia.
Spartum	Cicuta.
Colocynthis	LACRYMAS
Oxymeli	trahentia.
Vinum panacite	Aerugo aurificum.
Salsugo Adarces.	LACERTAE mor-
IUMENTIS con-	sus remedia.
traria.	Portulaca
Gramen cilicum	Seps, siue lacerta calchi
Nerion.	dica in uino epota.
IUMENTORVM	LACRYMAE que
scabiem emen-	perimunt.
dantia.	Dioscorides lib. 6. in pra
Amurca Alysson	fat.
Lupinum satium	LACRYMAE
Oleum piscinum	tiones emen-
Oleum lentiscinum.	dantia.
IUMENTORVM	Vide, dilacrymationes
ulcera emen-	emendantia.
dantia.	LACTIS uberta-
Oleum picinum.	tem facientia.
	T t iij

INDEX

Argemone	Anethum	Bdellium	
Ampeloleuce		Cyprinum	Fimum
Cicer	Circea	Centaurium maius	
Echion Fœniculus		Gentiana	Galbanum
Halimos	Hordeum	Hordeum	
Lactuca	Malua	Leucacantha	Myrrha
Melanthion		Napththa	Phu
Ocymum		Panaces heraclion	
Sonchos	Vitex.	Petroselinon	
LACTIS coagula		Prasium, siue marrubiu	
ti curatio.		Pseudobunion	
Diosc. lib. 6. cap. 26.		Ruta	Sagapenum
LASSITVDINVM		Terebinthina	
remedia.		Thapsia	Vrtica
Anethinum		Vinum cedrite	
Adeps	Clymenon	Vinum hyssopite	
Laurinum		Vinum stichadite	
Ammoniacum	Sal	Vinum tragoriganite	
Lapis gagates		Vinum aromatite	
Vinum chamaeleutes.		Vinum acorite	
LATERVM morbi		Vinum glycyrrhite.	
remedia.		LENDES necantia.	
Acorus	Agallochum	Cedria	Mel
Asphodelus		Myrica	Beta
Aristolochia tertia		Allium	
Ampeloleuce		Alumen	
Balsamum		LENTIGINIS ma	
Brassica satina		cula remedia.	

C V R A T I V V S.

Alysson	Halcyonium	Ficus	Fel
Aqua maris		Hordeum	Iuniperus
Ampeloleuce		Lolium	Lapathum
Brassica satina		Lepidium	Myosotis
Bulbus esculentus		Oleum oleastri	
Balanus myrepfica		Oleum cicinum	
Cinnamomum		Olea Aethiopica	
Eruum	Galbanum	Oryza	Salamandra
Melanthion	Rhaphanus	Serum	Sinapi
Sanguis leporinus		Struthion	
Sisymbrium sylvestre		Scammonia	
Spuma argenti		Sulphur	Sal
Triticum cum aceto,		Terebinthina	
LEPRAE remedia.		Thapsia	
Allium	Anemone	Terra melia	
Aristolochia		Vlmus	Vrinus
Acantha	Anchusa	Vitis satina.	
Acetum		LEPORIS marini	
Ampelos leuce		remedia.	
Halcyonium		Fiber	Cornus
Alumen	Adarce	Lapis ophites	
Buprestis		Halcyonium	
Brassica satina		Chamaeleon niger	
Cochlea terrestres		Cicer	
Clematis	Fraxinus	Cucumis anguinus	
Cucumis anguinus		Characias	
Helleborum nigrum		Helleborum nigrum	
Acrugo aurificum		Ficus	Glutinum

INDEX

Lasertium	Olea	Rhaponticum
Pruna		Aristolochia tertia
Rhaponticum		Crocodilion
Ruta		Absynthium
Vitis sativa		Hyssopum
Vinum tethalassomea num.		Tragoriganum
LIENIS morbi remedia.		Pulegium
		Dictamnus
		Sison Anison
Iris Illyrica		Smyrnion
Nardum Gallicum		Peucedanum
Myrice	Acorus	Sagapenum
Ca chamum		Ammoniacum
Oleum amygdalinum		Viscum Polium
Iycium	Vitex	Chamaedrys Leuconion
Cotonea	Linum	Nymphaea Asplenon
Ficus Aegyptia		Hemionitis
Lac humanum		Erythrodanum
Lupinum sativum		Vettonica
Rha hanas		Lonchitis altera
Lapathum	Sinapi	Polemonia
Brassica sativa		Clymenon Xyris
Nasturtium		Anchusa Vrtica
Piper	Struthion	Adiantum Pteris
Helera Cyclaminos		Ampelos leuce & agria
Pancration		Aqua maris
Capparis	Lejidium	Vitis sativa
Agarcum		Acetum scilliticum

CURATIVVS.

Vinum panacite

Trifolium.

Ferrum Corallium

LUMBRICOS

Lapis Aſius Coris

necantia.

Hermol. Cor. cap. 124.

Coriandri ſemen

LINGVAE utilia.

Absynthium ſeriphium

Olea Aethiopica.

Brasſica ſatiua

LIPPITVDINIS

Chamaeleon albus

remedia.

Calamintha

Ebanus

Myrrha Portulaca

Lapis hematites

Oleum cicinum

Plantago Spongie.

Thelypteris

LIQVORES qui

Lupinum ſatiuum.

perimunt.

LUMBORVM affe

Dioſc. lib. 6. in praſat.

Eluum remedia.

LIVOREM emen-

Asparagus Capparis

dantia.

Chamaepeuce

Allium Aqua maris

Echion Harundo

Iuglans

Leucacantha

Lana ſuccida

Papauer cornutum

Rhaponticum

Sampſuchinum

Sinapi

Smyrniac.

Lupinum ſatiuum

LVPOS necantia.

Thaſia.

Aconitum pardalian-

LOCORVM mulie-

ches.

brium remedia.

Aconitum alterum

Anethum Althea

Apocynum.

Foenogrecum

LVSCIOSORVM

Linum Leucoion

remedia.

INDEX

Fel animalium
Sanguis.

LVXATIS utilia.

Asparagus Acantha

Aphronitrum

Bulbus esculentus

Fimum

Harundo

Heliotropion

Iuglans

Narcissus

Polypodion

Vitex

Vrtica

Vitis sativa

Vinum pissite

Sampsuchus

Sal.

MACIEI corpo-
ris remedia.

Erinaceus.

MACVLAS tol-
lentia.

Oleum balaninum.

MACVLAS rube-
scere facientia.

Crocodilea, id est, Croco-
dili terrestres finum.

MALIS medicamen-
tis contraria:

Adeps Ruta

Pentaphyllon

Antirrhinon.

MALORVM qua
serpunt remedia.

Acacia Plantago

Polygonon mas

Helxine Cicuta

Strychnum sativum

Aixoon maius

Colymbades oliuae

Sabina.

MAMMARVM
morbi remedia.

Asarum Cotonea

Iuglans Thus

Erysimon Ochra

Lens Eruum

Asphodelus

Mentha

Scammonia

Sandaracha

Triticum

Baccaris

Apium Asclepias

Hemerocallis

C V R A T I V V S.

Althea		Passum & protropon vi	
Chamæpitys		num	
Epimedium	Cici	Acetum	Oxymel.
Hyoscyamus		MELICERID VM	
Vinacei		morbi remedia.	
Aqua maris		Serum	
Fex uini		Parthenion	
Terra samia.		Helleborum nigrum	
M A M M A E uirginū		Epithymum	
ne crescant.		Acetum scilliticum	
Cicuta	Cotis.	Amomum	
M A S C V L V M fē		Melilotus.	
lium generantia.		M E N S T R V A	
Cratæogonos		pruocantia.	
Phyllon	Orchis.	Iris Illyrica	
M A T R I C I S morbi		Meu	Cyperus
remedia.		Asarum	Cassa
Malua		Ginnamomum	
Oleum balaninum		Costum	
Pæonia.		Iuncus odoratus	
M A X I L L A R V M		Balsamum	
doloribus remedia.		Canchamon	
Ceruinum cornu.		Helenium	Myrrha
M E A T V S aperien-		Sampsuchinum	
tia.		Amaracinum	
Allium	Cyperus.	Abrotonum	
M E C O N I O		Styrax	Naphtha
contraria.		Cedrides	Myrice

INDEX

Tilia	Hypocistos	Agaricum
Lycium	Acacia	Aristolochia tertia
Vitex		Centaurium maius &
Olea sylvestris		minus
Lotus		Eryngion
Amygdala amara		Absynthium
Ficus		Origanum
Cochlea terrestres		Tragoriganum
Fiber	Bubrestis	Pulegium
Oxyopus	Fimum	Eleliphacos
Cicer	Rhaphanus	Calamintha
Lapathum		Thymus
Brassica sativa		Serpyllum
Chondrylla		Sampsuchus
Lactuca sylvestris		Baccharis
Caucalis	Eruca	Ruta
Ocimum Cape		Panaces heracleon
Orobanche	Allium	Ligusticum
Porrum		Seseli Massiliense
Ampeloprasum		Tordylon
Nasturtium		Sison
Thlaspi		Foeniculus
Struthion		Oreoselinum
Cyclamino		Petroselinum
Asphodelus		Hippomarathrum
Capparis		Hyposelinum
Anemone		Smyrnion
Hedera		Daucus
		Libanotis
		Melanthion

CURATIVVS.

Lasertitium		Ampelos melana	
Sagapenon		Heliotropion maius	
Euphorbion		Vinum scilliticum	
Clynopodium		Vinum absynthite	
Chamedrys	Lilium	Vinum hyssopite	
Melissophyllum		Vinum aromatite	
Prasium	Stachys	Vinum daucite	
Trifolium		Vinum panacite	
Polium	Scordion	Vinum helleborite	
Arthemisia		Vinum dictamnite	
Leucoion		Staphylinus.	
Anthemis	Peonia	MENSTRVAsis	
Erythrodanum		stentia.	
Anagyris		Lentisci succus	
Alisma	Coris	Myrica	
Hypericon		Oxyacanthos	
Cestron	Medion	Thus	Palma
Xyphion	Tragion	Malum punicum	
Heliochrysos		Myrtus	
Mandragoras		Lepus terrestris	
Vrtica	Myrtus	Fuligo butyri	
Adiantum		Coagulum	
Myrtus sylvestris		Sanguis	Acinos
Laurus Alexandrina		Acantha Arabica	
Daphnoides		Hieracium maius	
Chamedaphne		Nymphaea	
Helleborus niger & al-	Peonia	Limonia	
bis	Medion		

INDEX

Sideritis achilleos

Rubus

Idea radix

Tragos Lysimachia

Oxyschaenos

Heliochrysos

Papauer satium

Mandragora

Aizon maius

Aerugo ferri

Vinum rhetinite

Fex uini

Lapis Asius

Morochthus

Hematites

Ostracites

Terra samia.

MENTEM commo-
uentia.

Coriandrum

Oreoselinum

METALLA que
perimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

MOLLIENTES
medicina.

Vide, Demollientes.

MORBI regij me-

dicina.

Vide, Regij morbi.

MORBORVM que
serpunt remedia.

Vide, Malorum que ser-
punt.

MVLIERVM desir-
derio quo satisfiat.

Acorum

Picea Pinus

Adeps bubulus.

MVLIERVM infir-
mitatum remedia.

Amonum

Balsamum

Susinum

Seseli Massiliense.

MVRES necantia.

Chameleon albus

Aconitum pardalianches

Helleborus candidus

Hermol. Cor cap. 28.

MVRIS aranei me-
sus remedia.

Mus araneus

Absynthium

Chrysogonon

Diosc lib. 6. cap. 62.

MVRIS

CURATIVVS.

MVRIS MOR =	Metopium	Bdellium
<i>sus remedia.</i>	Lixiua ex ficu	
Grossi	Allium.	Erinaceus terrestris
MVSCAS necantia.	Cochlea terrestres	
Lyfimachia.	Vipera	
MYRMECIAS	Vermes terreni	
<i>tollentia.</i>	Lac humanum	
Ficus.	Triticum	Poterium
NARIVM mor =	Peucedanum	
<i>bi remedia.</i>	Laserpitium	
Malum punicum.	Lilium	Satyrium
NAVSEAM DI =	Melissophyllon	
<i>scutientia.</i>	Althea	Coccus
Tragoriganum	Erigeron	Cacalia
Pulegium	Narcissus	
Fœniculus.	Hippophæston	
NAVSEAM MO =	Vini qualitas	
<i>mentia.</i>	Aqua maris	
Laurinum	Acetum scilliticum	
Susinum.	Vinum stichadite	
NERVORVM mor	Vinum thymite	
<i>bi remedia.</i>	Fœx vini	Fiber.
Oleum scyonium	NERVOS lædentia.	
Oleum eleomeli	Malus	Hedera
Laurinum	Vinum	
Cyprinum	Vinum gypsatum	
Gleucinum	Mesagite.	
Amaracinum	NERVOS tollentia.	
	V	

INDEX

Mel sardoum.		Aerugo aurificum
NIGREDINES		Chalcites lapis
abstergit.		Flos salis
Sabina.		Lapis ostracites.
NODIS utilia.		NVBECVLAS
Bdellium.		oculorum emen-
NOMARVM mor		dantia.
bos curantia.		Vide, Oculorum reme-
Asparagus		dia.
Sabina	Papyrus	NYCTILOPARVM
Cistos		morbi remedia.
Olea sylvestris	Olea	Vide, Luscioforum re-
Oliuæ colymbades		media.
Malum punicum		O B M V T E S C E
Smarides		re facientia.
Fel animalium		Mandragora.
Vrina	Lilium	OCVLO RV M epi
Plantago	Arisaron	phoræ remedia.
Asphodelus		Asarum
Maron	Prasium	Malabathrum
Orchis serapias		Cotonea Sesamum
Britannica		Lens Cucurbita
Peristereon supinus		Anemone
Galiopsis		Argemone
Vua ænanthe		Myosotis
Omphacinum		Gentiana
Acetum	Oxalme	Baccharis Ruta
Squama aris		Apium Hemerocallis

EVRA TIVVS.

Rubus idæa	Populus alba	
Papauer sativum	Myrice	Acalis
Philomides	Ebenus	Rosa
Aster atticus	Lycium	Acacia
Viola purpurea	Salix	
Cici.	Olea sylvestris	
O C V L I S contraria.	Olea	
Lactuca	Olea Aethiopica	
Porrum	Palma Thebaica	
Ocymum	Cytinus	Myrtus
Coriandrum	Cerasia	
Anethum	Halicacabus	Mituli
O C V L O R V M mor	Cochleæ terrestres	
borum remedia.	Scorpius marinus	
Acorum	Vipera	
Cassia	Senecla serpentis	
Cinnamomum	Sepia	
Amomum	Mullus piscis	
Balsamum	Ouum	Hirundines
Canthamum	Cervinum cornu	
Crocum	Lac humanum	
Crocomagma	Costus	
Oleum vulgare	Fuligo butyri	
Eleomeli	Lana usta	Oesopus
Oleum amygdalinum	Fel animalium	
Myrrha	Sanguis	
Thus	Vrina	Mel
Fuligo thuris & resinae	Amylum	
& picis		
Picea		
Cupressus		
Sabina		
Platanus		

V n ij

I N D E X

Faba	Lens	Ammoniacum	
Brassica sativa		Sarcocolla	
Portulaca		Chamaedrys	
Seris	Pepo	Prasium	Stoebe
Lactuca sylvestris		Tribulus	Erinos
Ocimum	Cape	Gramen Parnasium	
Sinapi	Piper	Rubus	Elatine
Zingiber		Papaver sativum, &	
Cyclaminos		cornutum	
Asphodelus		Hyoscyamus	
Dracunculus maior		Mandragoras	
Dracunculus minor		Aconitum	Pardas
Argemone		lianches	
Anagallis		Aizoon maius	
Chelidonium maius		Helleborus albus	
Othonna		Cici	Chamaesyce
Centaurium minus		Capnos	
Tragacantha	Aloe	Lotus sativa	
Absynthium		Sesamoides maius	
Abrotonum		Aes ustum	
Ruta	Sampsuchus	Vua cenanthe	
Melilotus		Vinum Surrentinum	
Ruta Galatica, siue syl-		Acetum scilliticum	
vestris		Cadmia	
Panaces heracleon		Squama aris	
Foeniculus		Acrugo aurificum	
Libanotis		Plumbum elotum	
Sagapemon		Stimmi	Cinnabaris

CURATIVVS.

Chalcitis lapis		ORIS VLCE	
Alumen	Pumex	rum remedia.	
Sal	Flos salis	Cyperus	Aspalathus
Fex uini	Spongia	Puligo picis	Cyprus
Corallium		Tilia	Acacia
Pyrites		Olea syluestris	
Hematites		Castanea	
Calactites	Thyites	Malum punicum	
Morochthus		Mena	
Sapphirus		Lac schiston	Butyrum
Geodes		Plantago	Aloe
Samius.		Origanum	
OPISTHOTONI		Lencoion	
corum, id est, cernicis		Orchis serapias	
rigore laborantium re		Anthemis	
media.		Periclymenon	
Acanthion		Rubus	
Eryngion		Staphis agria	
Laserpitium		Vua ænanthe	
Sagapenon		Omphacium	
Satyrion	Coris.	Acetum scilliticum	
• OPII remedia.		Sandaracha	
Sal		Alumen	Sal.
Diosc. lib. 6. cap. 17.		ORTHOPNOI	
ORIS HALITVS		cis, id est, difficulter	
remedia.		spirantibus remedia.	
Vide, Halitus oris re		Helenium	
media.		Myrrha	

Vu ij

INDEX

Cupressus	extrahentia.
Daphnides	Aristolochia
Cotonea	Vrina Ampelos leuce.
Struthion	O S S A fracta conso-
Cyclaminos	lidantia.
Dracunculus maior	Vetonica Xyris.
Abrotonum	O V E S necantia.
Hyssopus	Nerion.
Calamintha	O X Y P A R A I N
Thymus	gredientia.
Baccharis	Ligusticum
Seleli Massiliense	Caros Anethum.
Hieracium maius	P A L P E B R A
Smyrnion	rum remedia.
Sphondylium	Vnguentum rosaceum
Peucedanum	Mastiche Resina
Melanthion	Fuligo picis
Ammoniacum	Grossi
Melissophyllon	Lixivia ex ficu
Bechion	Vrina Alumen
Botrys	Chondrylla
Anemone	Vide supra, Genarum
Hippuris	morbi remedia.
Vrtica	P A L P E B R A R V M
Elaterium	pili euulsi ne rena-
Hippophæston	scantur.
Vinum panacite.	Tellina
O S S I V M squamæ	Sanguis Capnos.

CURATIVVS.

PALLIDVM CO PARALYTICO

lorem facientia. rum remedia.

Hieracium minus

Capparis

Aloe.

Erythrodanum

PANORVM remedia.

Colocynthis

Atriplex Acetum

Ampelos melana

Bulbus esculentus

Vinum scilliticum

Coriandrum cum faba

Aphronitrum.

fracta

PARTVS necantia.

Coniza

Ficus

Daphnides

Galiopsis

Coagulum

Olea sylvestris

Adeps hircinus & ouila

Helxine

lus & bubulus

Ocymastrum

Nasturtium

Ammoniacum

Thlassi

Ruta

Isatis

Plantago

Hedysaron

Xyphion.

Helleborus albus & nig

PANTHERAS

ger

necantia.

Colocynthis

Aconitum pardalian-

Ampelos leuce

ches.

Vinum phthorium.

PAPAVERIS

PARTVS QVI-

curatio.

bus iuuatur.

Dioscor.lib.6. cap. 17.

Iris Illyrica

& 18.

Cinnamomum

PAPVLARVM

Balsamum

remedia.

Vnguentum telinum

Vrina

Flos æris.

Irinum

Vu iij

I N D E X

Amaracinum	Clinopodium
Myrrha	Ammoniacum
Picea	Fiber Chamædrys
Olea Aethiopica	Prasium
Oesypum	Bechion
Fimum	Artemisia
Cicer	Coniza
Lupinum sativum	Leucoion
Allium	Onosma
Cyclaminos	Anthemis
Dracunculus maior	Anchusa
Dracunculus minor	Mandragoras
Hedera	Laurus Alexandrina
Gentiana	Ampelos leuce
Centaurium maius	Heliotropium maius
Centaurium minus	Vinum panacite
Pulegium	Vinum helleborite
Elelisphacos	Alumen
Calamintha	Sulphur
Baccharis	Lapis Iaspis
Panaces heracleon	Aetites
Staphylinus	Samius.
Thynni falsi caro	PARONYCHIA
Seseli Massiliense	rum, id est, unguum
Smyrnion	morborum remedia.
Peucedanum	Thus cum melle
Sagapenum	Olea sylvestris
Galbanum	Myrtus

CURATIVVS.

Ebur		Vide, Iumentorum scabiem
Paronychia		
Vua. cenanthe		PECORI utilia.
Aerugo ferri		Adiantum.
PAROTIDVM id est, aurium apostematum remedia.		PECVS necantia.
Ficus		Merion
Fimum		Aconitum lycoctonon.
Linum	Faba	PECVS mortuum extrahentia.
Lapathum		Aristolochia.
Plantago		PECTORIS morbi remedia.
Erysimon		Acorus Men
Viscum	Althæa	Costum Myrrha
Psyllium		Iuncus odoratus
Strychnon satium		Pityides
Vrtica		Terebinthina
Galiopsis		Iuniperus
Terra cimolia.		Ficus
Et in uerbo, Aurium medicine.		Pomum
PAVESCEN- tium remedia		Nasturtium
Iinum		Piper
Melicratum		Chelidonium minus
Hydromel.		Rhaponticum
PECORIS scabiem emendantia.		Stichas
		Thymus
		Ruta
		Libanotis

INDEX

Sagapenum	Ficus Aegyptia
Ammoniacum	Vinum stichadite.
Scordion	PERCVSSIS à fe-
Bechion	ris utilia.
Vrtica	Balsamum
Isopyrum	Paliurus
Vinum cedrite	Mustela
Vinum aromatite	Ouum
Vinum nectarite	Argemone
Vinum daucite.	Hippomarathrum
PEDICVLOS	Coagulum
necantia.	Sanguis
Allium	Piper
Allumen	Elaphoboscon
Mel	Phylitis.
Cedria.	PERNIONVM
PEDVM qui à frigo-	remedia.
re alserunt remedia.	Vnguentum melinum et
Cyclaminos.	telnum
PEDVM rimarum	Thus cum suillo adipe
remedia.	Acacia
Scilla	Ficus
PERFRICTIO-	Cancrì
nis medicina.	Pulmo marinus
Iris Illirya	Vngues asini
Cyperus	Adeps
Balsamum	Eruum
Oleum.	Rapa satina
	Lens

CURATIVVS.

Beta	Malua
Cyclaminos	Asparagus
Dracunculus maior	Lactuca sylvestris
Dracunculus minor	Hedera
Asphodelus	Abrotonum
Scilla	Daucus
Batrachion	Sphondylium
Arction	Aparine
Cotyledon prima	Phalangium
Aqua maris	Myrrhis
Alumen.	Aqua maris
PERIPNEUMO =	Dioscoridis libro 8. ca =
niacorum remedia.	pit. 58.
Abrotonum	PHAGEDAENAE
Tragoriganum.	morbi remedia.
PESTILENTIAE	Fel Fimum
contraria.	Dracunculus minor
Myrrhis, id est celi fo =	Isatis
lium	Chamaeleon niger
Vinum omphacite.	Panaces
PHALANGIO =	Staphylinus
rum ictus remedia.	Petasites
Cinnamomum	Characias
Terebinthus	Ampelos leuce
Myrica	Vinum
Myrtus	Acetum
Lixivia ex ficu	Alumen
Cancris	Sal Flos salis.

INDEX

PHARICO ueneno	Porrum
contraria.	Agaricum
Vinum Albanum	Rhaponticum
Diosc. lib. 6. cap. 19.	Acantha
PHLEGMATIS	Prasum
contraria.	Cestrum
Plantago.	Lapis Afsus.
PHRENETICO-	PILI genarum ne
rum remedia.	defluant.
Crocinum	Spica nardi
Vitex	Cochleæ terrestres
Asparagus	Oesypus
Serpyllum	Chondrylla
Coniza tertia	Armenius lapis.
Leucoion.	PILI palpebrarum
PHTHIRIASIS,	euulsi ne rena-
sive pedicularis mor-	scantur.
bi remedia	Tellinæ
Strigmenta gymnasto-	Sanguis
rum	Canops.
Myrica	PILI alarum euulsi
Hedera	ne renascentur.
Staphis agria	Fabæ.
Sandaracha.	PITUITAE crassæ
PHTHISCORVM	remedia.
remedia.	Iris Illyrica
Pix	Sesamum
Adeps	Hyssopus

CURATIVVS.

Thymoxalme.

Origanus

PITVITAE res

Tragoriganum

media. *capitulum* Pulegium

Cinnamomum

Thymus

Styrax

Naphtha

Ruta

Vlmus

Pyrethrum

Auellana

Sphondylium

Ouum

Melanthium

Serum

Parthenion

Vrina

Clematis

Hordeum

Sideritis achilleos

Linum

Hyoscyamus

Faba

Helleborum nigrum

Lupinum satium

Sesamoides maius

Agriorhaphanus

Cucumis

Portulaca

Elaterium

Cucurbita

Staphis agria

Capa

Thapsia

Sinapi

Hippophaes

Piper

Hippophæston

Cyclaminos

Cici

Characias

Dracunculus maior

Lathyris

Capparis

Scammonia

Anemone

Thymelea

Anagallis

Ebulus

Centaurium minus

Apios

Tragacantha

Colocynthis

Hyssopus

Epithymon

INDEX

Empetron	Naphtha
Ampelos leuce	Populus nigra
Polypodion	Amurca
Heliotropium maius	Salix
Vua passa	Ficus
Aqua maris	Cochleæ terrestres
Vinum rhetinite	Mustela
Vinum aromatite	Marinus pulmo
Vinum mandragorite	Lac humanum
Vinum scammonite	Adipum medicina
Sulphus	Sanguis scilicet mens-
Peplus.	struus
PITYOCAMPA =	Finum
rum curatio.	Hordeum
Diosc. lib. 6. cap. 2.	Lens
PLAGARVM uibi-	Rapa sativa
ces emendantia.	Erasica sativa
Susnon.	Seris
PLANTAE quæ	Cucurbita
perimunt.	Aros
Diosc. lib. 6. in præfat.	Asphodelus
PLEVRETICO =	Bulbus esculentus
rum remedia.	Pulegium
Staphylinus	Panaces Heracleon
Laserpitium	Libanotis
Aethiops.	Scordion
PODAGRAE mor-	Leucoion
bi remedia.	Androsaces
Amomum	

EV RATI VVS.

Helxine

Papauer satium

Hyoscyamus

Lens palustris

Aixoon maius

Bryon thalassion

Phycos marinus

Cucumis anguinus

Balanus myrepica

Ebulus

Heliotropium maius

Vua passa

Acetum

Ferrum

Sulphur

Sal

Lapis Asius

Lapis gagates

Testæ siue terræ formæ
cum.

POLYPI morbi
remedia.

Dracunculus maior

Dracunculus minor.

PRESTERIS ser-
pentis morsus re-
media.

Omotarichos

Rubus.

PRAEPVTIO

rum morbi remedia.

Aloe.

PRAECORDIO
rum remedia.

Scordion

Vinum thymite

Vinum daucite.

PRAECIPITA
tis ex alto utilia.

Iris Illirica

Vitex

Asparagus

Anisum

Cannabis sativa.

PROFLVVI gen-
tura remedia.

Vide, Geniturae profluvij
in somno.

PRVRIGINEM
facientia.

Scolopendra

Ephemeron

Opium.

PRVRIGINEM
emendantia.

Vrina

Ernum

Lapathum

Aloe

INDEX

Origanum	Batrachion
Pulegium	Chelidonium minus
Eleliphacos	Origanum
Melilotus	Pentaphyllon
Balanus myrepfica	Staphis agria
Acetum	Balanus myrepfica
Alumen	Ampelos leuce
Sulphur	Vitis sativa
Sal.	Aqua maris Sal.
PSILOTHRVM,	PSYLLI curatio.
siue unguentum de-	Diosc. lib. 6. cap. 10.
pilatorium.	PTERYGII morbi
Lepus marinus	remedia.
Hedera	Acacia
Ampelos leuce	Rhus
Dryopteris	Malum punicum
Arsenicum.	Myrtus
PSORAE morbi	Ficus
remedia.	Glycyrrhiza
Cardamomum	Aloe
Oleum amygdalinum	Prasum
Lycium	Pentaphyllon
Olea	Characias
Palma elate	Ampelos leuce
Ficus	Vua cerianthe
Erinaceus marinus	Acetum
Cicer	Alumen
Lupinum sativum	Sal.

Ferro

CURATIVVS.

Ferri rubigo.

PVBERTAS ne

erumpat.

Hyacinthus.

PVLMONIS more

bi remedia.

Iuncus odoratus

Balsamum

Cedria

Amygdalus amara

Ficus

Lac

Pulegium

Ruta

Sagapenum

Symphyton

Pentaphyllon

Chrysocome

Vrtica

Thapsia

Melicratum

Vinum hyssopite

Vinum aromatite.

PVLICES necantia.

Vnguentum telinum

Crocinum

Butyrum

PVTREDINVM

genitalium remedia.

Aspalathus.

PVTREDINES

purgantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QVADRVP.

dum scabiem

emendat.

Vide lumentorum sca-

biem.

QVARTANAE

febris remedia.

Vide, Febris quartanae

remedia.

RADICES que

perimunt.

Dios. lib. 6. in prefat.

RAVCEDANIS

remedia.

Tragacantha.

REDVVIAS

sanantia.

Ferri rubigo.

REFRIGERAN-

tes medicinae.

X x

INDEX

Vnguentum melinum	Pompholyx
Cupressus	Plumbum elotum
Rhodides	Spuma argenti
Rosa	Cerussa
Acacia	Corallium
Ouum	Terra
Sonchos	Lapis samius
Seris	Terra ampelitis.
Lactuca	REGII morbi
Caros	remedia.
Coriandrum	Nardi spica
Hieracium maius	Schistos
Polygonum duplex	Ceruinum cornu
Clymenon	Fimum
Periclymenon	Cicer
Helxine	Lapathum
Papauer sativum	Atriplex
Psyllium	Asparagus
Cicuta	Erysimon
Lens palustris	Scilla
Aizoon duplex	Chelidonium
Erigeron	Aloe
Phacos thalassion	Absynthium
Potamogeton	Origanum
Cytisus	Hippomarathrum
Ebulus	Libanotis
Acetum	Sphondylium
Omphacomeli	Laserpitium

C V R A T I V V S.

Prasum	Calamus odoratus
Scordion	Cicer Casta
Asplenon	Cinnamomum
Anthemis	Chamapitys
Peonia	Passum
Erythrodanum	Glycyrrhiza
Chamapitys	Iuncus odoratus
Pentaphyllon	Laurinum
Hyacinthus	Lac
Halicacabus	Lotus sativa
Chamecissos	Men
Osyris	Pistacia
Myrtus sylvestris	Nardus Gallica
Elaterium	Nuclei pini
Vinum chamedryte	Oleum amygdalarum
Vinum calaminthite	Palma elate
Vinum nardite	Portulaca
Sulphur.	Plantago
RENVM doloris	Porrum
remedia.	Petroselinum
Amygdala amara	Peucedanum
Asparagus	Peonia
Anagallis	Rhaponticum
Agaricus	Saccharum
Anthyllis	Scandyx
Anchusa	Smyrnion
Halcyonium	Symphyton
Cardamomum	Stratiotes aquaticus

X x ij

INDEX

Tragacantha	Oleum oleastri
Cordylon	Ouum
Vrina	Persica
Vetonica	Portulaca
Vua passa	Plantago
Vinum	Staphis agria
Vinum cydonite	Triticum
Vinum holosanthinum	Vini qualitas
Erinaceus terrestris	Vinum labrusca
Fœniculus	Vinum ex pyris
Vinum absynthite	Vinum myrtite.
Vinum nardite	RIGINOS necantia.
Vinum aromatite	Cedria.
Oleum balatinum.	RIGORES seu hor-
RHAGADVM	rores febrium ex-
remedia.	cutientia.
Pix	Gleucinum
Lycium	Piper
Vitex	Panaces heracleon
Cancr.	Staphylinus
RHEVMATIS	Vinum cedrite
mis utilia.	Pyrethrum.
Acetum	RIMARVM sedis
Cupressus	remedia.
Daphnoides	Vide, Sedis rimarum.
Ficus	ROSIONIS res-
Fex vini	media.
Macer	Lac schiston

CURATIVVS.

Peonia.	Aristolochia
R V C T V M monētia.	Centaurium
Mastiche	Acantha
Rhaphanus	Leucacantha
Anethum	Abrotonum
Smyrnion	Origanum
Vinum daucite.	Calamintha
R V P T O R V M	Serpyllum
remedia.	Baccharis
Acorus	Panaces heracleon
Cardamomum	Libanotis
Asarum	Laserpitium
Calamus odoratus	Sagapenum
Helenium	Galbanum
Bdellium	Polycnemum
Iuniperus	Chimopodion
Cedrides	Althea
Halimos	Cestron
Lixinia ex ficu	Symphyton
Fel	Holosteum
Fimum	Xyris
Dracunculus maior	Hippuris
Dracunculus minor	Heliochryson
Asphodelus	Phlomidis
Bulbus esculentus	Ampelos leuce
Capparis	Vinum daucite
Rhaponticum	Vinum tragoriganite
Gentiana	Vinum panacite

X x iij

INDEX

Lapis schistos.	Myrtus
S AGITTAS infu-	Cichorium
xas extrahentia.	Amygdalus amara
Vide, Spicula infixa.	Ouum
SALIVAM euo-	Ceruinum cornu
cantia.	Fimum
Pyrethrum.	Coagulum
SALAMANDRAE	Triticum
ueneni remedia.	Amylum
Diosc. lib. 6. cap. 4.	Portulaca
SANGVINEM ex-	Plantago
creantibus utilia.	Porrum
Iuncus odoratus	Erysimon
Aspalathus	Agaricum
Thus in potu datum	Aloe
Lentiscus	Rhaponticum
Mastiche potu data	Centaurium
Naphtha	Acantha leuce & Aras
Cupressus	bica
Macer	Ferula
Myrica	Althea
Hypocistis	Cestron
Rosa	Lysimachia
Lycium	Symphytum
Salix	Polygonon mas
Quercus	Symphytum alterum
Palma	Clymenon
Malum punicum	Aethiopsis

CURATIVVS.

Isopyrum	Serpyllum
Adiantum	Ruta
Vitis sativa	Cuminum sativum
Vua	Stæbe
Omphacium	Ferula
Vinum phœnicitæ	Clymenon
Corallium	Hippuris
Lapis hematites	Sideritis achilleos
Terra samia.	Pentaphyllon
SANGVINEM	Phoenix herba
sistentia.	Astragalus
Thus	Lichen in petris
Cupressus	Idea radix
Galla	Gallion
Persea	Stratiotes terrestris
Cocleæ terrestres	Vua cœnanthe
Rane	Acetum
Araneus	Vinum terebinthinum
Ouum	Plumbum elotum
Coagulum	Stimmi
Sanguis	Cinnabaris
Fimum	Alumen
Faba	Sulphur
Plantago	Spongiæ
Porrum	Gypsum.
Isatis	SANGVINEM cō-
Eleisphacos	cretum discutientia.
Mentha	Lixivia ex ficu

X x iij

INDEX

Thymus	SCABIEI morbi
Heliochryson.	remedia.
SANGVINEN per	Argemone prima
urinam expellentia.	Chamaleon niger
Eruum	Helleborus niger
Cantharides	Oesyrium
Ammoniacum.	Oleum oleastri
SANGVINEM per	Sinapi
nares expellentia.	Sulphur
Crocodilium.	Vnguentum melinum.
SANGVINEM per	SCOLOPEN
urinam reddentium	dre morsus remedia.
remedia.	Grossi
Cuminum sylvestre.	Scolopendra
SANGVISUGAS	Asphodelus
necantia.	Sal.
Oxalme	Dioscorides libro.6.ca-
Diosc.lib.6.cap.32.	pit.59.
SANDRACHAE	SCORPIONIS
curatio.	ictus remedia.
Diosco.lib.6.cap.29.	Cyperus
SARDONIAE	Amomum
curatio.	Cardamomum
Diosc.lib.7.cap.14.	Cinnamomum
SCABIEI iumen =	Daphnoides
torum emendantia.	Myrtus
Vide, Iumentorum sca-	Ficus
biens.	Cancer

CURATIVVS.

Scorpius terrestris	Vinum cydonite
Smarides	Sulphur
Mullus piscis	Sal
Locuste	Lapis sapphirus.
Lacerta	Diosc.lib.6.cap.60.
Mures domestici	SCORPIONES
Fimum	necantia.
Lapathum	Cancr.
Sonchos	SCORPIONIS
Seris	marini ictus reme
Lactuca sylvestris	dia.
Ocymum	Vrina
Abrotonum	Asphodelus
Sampsuchum	Plumbum syncerum &
Hieracium maius	crematum
Delphinion	Sulphur.
Laserpitium	Diosc.lib.6.cap.61.
Atractilis	SCORPIONES
Lychnis utraq;	torpescientia.
Millefolium	Delphinion
Phalangium	Lychnis sylvestris
Polemonia	Lens. palustris.
Chamaesyce	SECUNDINAS
Heliotropium	trahentia.
Scorpioides	Balsamum
Aqua maris	Sampsuchinum
Vinum tethalassome =	Abrotonum
num	Picea Schistos

INDEX

Fiber	Lens	Libanotis
Iecur mergi	Symphyton	
Linum	Erigeron	
Aristolochia tertia	SEDIS morbi rec	
Thymus	media.	
Pulegium	Thus	
Prasium	Lentiscus	
Stachys	Pix	Rosa
Artemisia	Amurca	
Oenanthe	Malum punicum	
Hemicrocallis	Myrtus	
Erythrodanum	Cancr	
Anagyris	Ouum	
Myrtus	Oesypum	
Adiantum	Adeps	Fel
Ampelos leuce	Lens	
Vinum dictamnite.	Malua	
SEDIS rimarum	Althea	
remedia.	Portulaca	
Strigmenta balneo	Sonchos	
rum	Anagallis	
Mes	Melilotus	
Dipsacos	Laserpitium	
Leucoion.	Aster atticus	
SEDIS inflammatio-	Viola purpurea	
nis remedia.	Cucumis anguinus	
Oleum cicinum	Colocynthis	
Amaracinum	Acetum	

C V R A T I V V S.

Oxalme	Rhaponticum
Vinum terebinthium	Aristolochia tertia.
Flos æris	Origanum sylvestre
Plumbum elotum.	Baccharis
SEMINA que perimunt.	Ruta
Diosc. lib. 6. in præfat.	Phlomos, siue uerbasum
SENSIBVS nocētia	Panaces chironium
Vinum annosum.	Staphylinus
SENSVS recreantia.	Smyrnion
Lapis Samius.	Aparine
SEPIS bestiole mortuus remedia.	Chamedrys
Portulaca	Lychnis fatiua, siue coronaria
Oxymel.	Erythrodanum siue Rubia
SERPENTIVM uenenis contraria.	Sparganion
Paliurus	Polygonon mas
Vitex	Clematis daphnoides
Cancrī	Polemonia
Hippopotamus	Anchusa
Fiber Mustela	Ocimoides
Gallinaceus	Hyacinthus
Cantharides	Mandragoras
Chondrylla	Nerion
Nasturtium	Adiantum.
Dracunculus	SERPENTES
Aphodelus	fugantia.

INDEX

Iuniperus	Ficus Aegyptia
Cornus ceruinum	Pastinaca piscis
Adeps	Rana
Nasturtium	Cobius
Dracunculus maior	Fel
Abrotonum	Omotarichos
Origanum	Fimum
Calamintha	Marinus pulma
Peucedanum	Mel
Melanthion	Eruum
Galbanum	Dictamnus
Polium	Rhaphanus
Oenanthe	Agaricum
Lysimachia	Brassica sativa
Aster Atticus	Cyclaminos
Vinum conixite	Ampeloprason
Lapis gagates.	Dracunculus minor
SERPENTIVM	Asphodelus
morsus remedia.	Anagallis
Iris Illyrica	Acantha leuce
Asarum	Abrotonum
Cinnamomum	Asclepias
Balsamum	Origanum
Pix	Lilium
Iuniperus	Calamintha
Platanus	Clinopodium
Erica	Serpyllum
Pistacia	Leontopetalon

CURATIVVS.

Lanaces heracleon &	Oxymeli
asclepion	Vinum conizite
Cyminum satium &	Vinum panacite
sylvestre	Sal Cinis uitis
Ammi	Lapis ophites.
Fœniculum	SERPENTES ne
Daucus	feriant.
Libanotis	(erui medulla.
Sagapenor	SERPENTES ne
Prasion	cantia.
Phyllitis	Anchusa onocheles
Trifolium	Vinum cedrite.
Scordion	SICCANTES
Cestron	medicinae.
Periclymenos	Ammi
Echion	Bromos
Ocymoides, siue ocymastrum	Cistos
Rubus	Cyminum satium
Eupatorium	Ebulus
Heliochryson	Aes ustum
Adiantum	Arena litoris
Peristereon supinus	Libanotis
Ebulus	Mentha
Ampelos leuce	Pompholyx
Vitis satina	Spodium
Vinum	Rubus
Acetum	Terra Chia
	Rubrica sinopis

INDEX

Fex vini	Vide, Taxo contraria.
Diphryges.	SOMNIFER AE
SINGULTVM	medicine.
pellentia.	Amygdale amare
Fiber	Halicacabus, siue solanum uesticarum.
Sisymbrium	Anisum
Rhaponticum	Amomum
Mentha	Cistos tertia, siue ladanum
Aristolochia tertia	Baccharis
Anethum	Dorycnion
Cuminum sylvestre	Hyoscyamus
Alysson	Lactuca
Asplenon	Iris Illyrica
Clymenon	Opium
Saxifragum.	Mandragoras
SIRIASIS res	Papauer rhœas, siue sativum
media.	Porrum
Cucurbita	Styrax
Pepo	Smilax hortensis
Heliotropium maius.	Strychnon hypnoticon
SITIM generantia.	siue solanum somnificum
Cæpe	Vitex
Capparis	Vinum novum
Vini qualitas.	Lapis memphites.
SITIM extinguentia.	
Glycyrrhiza	
Symphytum.	
SMILACI cōtraria.	

CURATIVVS.

SOMNVM discu-
tientia.

Sphondylium

Peucedanum.

SOMNIA imaginosa
& mala inducentia.

Faba

Lens

Pygnoconomum

Smilax levis.

SORDES purgãtia.

Irinum

Cortex thuris

Sabina.

SPASTICORVM
remedia.

Fiber.

SPASMI remedia.

Vide, Convulsionis reme-
dia.

SPIRITVM id est,
flatum generantia.

Gentiana.

SPIRANTIBVS
difficulter utilia.

Vide, Orthopnoicis.

SPIRITVS discurs-
rentes coercentia.

Bdellium.

SPIRANTIBVS

vitam auferentia.

Cedria.

SPICVLA infixa cor-
pori extrahentia.

Anagallis

Harundo

Aristolochia

Dictamnus

Propolis

Narcissus

Oxyacantha

Silurus

Triticum

Tragion

Xyphion

Xyris

Lacerta.

SPISSANDI vim
habentia.

Acacia

Malus

Cotonea

Malum sylvestre

Amydalus amara

Baccharis

Britannica

Polygonon mas & fœ-

INDEX

<i>mina</i>	<i>contraria.</i>
Clymenon	Vinum in commune.
Medion	SQVAMAS osium
Rubus	extrahentia.
Helxine	Aristolochia tertia
Idea radix	Peucedanum.
Hippuris	STAPHYLOMA
Psyllium	tis remedia.
Bryon thalassium	Palma Thebaica
Potamogeton	Lapis schistos
Acetum	Lapis sapphiros.
Vinum Hadrianum	STERNUTA
Aerugo aurificum	mentum mouen-
Vinum nigrum labrus-	tia.
scæ	Iris Illyrica
Vinum Tyburtinum	Fiber Sinapi
Cadmia	Ptarmice
Pompholyx	Struthion
Squama aris	Batrachion
Pumex	Daphnoides
Corallium	Helleborus albus.
Rubrica sinopis	STERILES semis
Lapis hematites.	nas facientia.
SPLENETICIS	Vide, Generationem de-
utilia.	primentia.
Vide, Lienis morbi reme-	STIGMATVM
dia.	remedia.
SPVMAE argenti	Batrachion
	Mandragora.

EV R A T I V V S.

Mandragora.	Aqua maris
STOMACO CON	Vinum tethalassome-
traria.	num.
Terebinthina	STOMACHI mor
Cedrides	bi remedia.
Melimela	Meu
Pruna	Nardi spica
Arbutus	Nardum Gallicum
Juglans	Malabathrum
Auellana	Iuncus odoratus
Ficus	Agallochum
Hordeum	Helenium
Lens	Oleum balaninum
Malua	Mastichinum
Porrum	Vnguentum rosaceum
Brassica sativa & ma-	Susinum
rina	Nuclei pinõ
Cepe	Mastiche
Nasturtium	Cupressus
Capparis	Iuniperus
Absynthium	Laurus
Absynthiũ seriphium	Populus nigra
Balanus myrepsica	Rosa
Vua	Oliua colymbades
Thymelea	Palma
Ebulus	Palma elate
Prasium	Malum punicum
Galbanum	Silique

Yy

I N D E X

Myrtus	Portulaca
Cotonea	Sonchos
Mala Epirotica	Seris
Armenaca	Cucumis
Mespilus	Lotus
Pruna	Pactuca
Amygdale dulces	Gingidium
Pistacia	Scandyx
Iuglans	Aphace
Morus	Ampeloprasora
Persea	Allium
Ficus Aegyptia	Zingiber
Ionid	Scilla
Cochlea terrestres	Bulbus esculentus
Ouum	Agarium
Lac	Rhaponticum
Lac humanum	Gentiana
Caseus	Acantha leuce
Lana succida	Aloe
Oryza	Absynthium
Lyncurion	Mentha
Saccharon	Tragoriganum
Faba Aegyptia	Pulegium
Sifer	Melilotus
Lupinum sativum	Ligusticum
Lapathum	Caros
Lampfana	Anethum
Brassica satina	Cynium sylvestre
	Hieracium minus
	Apium

C V R A T I V V S.

Petroselinum	Vinum omphacite
Smyrnion	Vinum nigrum ex labris
Fœniculus	sca floribus
Scordion	Vinum melitite
Artemisia	Vinum scilliticum
Nymphaea	Pæonia Vinum cydonite
Cestron	Vinum apijte
Polygonon mas	Vinum anethinum
Rubus	Vinum rhoite
Strychnon sativum	Vinum myrtite
Cotyledon prima	Vinum terebinthi
Erigeron	num
Adiantum	Vinum phœnicite
Aster Atticus	Vinum absynthite
Viola purpurea	Vinum bunite.
Chamedaphne	Vinum dictamnite
Colocynthis	Vinum calaminthite
Vitis famia	Vinum aromatite
Nuclei acinorum	Vinum nectarite
Vua ornanthe	Vinum nardite
Omphacium	Vinum ex sylvestri nar
Vini qualitas	do
Phalernum	Vinum selenite
Hydromel	Ferrum
Thymoxalme	Flos salis
Omphacomeli	Fæx uini
Vinum	Lapis alabastrite
Vinum Surrentinum	Lapis Samius

Yy q̃

INDEX

STRUMAE GVT	Pseudobunion
turis remedia.	Adiantum
Iris Illyrica	Teste siue terra forn
Grosi	cum
Vipera	STRANGVLA
Mustela	tus remedia.
Vnguis asini	Irinum
Fimum	Absynthium.
Hordeum	STRANGVRIAE
Lolium	morbi remedia.
Faba	Lens Aspalathus
Lupinum satium	Cedrides
Lapathum	Locusta
Andrachne, siue portu-	Asparagus
laca syluestris	Sisymbrium
Plantago	Medica
Piper	Panaces heracleon
Capparis	Seseli Massiliense
Argemone	Hipposelinon
Goriandrum	Hippomarathron
Libanotis	Polycnemon
Laserpitium	Clinopodium
Aparine	Oenanthe
Millefolium	Conixa
Scordion	Asplenon
Lithospermon	Cape
Cotyledon prima	Onobrychis
Ealiopsis	Polygonon mas

CURATIVVS.

Saxifragon	SVDORES EVO
Xyris	cantia.
Laurus Alexandrina	Metopium unguentum
Tragion	Smyrnion
Pseudobunion	Pyrethrum
Adiantum.	Onobrychis
STYPICAE ME=	Flos salis
dicinae.	Anchusa
Vide, Adstrictoriae me=	Lycopsis.
dicinae.	SVES necantia.
SVCCI qui perimūt.	Chamaeleon albus.
Dioscorides libro . 6 . in	SVFFVSIONVM
præfat.	morbi remedia.
SVDOREM DE=	Fel Sanguis
primentia .	Sagapenum
Oleum	Euphorbium
Oleum omphacinum	Chamaesyce
Oleum oleastri	Harena litoris.
Myrteum	SVGILLATORVM
Lentiscinum	remedia .
Vnguentum melinum	Acetum Sal.
Rhod:des	SUPERCILIO=
Myrtus	rum raritati utilia.
Bulbus esculentus	Picea.
Vinum myrsinite	SVPERCILIIS
Sulphur	glabris utilia.
Gypsum	Fuligo resinae.
Terra samia.	SVPPVRATIO=
	Yy iij

INDEX

nis tuberculorum remedia.	Agaricum
Crocomagna	Rhaponticum
Palimpissa.	Aristolochia tertia
SUPPURATIO=	Hyssopum
num remedia.	Thymus
Ficus Aegyptia	Acinos
Mel	Ruta
Hordeum	Galbanum
Lolium	Ammoniacum
Cucurbita	Prasum
Ligusticum	Parthenium
Smyrnion	Anagyris
Althea	Adiantum Thapsia
Mandragoras	Ampelos leuce
Vrtica	Vinum passite
Narcissus	Vinum hyssopite.
Ampelos leuce	TABIDI corporis
Diphryges.	remedia.
SVSPIRIOSOR=	Vide, Phthysicorum re-
rum remedia.	media.
Canchamum	TABESCENTI-
Cyphi	bus utilia.
Oleum amygdalarum	Daphnoides.
Pix	Vinum strobilite.
Ficus	TAXO contraria.
Vulpinus pulmo	Vinum in commune
Eruum	Acetum.
Plantago	Diosc.lib.6.cap.12.

CURATIVVS.

TELA infixa corpori= Melilotos
bus extrahentia. Ruta

Vide, Spicula infixa. Cyminum

TENASMI morbi Liliū
remedia. Hyoscyamus

Lac schiston Erigeron

Fœnogræcum Vua passa Sal

Linum Geodes lapis

Eruum Terra samia

TEREDINEM Cimolia.

sentientia.

THAPSIÆ

Ficus Aegyptia contraria.

Hyoscyamus. Diosc. lib. 6. in præfat.

TEREDINEM nō & cap. 33.

sentientia.

THERIACAM

Tilia. ingredientia.

Herm. Cor. cap. 133. Rapa satina

TEREDINEM Zingiber

necantia. Dictamnus

Sal. Apium

TESTIVM more THERIOMAT

bi remedia. tum remedia.

Vitex Lupinum sativum

Myrtus Eleliphacos.

Cicer THORACIS res

Faba media.

Erysimon Cerebrum gallinacei

Asphodelus Glycyrrhiza.

Y y iij

INDEX

THYMOS AB-	Bryon thalassion
sumentia.	Pteris
Smaris	Fimum Thelypteris
Thymus	Ruta Vinum cedrite
Heliotropium maius	Chalcanthum
Vitis sativa	Sal. Anchusa tertia.
TIBIARVM VL-	TINEAS rotundas
cerum remedia.	generantia.
Hydropiper	Triticum.
Ampelos leuce.	TINEAS necantia.
TINEAS LATAS	Absynthium seriphion
pellentia.	Mentha
Cardamomum	Heliotropium minus
Costum	Cedria
Malicorium	Aizoon maius.
Melimela	TINEIS contraria.
Iuglans	Morus Citria.
Heliotropium minus	TONSILLARVM
Vinum absynthite	morbi remedia.
Lupinum sativum	Pix Cedria.
Brassica sativa	Lycium
Portulaca	Pruna
Chamaeleon albus	Morus
Hyssopum	Ficus
Calamintha	Hirundines
Thymus	Ruta Lac schiston
Coriandrum	Mel Sinapi
Melilotum	Aloe

C V R A T I V V S.

Origanum		Sisymbrium	
Britannica		Piper	Scilla
Periclymenos		Agaricum	
Helxine		Rhaponticum	
Peristereon supinus		Centaurium maius	
Omphacium		Eryngion	
Vinum myrsinitis		Calamintha	
Flos aris		Serpyllum	
Alumen	Sal.	Sampsuchus	Ruta
TORMINIS	re=	Panaces heracleon	
media.		Acetum	
Iris Illyrica.		Cyminum sativum	
Acorus	Men	Seseli Massiliense	
Cardamomum		Cyminum sylvestre	
Balsamum		Elaphoboscon	
Agallochum		Petroselinum	
Oleum		Daucus	
Iuniperus		Libanotis	
Halimos		Ferula	
Iuglans		Peucedanum	
Ficus		Asclepias	
Fiber		Melissophyllum	
Talus suis		Phalangion	
Triticum		Coniza	
Milium		Alisma	
Panicum		Chamaepitys	
Eruum		Cramen	
Atriplex		Pseudobunion	

INDEX

Chamedaphne	Strigmenta gymnastor
Vinum scillite	rum
Vinum cedrite	Morus Cape
Vinum hyssopite	Asphodelus
Vinum tragoriganite	Panaces Asclepion
Vinum panacite	Laserpitium
Aphronitrum	Viscum Thapsia
Et in uerbo, Dysenteris	Mandragoras
corum remedia.	Ephemeron
TORPORIS re=	Cucumis anguinus
media.	Vrtica
Fagus.	Aerugo aurificum
TORSIONIS	Lapis Asrus
remedia.	Terra cimolia.
Tragoriganum.	TVBERA exte=
TOXICO cōtraria.	nuantia.
Glandes	Triticum
Sanguis.	Leontopodium
TREMOREM	Scammonia
excutientia.	Vinum nigrum è labru
Vnguentum cinnamomi	sca.
num.	TVMORVM
TREMORIS re=	remedia.
media.	Anagyris
Lepus terrestris.	Platanus
TVBERCVLO =	Fagus
rum suppuratio=	Ilex Adeps
nis remedia.	Hordeum Faba

C V R A T I V V S.

Brassica sativa & syl-	Phlomis
uestris	Cucumis anguinus
Cucurbita	Thapsia
Nasturtium	Chamaesyce
Hydropiper	Pygnoكوم
Bulbus esculentus	Aqua maris
Isatis	Indicus lapis
Chameleon	Fex uini Spongia.
Tragoriganum	T V S S I S remedia.
Sampsuchum	Amygdala amara
Ligusticum	Asphodelus
Daucus	Apium sativum
Libanotis	Bdellium
Melanthion	Bromos
Orchis serapias	Cinnamomum
Orminum	Calamus odoratus
Buphtthalmus	Cupressus
Cannabis syluatica	Cedrides
Polygonon mas	Cistos Cacalia
Lagopus Xyris	Chamedrys
Helxine	Tragacantha
Pentaphyllon	Dracunculus
Peristereon supinus	Faba Helenium
Hyoscyamus	Hippuris
Psyllium	Hyoscyamus
Xanthium	Iris Illyrica
Sesamoides	Lycium
Ephemeron	Laserpitium Mel

INDEX

Melicratum		Centaurium maius
Origanum	Pix	Baccharis
Paliurus	Piper	Seseli Massiliense
Peucedanum		Daucus
Prasium		Sagapenon Galbanum
Papauer sativum		Scordion
Ruta	Styrax	Bechion
Struthion		Helxine
Smyrnion		Phlomidis
sulphur		Acetum
Triticum		Vinum hyssopite
Tragoriganum		Sandaracha.
Terebinthina		V AROS purgans
Vna passa.		tia.
TVSSIS ueteris		Oleum balaninum.
remedia.		Myrrha
Asarum		Lacerta
Myrrha		Linum
Nuclei pini		Porrum
Mastiche		Cape
Naphtha		Bulbus esculentus
Cerasia		Pulegium
Amygdala amara		Balanus myrepica
Auevana		Cici
Allium		Sory.
Ficus	Propolis	Ampelos leuce.
Rhaphanus		V ARICES sanans
Scilla	Hyssopus	tia.
		Cirsion.
		V ENEFICIIS
		medetur.

CURATIVVS.

Scilla.		Orminum
VENEREM cum no		Xiphium
luptate expe-		Vrtica
dientia.		Caliopsis.
Laurus Alexandrina.		VENENATA
VENEREM co		fugantia.
hibentia		Vitex
Portulaca		Dictamnus.
Lactuca		VENAS excitantia.
Lactuca sylvestris.		Vinum Phalernum.
VENEREM sti-		VENTRIS anima-
mulantia.		lia expellentia.
Costum	Crocum	Vide, Tineas latas.
Mastiche		VENTREM solu-
Linum		uentia.
Rapa sativa		Vide, Aluum soluentia.
Sifer	Eruca	VENENATO-
Porrum	Cape	rum ictus re-
Nasturtium		dia.
Dracunculus maior		Cardamomum
Dracunculus minor		Nardum gallicum
Bulbus esculentus		Helenium
Mentha		Cinnamomum
Staphylinus		Bdellium
Anisum	Orchis	Vitex
Orchis serapias		Propolis
Satyrion		Triticum
Satyrion alterum		Eryngium
		Cyminum sylvestre
		Althea
		Tribulus

I N D E X

Prasum

Smilax aspera

Aqua maris

Acetum.

V E N E N O R V M

remedia.

Cinnamomum

Oleum

Paliurus

Olea Aethiopica

Iuglans

Lixivia ex ficu

Lepus terrestris

Fiber

Sanguis

Rapa sativa

Malua

Erysimon

Agaricum

Aristolochia secunda

Abrotonum

Ruta

Laserpitium

Leucas

Pelium

Pentaphyllum

Colchicon

Epipactis

Passum

Linum gypsatum

Rubrica lemmia

Terra samia.

V E R M I B V S

contraria.

Cedria.

V E R R V C A S

tollentia.

Batrachion

Clinopodion

Characias

Chamaesyce Dipsacos

Ficus Grossi

Cicer Lacerta

Heliotropium

Fimum

Staphis agria

Scilla Thymus.

V E R T I G I N I S

morbi remedia.

Balsamum

Lac humanum

Peucedanum

Galbanum

Ampelos leuce

Ampelos melena

Acetum scilliticum

CURATIVVS.

Vinum scilliticum.	Lotus syluestris	
VERTIGINEM	Plantago	Vua passa
adgenerantia.	Cucumis	
Cardamomum	Scandyx	Passum
Balsamum	Ochra	Porrum
H yoscyamus	Bulbus uomitiuus	
Mandragoras	Rhaponticum	
Falernum	Glycyrrhiza	
Vinum rhetinite	Tragacantha	
Mandragorite	Panaces heracleon	
Aconitum	Cicuta.	Petroselinum
VESICAE morbi	Smyrnion	
remedia.	Peucedanum	
Meis	Fœniculus	
Nardum Gallicum	Nymphaea	
Nuclei pini	Anthemis	Pœonia
Cupressus	Phalaris	
Laurus	Palma	Cæpe
Palma etate	Halcyonium	
Myrtus	Lac	Cestron
Ficus	Ouum	Vinum terebinthinum
Cochleæ terrestres		Vinum scilliticum
Cicadæ	Napum	Vinum aromatite
Ceruinum cornu		Vinum halofanthite
Saccharum		Lapis morochthus.
Gramen	Malua	VESPARVM ictus
Hippuris		remedia.
Portulaca	Laurus	Malua

INDEX

Sisymbrium.	Vinum in comuni
VESTIBVS ne	Acetum
animalia nos	Vinum Absynthite
ceant.	Diosco.lib.6.cap.21.
Absynthium	VISCERVM mora
Heliocryfos.	bi remedia.
VIBICES plagas	Thus.
rum emendan	VITILIGINIS
tia.	remedia.
Susinum.	Daphnoides Myrtus
VIPERAE morsus	Ficus Grossi
remedia.	Cochleæ terrestres
Casia Costum	Lepus terrestris
Iuniperus	Sepiæ Faba
Macer	Beta
Fraxinus Vrina	Lupinum sativum
Caries lignorum	Chondrylla
Triticum Eruum	Cepa Allium
Ferula Anchusa	Piper
Onocheles	Dracunculus maior
Ocimoides	Dracunculus minor
Dioscorides libro.6.ca=	Asphodelus
pit.63.	Capparis
Herm. Coroll. cap.721.	Argemone
VIRIVM infirmitas	Gentiana
tes roborantia.	Telephion Ruta
Nuclei pini.	Chamæleon niger
VISCO contraria.	Libanotis Lilium
	Nymphaea

E V R A T I V V S.

Nymphaea	Cicuta	VOCEM claram
Erythrodanum		reddentia.
Helleborum nigrum	Myrrha	
Cucumis anguinus	Styrax	Silurus.
Balanus myrepfica	VOLVPTATES	
Narcissus	animi auge-	
Sulphur	scientia.	
Halcyonium	Buglossum.	
Terra melia.	VOLVCRVM mor-	
VITRA fracta con-	sus remedia.	
glutinantia.	Iecur aprinum.	
Herm. Cor. cap. 254.	VOMITIONES	
VMBILICI re-	mouentia.	
media.	Irinum	Laurus
Lapis magnes.	Coclee terrestres	
VNGVIBVS utilia.	Omotarichos	
Pix	Cupressus	Blatte
Daphnoides		Pepo
Olea	Asphodelus	
Linum	Oryza	Capparis
Lapathum	Bulbus vomitorius	
Bulbus esculentus	Origanum	
Batrachion	Cestrum	
Chelidonium minus	Anagyris semen	
Viscum	Vua passa	Papauer spumeum
Sandaracha		Mandragoras
Alumen		Daphnoides
Sulphur		Helleborus albus
Fex vini.	Elaterion	Silybon
	Z z	

INDEX

Balanus myrepfica
 Narcissus
 Melicratum
 Aes ystum
 Chrysocolia
 Rubrica lemnia.
 VOMITIONES
 cohibentia
 Atriplex
 Apium
 Mentha
 Eupatorium.
 VOMICA E mor=
 biremedia.
 Paulurus
 Struthion
 Bechion
 Mandragora
 Acetum.
 VRENDI uim
 habentia.
 Misy
 VRENDINEM
 facientia.
 Trifolium.
 VRINAE difficul=
 tatem generans
 tia.
 Cici
 Diose. lib. 6. in præfa
 VRINAE haren
 sa & aspera re
 media.
 Papauer ceratitis.
 VRINAM cruenta
 mouentia.
 Clymenon.
 VRINAM ar
 cessentia.
 Erum Galbanum
 VRINAM mo
 uentia.
 Acorus
 Cyperus
 Cardamomum
 Nardi spica
 Nardum Gallicum
 Asarum
 Malabathron
 Cassia
 Cinnamomum
 Costum
 Iuncus odoratus
 Calamus odoratus
 Balsamum
 Crocum
 Croc magna
 Men
 Phis

C V R A T I V V S.

Helenium		Panicum	
Oleum amygdalinum		Cicer	Eruum
Vnguentum melinum		Rapa sativa	
Susinum		Rhaphanus	
Irinum		Raphanus agria	
Amaracinum		Sifer	Bunion
Bdellium		Brassica sativa	
Picea	Nuclei pini	Asparagus	
Lentiscus	Resina	Sisymbrium aquati-	
Terebinthus		cum	
Cupressus		Crithmon	
Juniperus		Cucumis	Pepo
Populus alba		Lactuca	
Paliurus	Tilia	Gingidium	
Olea Aethiopica		Caucalis	Eruca
Glandes	Myrtus	Ocymum	
Palma elate		Smilax hortensis	
Siliqua	Cotonea	Porrum	
Mala Epirotica		Ampeloprasum	
Cornus		Cepa	Allium
Amygdala dulces		Piper	
Erinaceus maritimus		Struthion	
Cimices lecti		Dracunculus	
Oves	Buprestis	Asphodelus	
Vermes terreni		Scilla	Capparis
Mel	Hordeum	Agaricum	
Zythum		Crocodilum	
Milium		Centaurium maius	

Z x ij

INDEX

Chameleon albus		Anthemis	
Acantha leuce		Lithosperma	
Acantha	Anonis	Erythrodanum	
Eryngion		Lonchitis	Althæa
Absynthium		Hypericon	
Abrotonum		Choris	
Tragoriganum		Chamepitys	
Elelisphacos		Cestron	
Thymus		Polygonon mas	
Serpyllum		Polemonia	
Baccharis		Saxifragon	
Ruta	Moly	Xyris	Gramen
Ligusticum		Gramen parnasium	
Staphylinus		Phoenix herba	
Tordylon		Hippuris	
Sisum	Anisum	Oxyscenos	
Caros Anethum		Heliochrysos	
Cyminum sylvestre		Astragalus	
Opium		Hyacinthus	
Oreoselinum		Papaner rheas	
Petroselinum		Strychnon hypnoticon	
Daucus	Libanotis	Cotyledon prima	
Melanthion		Vrtica	Arction
Ammoniacum		Vinum Lesbion	
Chamedris		Hydromel	
Trifolium	Scordion	Melicratum	
Androsaces		Vinum rhetimite	
Anthyllis		Vinum caterchite	

C V R A T I V V S.

Vinum è cedro	Omphacium
Vinum è lauro	Acetum
Vinum absynthite	Flos æris
Vinum calaminthite	Alumen Sal.
Vinum aromatite	VVL P E S necantia.
Vinum nectarite	Apocynon.
Vinum nardite	VVL N E R V M re-
Vinum asarite	media.
Vinum sylvestris nardi	Amurca
Vinum daucite	Allium
Vinum acorite	Argemone
Halcyonium	Aristolochia
Lapis hematites	Aloe Anthyllis
Lapis Iudaicus	Althæa
Corallium	Androsæmon
Vinum chamæpyteos.	Lycopsis Acetum
VERTICAE her-	Butyrum
ba pruritus re-	Brassica
media.	Ceccus
Herm. Cor. cap. 707.	Chamæpitys
VSTIS utilia.	Centaurion
Vrtica siue acalyphe.	Cyclaminos
VVAE faucium	Cytinus
remedia.	Cupressus
Pix Galla	Dracunculus
Pruna	Dictamnus
Hirundines	Aerugo aurificum
Vrtica	Oenanthe

Z z iij

INDEX

Ficus Aegyptia	Symphyton
Fimum	Sideritis
Gentiana	Stratiotes aquaticus
Glycyrrhiza	Spongia
Glutinum	Cochlea terrestres
Hippuris	Thus
Isatis	Terra cretria
Lana succida	Vinum
Ligusticum	Vinum cenanthe
Lilium	Vnguentum citrinum
Lysimachion	Vlmus
Minium sinopicum	Vitex.
Myriophyllum	VVLVAE mulie-
Picea	ris remedia.
Palma	Men
Portulaca	Cyperus
Porrum	Nardi spica
Polycnemon	Casia
Polium	Costum
Polygonon mas	Iuncus odoratus
Polygonatum	Balsamum
Pentaphyllum	Bryon
Phœnix herba	Nacaphthum
Pteris	Oleum amygdalinum
Peristereon	Mastichinum
Papauer	Vnguentum rosaceum
Plumbum elotum	Melinum
Scordion	Sampsuchinum

CVRATIVVS.


Abrotoninum	Iuglans
Susinum	Cimices lecti
Narcissinum	Lac schiston
Crocinum	Butyrum
Irinum	Oesypum
Glencinum	Coagulum
Amaracinum	Adeps
Metopium	Fœnograecum
Cinnamomum	Pinum
Myrrha	Malua
Styrax	Portulaca
Bdellium	Plantago
Lentiscus	Sonchos
Pix	Porrum
Naphtha	Sinapi
Iuniperus	Piper
Laurus	Agaricum
Myrica	Rhaponticum
Cistos	Pulegium
Rosa	Centaurium minus
Lycium	Melilotus
Acacia	Ruta
Amarca	Panaces heracleon
Vitex	Ammi
Galla	Sphondylion
Palma elate	Peucedanum
Myrtus	Sagapenum
Cotonea	Galbanum


Z x iij

INDEX


Asclepias	Vinum picatum, siue pis
Lilium	site
Circea	Vinum chamaedryte
Arthemisia	Vinum daucite
Geranion	Vinum helleborite
Anthyllis	Lapis gagates
Parthenion	Peristereon rectus
Peonia	Hyoscyamus
Cestron	Mandragoras
Clematis daphnoides	Ebulus
Chrysocome	Ampelos leuco
Ageraton	Acetum
Vinum terebinthinum	Acetum scilliticum.
Vinum cedrite	


INDICIS CURATIVI
FINIS.







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A